A dDAAM sejtvázsabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata

Ph.D. értekezés

Készítette: Migh Ede

Témavezető: Dr. Mihály József

Magyar Tudományos Akadémia

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Genetikai Intézet

SZTE TTIK

Biológia Doktori Iskola

Szeged, 2018.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	4
A sejtvázs általános felépítése és működése	4
Az intermedier fialmentumok	4
Az aktin sejtvázs szerveződése és működése	5
Aktinkötő fehérjék	6
Aktin nukleáló faktorok	7
<i>Az Arp2/3 komplex felépítése és működése</i>	<i>8</i>
<i>Tandem WH2 nukleátorok felépítése és működése</i>	<i>9</i>
<i>Leiomodin-szerű nukleációs faktorok</i>	<i>11</i>
<i>A forminok jellemzése</i>	<i>11</i>
A mikrotubulusok általános jellemzése	15
A mikrotubulus nukleáció	16
A mikrotubulus dinamika szabályozása	17
<i>Mikrotubuluskötő +TIP fehérjék</i>	<i>17</i>
<i>Strukturális mikrotubulus asszociált fehérjék</i>	<i>20</i>
<i>A forminok és a mikrotubulusok</i>	<i>21</i>
A DAAM formin alcsalád jellemzése és kapcsolata a Wnt jelátviteli utakkal	22
A kémiai szinapszisok általános felépítése és működése	24
A Drosophila NMJ, mint szinaptikus modellrendszer	25
<i>Az embrionális Drosophila NMJ kialakulása és fejlődése</i>	<i>25</i>
<i>A lárvális Drosophila NMJ fejlődése</i>	<i>28</i>
Az aktin sejtvázs szerepe és szabályozása a szinaptikus fejlődés során	31
A mikrotubulusok szerepe és szabályozása a szinapszisok kialakulásában	34

CÉLKITŰZÉSEK	37
EREDMÉNYEK	38
A dDAAM kölcsönható partnereinek azonosítása központi idegrendszerből	38
A dDAAM fehérje szerepének vizsgálata az embrionális szinapszisképződésben..	41
A dDAAM fehérje szükséges a lárvális NMJ képződésben	43
A dDAAM a preszinaptikus mikrotubulus stabilizálódás pozitív szabályozó faktora	49
A konstitutívan aktív C-DAAM elősegíti az új boutonok kialakulását	54
A dDAAM a Dlar/Trio/Dia jelátviteli egységtől függetlenül szabályozza a szinaptikus bouton képződést	56
A dDAAM domináns genetikai interakciót mutat a <i>wg</i> és az <i>Ank2</i> génekkel	59
A dDAAM az Ank2-XL fehérjével együtt szabályozza a preszinaptikus mikrotubulus köteg organizációját	61
A dDAAM együttműködik a preszinaptikus Wg szignalizáció egyik sejtvezeték effektor fehérjéjével a Futsch-csal.....	63
A dDAAM Brp függő jelenléte moduláris funkcióval bír a szinaptikus transzmisszióban	65
EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA	75
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK	81
FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK	88
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS	90
ÖSSZEFOGLALÁS	92
SUMMARY	96
IRODALOMJEGYZÉK	100

A sejtvázas általános felépítése és működése

Jelenlegi tudásunk szerint az összes élő sejt a Földön rendelkezik sejtvázzal. A sejtvázas, mint elnevezés egy merev és egyszerű struktúrára utal, pedig a valóságban egy dinamikus, bonyolult rendszerről van szó, ami lehetővé teszi, hogy számos funkciót lásson el a sejtben. Ilyen funkció lehet a sejtmozgás, a sejthalak fenntartás, az intracelluláris transzport, az organelletranszport, illetve a sejtosztódás. Az eukarióta sejtvázas 3 fő szerkezeti egységből épül fel: az intermedier filamentumokból, a mikrotubulusokból, illetve a mikrofilamentumokból vagyis az aktin sejtvázból.

Az intermedier filamentumok

Az intermedier elnevezés abból a megfigyelésből származik, hogy a 10 nm átmérőjű intermedier filamentum az izomsejtekben lévő aktin filamentumnál vastagabb, viszont a miozin filamentumnál keskenyebb szerkezeti elem. Az intermedier filamentumok felépítésüket tekintve homo-, vagy heteropolimerek lehetnek, amelyek az aktin filamentumoknál, illetve a mikrotubulusoknál intaktabb, kevésbé dinamikusan változó struktúrák, ezáltal a funkciójuk leginkább a sejtek szerkezeti integritásának a megőrzése. A humán genomban 67 intermedier filamentum gén található, ami az intermedier filamentumok rendkívüli sokszínűségére utal. Számos intermedier filamentum létezik, amelyeket aminosav szekvencia homológia és fehérje szerkezet alapján 6 különböző csoportba lehet sorolni.

Az I., és II. csoportba a savas, illetve bázikus keratinok tartoznak, amelyek leginkább epiteliális sejtekben találhatóak meg. A keratin egy olyan heteropolimer lánc, amely savas és bázikus keratin monomerekből épül fel. A III. csoportba négyféle fehérje tartozik. Ezek közül a leggyakrabban előforduló fehérje a vimentin, amely megtalálható a fibroblasztokban, a leukocitákban, illetve az erek endotél sejtjeiben is. A csoport következő fontos képviselője a dezmin, amely az izmokban található szarkomerek egyik fontos strukturális eleme. A harmadik tagja a csoportnak a GFAP (glial fibrillar acidic protein) legfőképpen a gliasejtekben és az asztrocitákban fordul elő, míg végül a peripherin, amit a neve is jelez, a perifériás idegrendszer idegsejtjeire jellemző. A IV. csoportot a neurofilamentumok (NF) képviselik. Specifikusan a központi idegrendszer (KIR) neuronjainak axonjaiban fordulnak elő, ahol a mikrofilamentumok és a mikrotubulusok mellett fontos eleme a neuronális citoskeletonnak.

Az V. csoportot a laminok alkotják, amelyek a sejtmagban találhatóak ellentétben a többi intermedier filamentummal, amelyek citoszolikusak. Az utolsó VI. csoportba a nestinek

tartoznak, amelyek 230kDa méretű fehérjék és homopolimereket hoznak létre. Főleg izomsejtekben, és embrionális neuronokban fordulnak elő.

Az aktin sejtvázszerződése és működése

Az aktin sejtvázszerződése egy rendkívül dinamikusan változó, flexibilis és plasztikus rendszer, amelynek elsődleges funkciója, hogy mechanikai erőket generálva sejtalak változást hozzon létre. A sejtalak változás mellett, ami elsődlegesen a kortikális membránt érinti, az aktin sejtvázszerződés által kifejtett erők képesek intracelluláris membránok, organellek és vezikulák helyzetét, illetve alakját is befolyásolni. Ily módon a sejtben számos funkciót lát el, mint például: sejtmozgás, sejt differenciáció, sejtosztódás és számos transzportfolyamat. Mivel az aktin sejtvázszerződésnek ilyen sokrétű funkciói vannak, ezért számos aktin-kötő, illetve motorfehérje van szükség a sejtekben, ahhoz hogy térben és időben ezek a funkciók megfelelően elváljanak.

Az aktin egy 42 kDa nagyságú, nagyfokú evolúciós konzerváltságot mutató, az eukarióta sejtek egyik legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérjeje. Az „actin” elnevezés Straub F. Brúnó nevéhez kapcsolódik, aki Szent-Györgyi Albert laboratóriumában először izolálta az aktint izomsejtekből, amit korábban már ismertek ebben a laboratóriumban a miozin viszkozusabb formájaként és aktivált miozinnak hívtak, amiből az elnevezés is származtatható.

Az aktin a sejtekben kétféle formából áll, globuláris aktin monomerekből (G-aktin) és filamentáris aktin polimerekből (F-aktin). Az élő sejtekben az aktin nagyjából fele globuláris formában, míg a másik fele polimer formában található meg. Az aktin filamentumok 6-7 nm átmérőjű, kettős helikális struktúrák, amelyben a láncok csavarulatai 37 nm-es távolságonként ismétlődnek [1]. A filamentumban a két párhuzamos lefutású G aktinból álló lánc úgy tekeredik egymásra, hogy bennük a monomerek egymáshoz képest fej farok orientációban helyezkednek el.

1. ábra Az aktin filamentum szerkezete. (A) A sematikus filamentum modell szemlélteti, hogy *in vivo* a szöges végen ATP-aktin beépülés történhet, ami az aktin saját ATPáz aktivitása miatt ADP-aktinná alakul. A hegyes vég a depolimerizáció helye, a disszociáló ADP-aktin monomerek ATP jelenlétében pedig újra ATP-aktinná alakulhatnak. (B) Az F-aktin oligomer kettős helikális struktúrájának térbeli szerkezete, amely rendelkezik a gyorsan növe szöges és a lassan növe hegyes véggel. Az ábra a www.slideshare.net webhelyről letöltve és módosítva.

Az aktin filamentumok nemcsak struktúrális, hanem kinetikai polaritással is rendelkeznek. Ennek alapja az, hogy a filamentumba a G-aktin ATP-vel alkotott komplexe képes csak beépülni, viszont az aktin monomerek ATP-áz aktivitást mutatnak, amelynek mértéke jelentősen megemelkedik a filamentumba épülést követően. Az ATP hidrolízise után a filamentumban képződő ADP-aktin viszont olyan konformáció változást okoz, ami a filamentumot instabillá teszi, így növelve a depolimerizációra való hajlamot. *In vitro* körülmények között ezek a tulajdonságok azt eredményezik, hogy a képződő filamentumok mindkét végén történhet monomer beépülés és kilépés is, viszont ezeknek sebessége a két végén jelentősen eltérő (1. ábra). A filamentum ún. szöges (+) végén, ahol az ATP-aktin a prominens kb. 10-szer gyorsabb a beépülés sebessége, mint az ún. hegyes (-) végén amire az ADP-aktin jelenléte a jellemző (1. ábra). Ez a különbség *in vivo* körülmények között még nyilvánvalóbb, ott ugyanis a polimerizáció kizárólag csak a szöges végén történhet, míg a hegyes végén az aktin monomerek kilépése, depolimerizációja megy végbe.

Aktinkötő fehérjék

A mikrofilamentumok alapvetően kétféle magasabb szerveződési szinttel rendelkező aktin struktúrát hozhatnak létre a sejtekben. Ezek közül az egyik az el nem ágazó, párhuzamos lefutású aktin kötegek, míg a másik a bonyolult, szövevényes, elágazó aktin hálózatok. A magasabb szerveződési szintű aktin struktúrák kialakulásához, amelyek számos folyamatban vesznek részt (sejtvándorlás, sejtosztódás stb.) elemi szükség van arra, hogy rendkívül rigorózus módon szabályozza a sejt ezen struktúrák képződését, illetve lebontását térben és

időben egyaránt. Ennek eredményképpen számos aktinkötő fehérje ismert, amelyek kapcsolódásuk és funkciójuk alapján különféle csoportba sorolhatóak. Kapcsolódásuk alapján lehetnek monomer kötők, illetve a filamentumhoz kötődők, amelyek képesek lehetnek a filamentum oldalához vagy végeihez kötődni. Aktivitásuk alapján megkülönböztethetünk nukleációt elősegítő, polimerizációt elősegítő, polimerizációt gátló, depolimerizációt elősegítő, fragmentációt elősegítő, filamentumot stabilizáló, filamentumokat keresztkötő gél- és kötegformáló fehérjéket valamint motorfehérjéket [2, 3].

Aktin nukleáló faktorok

Az aktin sejtvázsabályozás egyik rendkívül fontos eleme a *de novo* filamentum képződés, ami spontán módon kinetikai okok miatt a sejtben nem támogatott [4-6].

2. ábra Spontán nukleáció és elongáció sematikus modelljei.

(A) Az aktin dimerek és trimerek instabilak *in vivo* körülmények között. A hosszabb polimerek a szöges vég felől gyorsabban nőnek, mint a hegyes vég felől.

(B) A monomer kötő Profilin és a thymosin-β4 megakadályozza a véletlenszerű nukleációs magok létrejöttét. Az ábra a [7]-es publikáció alapján módosítva.

Ennek egyik oka, hogy a filamentum képződés iniciátorai az aktin dimerek és trimerek rendkívül instabilak (2. ábra A), másrésről a monomer kötő fehérjék (profilin, thymosin β4) megakadályozzák az aktin monomerek véletlenszerű összekapcsolódását (2. ábra B) [7]. Ezért az evolúció során létrejöttek olyan aktin nukleáló fehérjék, amelyek képesek elősegíteni aktin dimerek, trimerek kialakulását, illetve azok stabilizálódását. Alapvetően 4 alosztályba sorolhatjuk az aktin nukleációs faktorokat: tandem WH2 (Wasp homology domain 2) domén nukleátorok, Leiomodin fehérjék, Arp2/3 komplex és a forminok [8, 9]. Közös jellemzője az aktin nukleációs és az elongációs faktoroknak, hogy az aktin kötéshez túlnyomórészt WH2 vagy WH2-szerű doméneket használnak, kivéve a forminok többségét, amelyeknek az FH2 (Formin homology 2) doménje biztosítja az aktin kötetést. A WH2 és az FH2 domének közvetlen szomszédságában gyakran prolin-gazdag domén (prolin-rich domain, PRD) található, amely a Profilin/G-aktin kötés kialakítását segíti elő.

NPF fehérjék és az Arp2/3 komplex

Tandem WH2 nukleátorok

Leiomodin-szerű nukleátor

Formin nukleátorok WH2 doménnel

3. ábra WH2 vagy WH2-szerű doménnal rendelkező aktin nukleációs faktorok csoportosítása doménszerkezetük alapján. A WH2 domén piros négyzetben W jelöléssel van ellátva, míg a prolin-gazdag domén kék téglalap PRD felirattal. A domének rövidítései a következők: KIND, kinase non-catalytic C-lobe domain; S, Spire box; FYVE, Fab1/YOTB/Vac1/EEA1 zinc-binding domain; K, basic K region; SS, signal sequence; NRD, N-terminal repeat domain; CRD, C-terminal repeat domain; TMBS1, tropomyosin-binding site; ABS2, actin-binding site2; WH1, WASP-homology 1 domain; B, basic domain; CRIB, Cdc42/Rac interactive binding; C, central region; A, acidic region; GBD, GTPase binding domain; DID, diaphanous inhibitory domain; DD, dimerization domain; FH2, formin-homology 2 domain; DAD, diaphanous autoregulatory domain. Az ábra a [8]-as publikáció alapján módosítva.

Az Arp2/3 komplex felépítése és működése

Az Arp2/3 komplex összesen hét protein alegységből épül fel [10], amelyek közül kettő erősen hasonlít az aktinra (Arp2 és Arp3) [11]. Az Arp2 és Arp3 alegységek fehérje szekvenciái majdnem 50%-os egyezést mutatnak az aktinnal, szerkezetük pedig olyan, hogy együttesen egy, a hegyes végen található aktin dimert mimikálnak, aminek szabad a szöges oldala, ahová aktin monomerek kapcsolódhatnak [12]. A két Arp a komplexben polimerizációs magként funkcionál, de ehhez még két feltételnek teljesülnie kell. Először is szükség van egy anyafilamentumra, mivel az aktin monomerek jelenléte nem elégséges ahhoz, hogy új láncok képződését indítsa el. Ha az anyafilamentumhoz kötődik, akkor 70°-os szöget bezárva megindul az új aktin lánc kialakulása (4. ábra) [13]. Az Arp2/3 aktivitása így módon hálózatos aktin

struktúrák kialakulását teszi lehetővé, ahol az Arp2/3 az oldalágat alkotó aktin filamentumok hegyes végénél, az elágazódási pontokban helyezkedik el.

4. ábra Az NPF és az Arp2/3 komplex által katalizált aktin nukleáció mechanizmusának a modellje. Az Arp2/3 komplex 2 aktin-szerű doménnel rendelkezik. Az NPF aktiválja az Arp2/3 komplexet, ami egy filament-szerű struktúrát vesz fel, így elősegítve az NPF-Arp2/3 komplex kötődését az anyafilamentum oldalához. A filamentumhoz való kötődést követően az NPF segítségével aktin monomerek épülnek be, amik létrehozzák az aktin nukleációs magot a filamentum oldalán. A nukleáció után az NPF disszociál a filamentumról és ezáltal lehetővé teszi, hogy további aktin monomerek épüljenek be az elágazó filamentum szöges végére. A létrejövő új aktin filamentum és az anyafilamentum körülbelül 70°-os szöget zár be egymással. Az ábra a [8]-as publikáció alapján módosítva.

Ahhoz, hogy a két Arp a filamentum oldalához kötődjön, szükség van a fehérje aktivációjára is, mivel az alapállapotú Arp fehérjék konformációja nem teszi lehetővé a filamentumhoz való kötődést [13]. Az Arp2 és Arp3 fehérje aktivációját nukleációt elősegítő faktorok (nucleation-promoting factors, NPF) teszik lehetővé, amelyek elősegítik az Arp2 és 3 aktív konformáció változását, aktin monomert szállítanak az új filamentum szöges végéhez, illetve elősegítik az Arp2/3 komplex filamentumhoz való kötődését (4. ábra) [14-17]. Az NPF fehérjék közös jellemzője, hogy tartalmazznak a C-terminális részen PRD és WH2 doméneket, amelyeknek száma fehérjéről fehérjére változik (3. ábra) [18, 19]. A WH2 domén(ek) az aktin monomer(ek) kötődéséért felelősek lehetővé téve az új filamentum kialakulását. A PRD domének a Profilin/G-aktin kötést segítik elő, de szerepük még nem minden szempontból világos. A 4 legismertebb NPF fehérje: az N-Wasp, a Wave2, a WHAMM és a RickA (3. ábra) [18, 19].

Tandem WH2 nukleátorok felépítése és működése

A tandem WH2 nukleátorok legelsőként azonosított tagja a Spire fehérje [20], amely tartalmaz egy N-terminális KIND domént, négy centrális aktinkötő WH2 domént, és egy C-

terminális FYVE domént (3. ábra) [21]. A Spire által katalizált aktin nukleáció a Cappuccino formin fehérje segítségével együtt történik [22, 23]. A Spire-Cappuccino fehérjekomplex létrejötte gátolja a formin nukleáló és szögesvég-kötő aktivitását, viszont ezzel párhuzamosan a Spire nukleáló aktivitása jelentősen megemelkedik [24, 25]. A Spire monomer fehérje, viszont a formin bekötődésével dimerizálódik, ami jelentősen megemeli a fehérje nukleációs aktivitását [23, 26]. A nukleáció befejeztével a Spire elhagyja a szöges véget, ami lehetővé teszi a Profilin/G-aktin belépést a szöges végen (5. ábra).

5. ábra A Spire aktin nukleációs faktor lehetséges működési modellje. A Spire-aktin komplex (a 4 WH2 domén 4 aktin monomert köt) a Capuccino fehérjével kölcsönhatásba lép, ami a Spire dimerizálódását és nukleációs aktivitásának nagymértékű megemelkedését okozza. A nukleáció végén a Spire disszociálódik a filamentum szöges végéről biztosítva a lehetőséget új aktin monomerek beépülésének. Az ábra a [8]-as publikáció alapján módosítva.

A tandem WH2 fehérjék másik fontos képviselője a Cordon bleu (Cobl) fehérje, amely kizárólag a gerincesekben fordul elő [27]. A fehérje az agyban nagymértékű kifejeződést mutat, ahol fontos szerepe van a dendrit arborizációban [28, 29]. Továbbá a Cobl fehérje nukleációs aktivitása összefüggésbe hozható az elsődleges cílium képződéssel valamint a mikrovillus összeszereléssel [30-33]. A Cobl fehérje, hasonlóan a Spire-hoz, több aktin monomert képes megkötni, amely aktivátor fehérjék (BAR és SH3 domént tartalmazó fehérjék) hatására dimerizálódik és elősegíti az aktin filamentumok nukleációját [34, 35]. Azonban a Cobl fehérje működésének néhány aspektusa különbözik a Spire fehérjétől. A Cobl a Spire-től eltérően mindössze 3 WH2 domént tartalmaz, valamint a második és a harmadik WH2 domén között található ~65 aminosav hosszúságú linker (összekötő fehérjerész) kulcsfontosságú a fehérje nukleációs aktivitásában (3. ábra) [34, 35]. Az első WH2 domén előtt található egy lizinben gazdag fehérjerész, amely aktin-kötésre képtelen, de szintén szükséges a WH2 domének aktivitásához. A rendelkezésre álló ismereteink alapján ez a lizinben gazdag régió képes lehet a BAR és SH3 doméneket tartalmazó fehérjékkel interakcióba lépni, ami elősegíti a fehérje dimerizációját és a nukleációs aktivitásának emelkedését [29, 32, 33, 36].

Leiomodin-szerű nukleációs faktorok

Az aktin nukleációs faktorok legkésőbb felfedezett képviselője a Leiomodin (Lmod), amelyet egy izom specifikus aktin nukleátorként jellemeztek [37]. Az Lmod izomspecifikus működése mindenképpen kivétel az aktin nukleátorok között, mivel a filamentum hegyes végén stabilizálja az aktin nukleációs magokat [38, 39] (6. ábra).

6. ábra Az Lmod feltételezett működési mechanizmusa az izom fejlődés során. Az Lmod a két aktinkötő fehérjeresz (actin binding site 2, ABS2 és WH2) mellett rendelkezik egy tropomiozin interakciós doménnel (tropomyosin binding site 2, TMBS2) és egy prolin-gazdag régióval (PRD). Az ABS2 a WH2 és a PRD domének közreműködésével létrehozza a nukleációs magként szolgáló trimert. A nukleáció után a hegyes végről disszociál és ezáltal a Tmod sapkázza a filamentumvéget. Az ábra a [8]-as publikáció alapján módosítva.

A forminok jellemzése

A forminok nagyfokú evolúciós konzerváltságot mutató fehérjék, amelyek képesek befolyásolni a sejtvázs dinamikus folyamatait az aktin és a mikrotubulus sejtvázs szabályozása által. Rendkívül fontos folyamatokban vesznek részt, mint pl: sejtalak változás, sejtosztódás stb. A formin fehérjecsald első névadó tagja az egér *Formin-1* gén volt. A formin, mint elnevezés a gén mutációja által okozott „limb deformity” fenotípusból származik. A *Formin-1* homozigóta mutáns egerek vese- és végtagdeformitási fenotípust mutattak [40]. A későbbi vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a mutáns fenotípust valójában a *Formin-1* génnel szomszédos *gremlin* nevű gén hibás szabályozása okozza [41]. Ettől függetlenül a formin elnevezés megmaradt és a később azonosított Formin-1 homológok megtartották nevüket. A forminok az élővilágban széles körben elterjedtek, mivel az élesztőktől kezdve a gerincesekig szinte minden fajban megtalálhatóak [42]. Ezek a fehérjék sokféle sejttípusban és szövetben kifejeződnek, és sokféle sejtes struktúra létrehozásában játszanak szerepet [42, 43].

A forminok nagyméretű (120–220 kDa), dimerizációra képes multidomén szerkezettel rendelkező fehérjék [44]. A forminok közös jellemzője, hogy rendelkeznek két formin

homológia doménnel (FH1 és FH2) [43, 44]. A metazoa forminok FH2 doménjeinek összehasonlító filogenetikai analízise alapján a forminokat 7 nagyobb alcsaládra oszthatjuk: Diaphanous (Dia), Dishevelled-associated activator of morphogenesis (DAAM), formin-like proteins (FMNL), formin homology domain proteins (FHOD), formins (FMN), Delfilin és inverted formins (INF) [45]. Az eukarióta sejtek több formin gént tartalmazhatnak, de az egyszerűbb élőlényekben nem minden formin alcsalád képviselteti magát. A bioinformatikai vizsgálatok alapján a *Saccharomyces cerevisiae*-ben 2, a *Schizosaccharomyces pombe*-ban 3, a *Drosophila melanogaster*-ben 6, a *Dictyostelium discoideum*-ban 10, az emlősökben 15 formin gén található (7. ábra) [42].

7. ábra A forminok domén szerkezete és filogenetikai vizsgálata. Az emlős forminokat 7 nagyobb alcsaládba sorolhatjuk: Dia, DAAM, FMNL, FHOD, INF, Delfilin és FMN. A DRF forminok csoportjába (Dia, DAAM, FMNL, FHOD) tartozó fehérjék nagyfokú szerkezeti és funkcionális hasonlóságot mutatnak egymással. *Drosophila*-ban a Delfilint kivéve az összes formin alcsalád képviseli magát. Az ábra a [42]-es publikáció alapján módosítva.

A forminok FH1 doménje a *Dictyostelium discoideum* ForC-t kivéve [46] minden forminban megtalálható, változó méretű, körülbelül 50 aminosavból álló prolin-gazdag régió közvetlenül az FH2 domén szomszédságában. Az FH1 domén egyik legfontosabb ismert funkciója, hogy képes megkötni a Profilin/G-aktin komplexet [47-50]. Továbbá ismert tény, hogy az FH1 domén prolinban gazdag része interakcióba kerülhet WW vagy SH3 doméneket tartalmazó fehérjékkel [51-54].

Az FH2 domén legjobban jellemzett tulajdonsága, hogy *in vitro* körülmények között képes nukleálni és elongálni az aktin filamentumokat [55-57]. Ellentétben a többi aktin nukleáló faktorral, képes a nukleáció után a filamentum szöges végén maradni, hogy megóvja a filamentumvéget a sapkázó fehérjétől, illetve elősegítse a filamentum elongációját [58-60]. Az eddigi tudásunk szerint az FH2 domének csak homodimer formában aktívak, mivel a dimerizációt érintő mutációk megszüntetik a fehérje nukleáló aktivitását [59-61]. A kristályszerkezeti vizsgálatok megmutatták, hogy az FH2 domének dimerizációjával egy gyűrűszerű képlet jön létre [60]. A működési modell alapján az FH2 dimer eleinte két aktin monomert köt, amely a későbbiekben nukleációs magként szolgál. Zárt állapotban ez a kötődés olyan szoros, hogy lehetetlenné teszi további aktin monomerek beépülését. Az FH2 dimer a zárt konformáció után képes nyitott állapotba kerülni azáltal, hogy a gyűrű felnyílik az egyik oldalon, így képes egy új aktin monomer beépülni. A monomer beépülése után a gyűrű ismét zárt konformációt vesz fel. A zárt és nyitott állapot felváltva váltakozik az aktin polimerizáció folyamán, amely során a formin mintegy végig lépked a szöges végre beépülő G-aktin monomereken és folyamatosan asszociált marad a gyorsan növekvő véggel (8. ábra) [58]. Ez a forminok aktin polimerizációjának egy általánosan elfogadott modellje, azonban a konformáció-változás mechanizmusa egyelőre nem világos.

8. ábra A forminok általános működési modellje. (A) Az FH2 dimer az aktin filamentumok szöges végéhez kötődik, az aktin polimerizációhoz szükséges monomereket az FH1 domén biztosítja a Profilin/G-aktin megkötésével. (B) Az FH1 domén a Profilin kötött monomert a szöges vég közelébe szállítja, ahol az FH2 dimer egyik funkcionális fele beépíti az aktin monomert a filamentum végére. (C) A másik FH2 domén megismétli ugyanezt a folyamatot. (D) A formin zárt konformációja megvédi a filamentumvéget a sapkázó fehérjék hozzákötődésétől. Az ábra a [18]-as publikáció alapján módosítva.

A 7 formin alcsalád közül érdemes kiemelni a DRF (diaphanous related formins) forminok közé tartozó Dia, DAAM, FMNL és FHOD alcsaládokat, amelyek a doménszerkezeten kívül funkcióban is nagy hasonlóságot mutatnak egymással. A DRF

forminokra jellemző, hogy a formin homológia doméneken kívül más konzervált doméneket is tartalmaznak és alapvetően a fehérje két nagyobb funkcionális részre különíthető el (9. ábra) [62-66].

9. ábra A DRF forminok doménszerkezete és működése. (A) Az autoinhibíció a C-terminális DAD és az N-terminális DID domének kölcsönhatásával jön létre. (B) Egy Rho- vagy Rac-típusú kisGTPáz GBD doménhez történő kapcsolódásával az intramolekuláris kapcsolat megszűnik, így a formin aktív állapotba kerül. Ezek után az FH2 domén képes elősegíteni az aktin filamentumok nukleációját, majd a polimerizáció során a gyorsan növekvő véggel asszociált marad. Az FH1 domén kölcsönhatása a Profilin/G-aktin komplex-szel jelentősen gyorsíthatja az elongáció sebességét. A domének rövidítései a következők: CC, coiled-coil ; DAD, diaphanous autoregulatory domain; DD dimerization domain; DID, diaphanous inhibitory domain; FH1, formin homology 1; FH2, formin homology 2; GBD, GTPase-binding domain. Az ábra a [44]-es publikáció alapján módosítva.

A C-terminális felükben helyezkedik el a két katalitikus formin homológia domén, a DAD domén (diaphanous autoregulatory domain) és az extrém C-terminális rész. Az N-terminális régióról úgy gondoljuk, hogy leginkább szabályozó funkciókkal bír, amelyek közül kiemelkedik, hogy intramolekuláris kölcsönhatást létesít a DAD doménnel és ezáltal gátolni képes a C-terminális fél aktin összeszerelő aktivitását (9. ábra A) [66-68]. A fehérje N-terminális felében négy funkcionális domén található, a GBD (GTPase-binding domain), a DID (diaphanous inhibitory domain), a DD (dimerization domain) és a CC (coiled-coil) domének (9. ábra) [64, 65]. A DD és a CC domének az N-terminális fél dimerizációját segítik elő és szerepük lehet a sejten belüli lokalizáció szabályozásában is [64]. Ezzel szemben a GBD és a DID domének a DAD doménnel való kölcsönhatást irányítják [65]. Ha egy aktivált Rho típusú kisGTPáz kötődik a GBD doménhez, akkor megszűnik az intramolekuláris kölcsönhatás (9. ábra B) [63, 68]. A mai ismereteink szerint a Rho típusú kisGTPázok a DRF családba tartozó forminok legfontosabb aktivátorai [69]. A C-terminális félen az FH1 és FH2 domének

szomszédságában a DAD domén és a C-terminális farok rész található. A C-terminális részen lévő DAD domén mellett, hogy részt vesz a fehérje inaktív konformációjának kialakításában, az extrém C-terminális résszel együtt képes növelni az aktin polimerizáció sebességét [70-72]. A DAD és a C-terminális farok rész egyaránt pozitívan töltött aminosavakban gazdagok, így valószínűleg elősegítik az aktin-formin interakció kialakulását.

A mikrotubulusok általános jellemzése

A mikrotubulusok olyan nem kovalens sejtvázs polimerek, amelyek minden eukarióta sejtben megtalálhatóak és számos folyamatban részt vesznek, mint pl: mitózis, sejtándorlás, intracelluláris transzport, szekréció és sejtalak fenntartás. A mikrotubulusok a sejtek legmerevebb vázelemei, amelyek a stabilitás szempontjából viszont dinamikusan változó szerkezetek. Az α - és β -tubulin heterodimerek a polimerizáció első lépésében protofilamentumokat hoznak létre, amelyek ezután egy 24 nm széles cilindrikus csőszerű struktúrába rendeződnek, így hozva létre a mikrotubulust (10. ábra) [73-76]. A dimerek beépülése a protofilamentumba fej-farok orientációban történik, a tubulin dimer α alegysége a következő dimer β alegységével kapcsolódik össze [75]. Az aktin filamentumokhoz hasonlóan a mikrotubulusok szintén polarizált struktúrákba rendeződnek, és két különböző polimerizációs rátával rendelkező végük van [76-78]. A (+) végen jelentősen gyorsabb a polimerizáció sebessége, míg a (-) végen ennél lényegesen lassabb. Minden egyes protofilamentumban megfigyelhető, hogy a (+) vagy gyorsan növekvő végen az α - és β -tubulin heterodimerek β alegységei, míg a (-) vagy lassan növekvő végen pont fordítva a heterodimerek α alegységei lógnak ki (10. ábra) [78]. A harmadik tubulin izoforma a γ -tubulin, amely a (-) végen iniciátora a megfelelő mikrotubulus összeszerelésnek [79]. A *de novo* mikrotubulus képződés legfőbb nukleációs komplexe a γ -tubulin gyűrű komplex (γ -TuRC) [80-82]. A polimerizáció/depolymerizáció dinamikája nagymértékben függ egyrészt a tubulin dimerek koncentrációjától, másrészt a (+) végen a szabad β -tubulin GTP vagy GDP kötött állapotától. Egy bizonyos tubulin koncentráció felett elsődlegesen beépülés, míg ez alatt depolymerizáció történik. Ha a (+) végen túlnyomórészt GDP-kötött β -tubulin alegységek találhatóak, akkor az depolymerizációhoz vezet, míg a GTP kötött forma polimerizációt eredményez [78, 79]. A mikrotubulusok tulajdonságait jelentősen befolyásolja, hogy milyen α - és β -tubulin izoformából épülnek fel, 3 α -tubulin ($\alpha 1$, $\alpha 2$ és $\alpha 4$) és 5 β -tubulin (βI , βII , βIII , βIVa és βIVb) izoformát különböztethetünk meg egymástól [83, 84]. Továbbá különböző mikrotubulus asszociált fehérjék kötődése, illetve a mikrotubulusok poszttranszlációs módosításai

(tirozináció, detirozináció, aciláció, poliglutmailáció, poligliciláció, foszforiláció és palmitoiláció) is fontos tényezői a mikrotubulus dinamika szabályozásának [85-87].

10. ábra A mikrotubulusok felépítése és működése. A mikrotubulusok fej-farok orientációban elhelyezkedő α - és β -tubulin heterodimerekből épülnek fel. A mikrotubulusok polarizált szerkezetű struktúrák, amelyek (+) végénél a polimerizáció sebessége lényegesen nagyobb, mint a (-) végnél. A mikrotubulusvégek felépülésének (polimerizáció) és leépülésének (depolimerizáció) dinamikája periodikusan változik, amelyet dinamikus instabilitásnak hívunk. A dinamikus instabilitás során a mikrotubulus gyorsan növekvő végei hirtelen átválnak depolimerizációba (katasztrófa), majd hirtelen újra növekedni kezdenek (menekülés). Az ábra a [95]-ös publikáció alapján módosítva.

A mikrotubulus nukleáció

A nukleáció során a γ -tubulin létrehozza a multiprotein γ -TuRC komplexet, ami templátként szolgál a létrejövő mikrotubulus α - és β -tubulin alegységeinek [88]. Habár a γ -tubulin legnagyobb részt a centroszómánál lokalizálódik, mégis megfigyelhető centroszómális és nem centroszómális γ -tubulin mediált nukleáció [89]. Továbbá az is ismert tény, hogy centroszómák hiányában a sejtek mikrotubulus szerveződése normális [90, 91]. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy centroszómák nélkül is létrejöhetnek új mikrotubulus kötegek.

A centroszómától független mikrotubulus nukleáció során a sejtosztódás után a γ -tubulin és számos centroszómális fehérje a citoplazmában fogja kialakítani az új mikrotubulus nukleációs helyeket [92].

A mikrotubulus dinamika szabályozása

A mikrotubulus növekedés vagy rövidülés az α - és β -tubulin heterodimerek beépülésével vagy leválásával valósul meg. A növekedés mértéke elsősorban az oldat szabad heterodimer koncentrációjától függ. A csővégen az újonnan beépült β -tubulin a hozzákapcsolt GTP molekulát elhidrolizálja, ami azt eredményezi, hogy a mikrotubulus cső falában már GDP kötött β -tubulin lesz. A hidrolízis csökkenti az α - és β -tubulin heterodimerek közötti kötés erősségét, ami elősegíti a GDP kötött dimer leválását a mikrotubulusról. A mikrotubulus növekedése, akkor figyelhető meg, ha a GTP-tartalmú dimerek beépülése gyorsabb, mint az ezt követő GTP-hidrolízis. Ilyenkor a mikrotubulus végén egy GTP-tartalmú dimerekből álló felszíni réteg alakul ki, amely megakadályozza a cső végének a leépülését. Ha a GTP kötött heterodimer beépülés lelassul a GTP-tartalmú heterodimerek lokális koncentrációjának csökkenése miatt, akkor a felszíni GTP kötött dimer réteg eltűnhet. Ezt követően a csővégeken a GTP hidrolízis következtében GDP-tartalmú dimerek halmozódnak fel, ami instabilitáshoz és felbomláshoz vezethet. A mikrotubulusok azt a tulajdonságát, amikor periodikusan változik a mikrotubulusvégek növekedési és rövidülési fázisa, dinamikus instabilitásnak nevezzük (10. ábra) [77, 78, 93]. A mikrotubulusvég környezetében lévő szabad GTP kötött heterodimer koncentráció mellett még számos tényező befolyásolja a mikrotubulus dinamikát. Számos fehérjéről ismert, hogy interakciójuk a mikrotubulusokkal befolyásolja a mikrotubulusok növekedését, ezek közül a legjelentősebbek a mikrotubulus asszociált (MAP) fehérjék, a motorfehérjék, a poszttranszlációs módosításokat katalizáló enzimek és a (+) végkötő fehérjék [94, 95].

Mikrotubuluskötő +TIP fehérjék

A mikrotubuluskötő fehérjék legnagyobb és legismertebb csoportja a (+) végkötő vagy +TIP (microtubule plus-end tracking proteins) fehérjék. Az első azonosított +TIP fehérje a CLIP170 volt, azóta több, mint 20 +TIP fehérjecsaládot ismerünk. A szerkezeti felépítésük alapján 5 nagyobb csoportra oszthatjuk a +TIP fehérjéket (11. ábra) [96, 97].

+TIP fehérjék osztályozása

11. ábra A +TIP fehérjék csoportosítása domén szerkezetük és funkcióik alapján. A fehérjék és a domének rövidítései a következők: APC, adenomateous polyposis coli protein; Arm, armadillo repeat; basic-S/P, bázikus valamint szerin és prolin aminosavban gazdag; CAP-Gly, cytoskeleton-associated protein glycine-rich; CH, calponin homology; CLASP, CLIP-associated protein; CLIP-170, cytoplasmic linker protein of 170 kDa; EB, end-binding protein; EBH, EB homology; EEY/F, C-terminális Glu-Glu-Tyr/Phe tripeptid motívum; EF-hand, Ca²⁺-kötő motívum; Gas2, growth-arrest-specific protein 2; MCAK, mitotic centromere-associated kinesin; SxIP, Ser-x-Ile-Pro tetrapeptid motívum, ahol X bármilyen aminosavat jelölhet; +TIP, microtubule plus-end tracking protein; TOG, chTOG; WD40; XMAP215, microtubule-associated protein of 215 kDa. Az ábra a [96]-os publikáció alapján módosítva.

A végkötő (end binding, EB) fehérjék az N-terminális részükön egy erősen konzervált CH (calponin homology) doménnel rendelkeznek, amely a mikrotubulus kötésért felelős [98]. Ezenkívül a fehérje C-terminális részén található a helikális coiled-coil domén, amely a dimerizációt segíti elő. Irodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy dimerizáció hiányában nem képes az EB fehérje a (+) véghez kötődni [99]. A dimerizációért felelős fehérjerész mellett

megtalálható még az EBH (EB homology) domén és a savas aminosavakat tartalmazó EEY/F motívum, amelyek lehetővé teszik, hogy a fehérje más +TIP fehérjékkel kölcsönhatásba kerüljön a mikrotubulusvégen (11. ábra) [100, 101].

A következő csoport a CAP-Gly (cytoskeleton associated protein glycine rich) doménnal rendelkező fehérjék. A CAP-Gly fehérjerész erősen hidrofób tulajdonsággal bír és lehetővé teszi, hogy a fehérje kapcsolódni tudjon a mikrotubulusokhoz, illetve az EB fehérjékhez [102, 103]. Jeles képviselői ennek a fehérjecsaládnak a CLIP-170 és a dynactin komplex nagy alegysége a p150^{glued}. A CLIP-170 a CAP-Gly doménjének segítségével kötődik a mikrotubulusokhoz (11. ábra) [104].

A +TIP fehérjéknek a legnagyobb csoportja egy 4 aminosavas SxIP (szerin, x aminosav, ileucin, prolin) motívumot tartalmaz. Az SxIP motívum elsődleges funkciója, hogy specifikusan felismerje az EB fehérjék EBH doménjét [105]. A fehérjecsalád legismertebb képviselői az APC (adenomatous polyposis coli) tumor szupresszor, a mikrotubulus-aktin keresztkötő Spektraplakín és a mitotikus centromer asszociált kinezin (MCAK). Mivel az SxIP motívum kisméretű, ezért a fehérjék az evolúció során meglehetősen könnyen meg tudják szerezni, illetve el is tudják veszíteni ezt a rövid szekvenciárészletet, amire számos példát találhatunk az irodalomban (11. ábra) [106].

A TOG vagy TOG-szerű doménnal rendelkező fehérjék közé tartozik az XMAP215/Dis1 fehérjecsalád valamint a CLASP (CLIP-associated protein) fehérjék. A fehérje tandem helyzetben lévő TOG doménjeinek interakciója a tubulin dimerekkel valószínűleg elősegíti a mikrotubulusok növekedését [107]. A CLASP fehérje a TOG doméneken kívül SxIP motívummal is rendelkezik, ami szükséges a fehérje (+) vég lokalizációjához (11. ábra) [108].

Az utolsó +TIP fehérje csoport a mikrotubulus alapú motorfehérjék. A mikrotubulus mentén a (+) és a (-) irányba mozgó motorfehérjék egyaránt megtalálhatóak a gyorsan növekvő mikrotubulusvégen. Élesztőben a legismertebb +TIP motorfehérjék a kinezin Tea2, illetve a Kip2, a mikrotubulus depolimerizáló kinezin 13 MCAK és a citoplazmatikus dinein. Az MCAK esetében valószínűleg a mikrotubuluskötő motor domén előtt található SxIP motívum segíti elő a (+) vég lokalizációt (11. ábra) [109].

A +TIP fehérjék nagyon fontos vonása, hogy egy bonyolult, dinamikusan változó interakciós hálózatot képesek kialakítani a mikrotubulus (+) végen, amelyet a fehérjék jellegzetes doménjei és szekvencia motívumai biztosítanak, mint pl: CH, EBH és CAP-Gly domének, illetve EEY/F és SxIP motívumok [103, 104]. A jelenlegi ismereteink alapján úgy tűnik, hogy ennek a +TIP/mikrotubulus hálózatnak a központi elemei az EB fehérjék, mivel más fehérjéktől függetlenül is képesek szabályozni a gyorsan növő mikrotubulusvéget [99, 110,

[\[111\]](#). Továbbá az EB fehérjék szinte az összes többi +TIP fehérjével képesek kölcsönhatásba lépni. Ez a rendkívül bonyolult és összetett kölcsönhatási hálózat a +TIP fehérjék és a mikrotubulusok között, lehetővé teszi azt, hogy a +TIP fehérjék képesek legyenek finoman szabályozni a mikrotubulus dinamika különböző aspektusait, mint például a tubulin dimerek beépítésének elősegítése [\[112\]](#), katasztrófa [\[113\]](#) vagy menekülés [\[114\]](#) indukálása, illetve a mikrotubulusok stabilizálása.

A mikrotubulus dinamika szabályozása mellett a +TIP komplexek-nek fontos szerepe van abban, hogy a mikrotubulusvégeket kihorgonyozzák bizonyos struktúrákhoz, mint pl. a sejtmembrán [\[115\]](#) vagy a mitótikus kinetokór [\[116\]](#). A +TIP komplex valószínűleg az aktin/mikrotubulus rendszer kommunikációjában is részt vesz, amely kulcsfontosságú az axon növekedés és navigáció folyamataiban [\[117\]](#).

Néhány +TIP esetben azonban néha elég ellentmondásos a kép a funkció szempontjából. Egy jó példa erre az EB fehérje, ugyanis *in vivo* a sejtekben rendszerint elősegíti a mikrotubulusok növekedését és szupresszálja a katasztrófát, viszont *in vitro* körülmények között képes pozitív és negatív irányba is befolyásolni a növekedést [\[110, 111\]](#). Mindent egybe véve a mikrotubulus dinamika szabályozása egy nagyon fontos +TIP funkció, ami nagyon sok elemében még csak részlegesen feltárt folyamat.

Strukturális mikrotubulus asszociált fehérjék

A strukturális mikrotubulus asszociált fehérjék (microtubule associated protein, MAP) legismertebb képviselői a MAP1B és a tau, amelyek szabályozzák a mikrotubulus organizációt és dinamikát a neuronális fejlődés során [\[118, 119\]](#). Mind a MAP1B mind a tau szükséges az axon képződésben. Az *in vitro* biokémiai és *in vivo* sejtes kísérletek alapján kiderült, hogy a MAP1B (12. ábra) és a tau is képes közvetlenül a mikrotubulusokhoz kötődni és stabilizálni azokat. A tau fehérje a stabilizáló funkciója mellett képes megóvni a mikrotubulusokat attól, hogy bizonyos fehérjék (pl. katanin) szétszereljék őket [\[120\]](#). Számos neurodegeneratív betegség esetében leírták, hogy a tau hiperfoszforilált formája, amely nem képes a mikrotubulusokhoz kötődni, az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségben van jelen [\[121\]](#). A MAP1B *Drosophila* homológja a Futsch szintén jelentős szerepet játszik az idegrendszer kialakulásában [\[122, 123\]](#).

12. ábra A MAP1B kötődése a mikrotubulusokhoz. A MAP1B képes a mikrotubulusok oldalához kötődni, ami stabilizálja azokat. A fehérje kötődése elősegíti a mikrotubulusok növekedését a gyorsan növő (+) végen. Az ábra a [95]-ös publikáció alapján módosítva.

A forminok és a mikrotubulusok

Egyre több bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a forminok az aktin összeszerelő aktivitásukon kívül képesek kötni és szabályozni a mikrotubulusokat is [44, 124]. Először a Dia, FMN és INF formin alcsoportokról derült ki, hogy szerepet játszhatnak a mikrotubulusok szabályozásában [125-128]. A forminok *in vivo* szerepét a legtöbb modellrendszerben nehéz vizsgálni, mert az aktin sejtváza nagymértékben befolyásolja a mikrotubulus szerveződést [44]. Ezért az *in vitro* biokémiai vizsgálatok nagyon fontosak a formin/mikrotubulus kapcsolat jobb megértésében. Számos forminról ismert (mDia1, mDia2, Formin-1b, INF1, Cappuccino, dDAAM), hogy *in vitro* képes a mikrotubulusokhoz kötődni [22, 125-129]. *In vitro* kocsedimentációs tesztekben az mDia1, az mDia2, a Cappuccino és a dDAAM FH2 doménjei képesek a mikrotubulushoz kötődni [22, 125, 127, 129]. Mivel ez a domén a legkonzerváltabb a forminok között [45], ezért valószínűleg az összes formin képes kötni a mikrotubulusokat az FH2 doménon keresztül. A DRF forminok közé nem sorolható INF, eltérően a többi formintól, az FH2 doménon kívül az extrém C-terminális fehérjerészen saját mikrotubuluskötő doménnal rendelkezik [128]. Hideg kezeléssel és hígítással indukálható *in vitro* depolimerizációs tesztekben vizsgálható a formin/mikrotubulus interakció mikrotubulus dinamikára gyakorolt hatása. Az mDia1 és az mDia2 FH1-FH2 doménjei megóvják a mikrotubulusokat a hideg és hígítás indukálta depolimerizációtól. Valószínűleg a forminok a mikrotubulusok oldalához való kötődése megakadályozza, hogy a tubulin heterodimerek leváljanak a mikrotubulusvégekről (Bartolini és Gundersen nem közölt megfigyelései). A MAP1B és a tau fehérjékhez hasonlóan a formin/mikrotubulus kapcsolat elősegítheti a mikrotubulus növekedését [124]. Ezek után felmerül a kérdés, hogy az FH2 domén aktin- és mikrotubuluskötő funkciója hogyan befolyásolja egymás működését és annak milyen következménye van. Az mDia2 esetében, *in vivo* és *in vitro* egyaránt, az FH2 domén dimerizációs és aktin nukleációs aktivitása független a mikrotubulus stabilizáló aktivitásától [127, 130]. Ez az eredmény azt sugallja, hogy az FH2 doménon belül az aktin és mikrotubuluskötő felszín elválasztható egymástól. Továbbá az is érdekes, hogy az mDia1 és mDia2 aktin összeszerelő aktivitása jelentős mértékben lecsökken

mikrotubulusok jelenlétében, [131] illetve a Capuccino és a dDAAM *in vitro* képes keresztkötni az aktin filamentumokat és a mikrotubulusokat [22, 129]. A fenti megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a forminok fontos szerepet játszhatnak a koordinált aktin-mikrotubulus hálózatok kialakításában. Ezt a feltételezést megerősíti, hogy a +TIP komplex tagjainak (APC, EB1, CLIP-170) együttműködése az mDia1 forminnal lehetővé teszi, hogy a mikrotubulus (+) vég lokálisan elősegítse az aktin polimerizációt [127, 132-135].

A DAAM formin alcsalád jellemzése és kapcsolata a Wnt jelátviteli utakkal

13. ábra A kanonikus és nem kanonikus Wnt jelátviteli útvonalak működési modellje. (A) A kanonikus Wnt szignalizációban a Wnt/Wg kötődése a Fz receptorhoz és ko-receptorához az LRP5/6-hoz aktiválja a Dishevelled (Dsh) fehérjét, ami gátolja a destruktív komplexet (Axin, APC, GBP, Gsk3-β). Wnt hiányában a destruktív komplex egyik tagja a Gsk3-β foszforilálja a β-katenint, ami annak lebontásához vezet. Ezzel szemben a Wnt molekula bekötődésével a Dsh aktiválódik, ami a destruktív komplex szétesését eredményezi. A destruktív komplex hiányában a β-katenin feldúsul, és a sejtmagba kerül, ahol Wnt target géneket aktivál. (B) A nem kanonikus Wnt vagy Wnt/PCP jelátviteli út két lényeges elemében különbözik a kanonikus úttól. Egyrészt a Fz receptornak nincsen ko-receptora, másrészt a nem kanonikus út β-katenin független. A Wnt molekula a Fz receptorhoz való kötődése aktiválja a Dsh-t, ami a DAAM1 formin aktivációjához vezet. Az aktiválódott DAAM1 a Rho GTPázon keresztül elősegíti az aktin filamentumok összeszerelődését. Egy másik talán valószínűbb modell szerint a Dsh és a Rho együttesen aktiválja a DAAM1-et, ami katalizálja az F-aktin képződést. Az ábra a [145]-ös publikáció alapján módosítva.

A DAAM formin alcsalád elsőként azonosított tagját majdnem 20 évvel ezelőtt írták le először egy élesztő kéthibrid kísérletsorozat eredményeképpen, mint a Dishevelled2 (Dsh2) fehérje PDZ doménjével kölcsönható partnert [136]. Ezt a kapcsolatot ko-immunoprecipitációs vizsgálatokkal is megerősítették. Az egér Dsh2 PDZ és DEP doménjei egyaránt kölcsönhatást mutatnak a teljes hosszúságú humán DAAM1-el (hDAAM1) és annak C-terminális régiójával (C-hDAAM1) is [136]. Az mDsh2 PDZ és DEP doménjeinek kitüntetett szerepe van a nem kanonikus Wnt vagy más néven Wnt/PCP (planar cell polarity) jelátviteli útvonalban (13. ábra). Később több közlemény is megerősítette a DAAM forminnak ezt a szerepét, azonban a fehérjének a működés módjáról ellentmondásos eredmények jelentek meg az irodalomban [137-140]. A DAAM-ot először egy olyan jelátviteli komponensként írtak le, amely a Rho kisGTPáz aktivációján keresztül elősegíti az aktin filamentumok képződését [136]. Ez a feltételezés azonban ellentmond a DRF forminokra jellemző működési mechanizmusnak, vagyis a DRF forminok aktiválódásához szükség van egy kis molekulású GTPáz bekötődésére a fehérje N-terminális felén [44]. Más vizsgálatok alapján a hDAAM1 csak a RhoA aktivált formáját képes kötni, ami szintén arra utal, hogy a kis GTPáz bekötődése szükséges a DAAM aktivációjához [141], nem pedig a DAAM aktiválja a RhoA-t. Ettől függetlenül az emlős DAAM fehérjéknek a nem kanonikus Wnt jelátviteli útvonalban betöltött szerepe biztosnak tűnik, mivel erre vonatkozólag több egymástól független kísérletes bizonyíték is van.

A funkcionális vizsgálatok mellett a DAAM ortológok expressziós mintázata is ismertté vált számos gerinces fajban. Rágcsálókön végzett kísérletek alapján a fehérje nagy mennyiségben kifejeződik a fejlődő szív területén és a *DAAM1* mutáns egerek nagyon súlyos szívfejlődési rendellenességeket mutatnak [142]. A *Xenopus*, csirke és egér modell szervezeteken végzett vizsgálatok alapján a gerinces DAAM1 génnek másik nagyon fontos kifejeződési területe a fejlődő KIR [143]. Emellett az is kiderült, hogy a csirke DAAM2 fontos szerepet játszik a gerincvelő fejlődése során. Ebben a munkában azt is megállapították, hogy a csirke DAAM2 az LRP 5/6 komplex-szel együtt a kanonikus Wnt-jelátviteli útvonalon keresztül fejti ki hatását [144], azonban funkciója itt is a Dsh fehérjéhez köthető, ami a kanonikus és nem kanonikus Wnt jelátviteli utak közös komponense (13. ábra) [145].

A kémiai szinapszis általános felépítése és működése

A szinapszisoknak alapvetően két fajtája létezik: kémiai és elektromos. Mivel a legtöbb adat a kémiai szinapszisokra vonatkozik a sejtvászabályozást illetően, ezért a dolgozatban csak a kémiai szinapszisokkal foglalkozom. A szinapszisok intercelluláris kapcsolatok a preszinaptikus neuron és a posztzinaptikus sejt között. Az információ akciós potenciál (AP) formájában érkezik a preszinaptikus végződésre és kémiai jelátvivő anyag formájában adódik át a posztzinaptikus félre. A preszinaptikus végződésben a jelátvivő anyagok szinaptikus vezikulákba (SV) csomagolódnak. Amikor az AP kinyitja a feszültségfüggő Ca^{2+} csatornákat, akkor a jelátvivő anyagok, mint pl: a glutamát vagy az acetil-kolin (ACh) SV exocitózissal felszabadulnak a szinaptikus részbe, ahol aktiválják a posztzinaptikus denzitás által körülhatárolt receptorokat. Az SV exocitózis legnagyobb részt a preszinaptikus plazmamembrán egy kis részén történik, ahol egy elektrodenz fehérjekomplex található, amit aktív zónának nevezünk (14. ábra).

14. ábra A kémiai szinapszis felépítése és működése. Az ábra a www.scistyle.com webhelyről letöltve és módosítva.

A *Drosophila* NMJ, mint szinaptikus modellrendszer

Az *ecetmuslica* idegrendszerének a fejlődése során milliónyi szinaptikus kapcsolat alakul ki, amely az életben maradás elengedhetetlen feltétele. A szinaptikus kapcsolatok létrejöttéhez rendkívül bonyolult folyamatok összességére van szükség. Első lépésben az axon végződés környezeti jelek alapján megkeresi a célsejtjét, ahol annak növekedési kúpja morfológiai változásokon megy keresztül és kialakul a szinapszis. A szinapszisok stabilizálódása közben kialakulnak a preszinaptikus aktív zónák, ahol a neurotranszmitter molekulák felszabadulása történik. Mind az axon navigálás, mind a szinaptikus stabilizálódás során az aktin és mikrotubulus sejtvezeték dinamikusan átrendeződése figyelhető meg. A szinaptikus fejlődés tanulmányozására használt legsokoldalúbb és ezért legnépszerűbb kísérleti modellrendszer *Drosophilában* az ideg-izom vagy neuromuszkuláris kapcsolat (NMJ) [[147](#)].

A *Drosophila* NMJ-t az 1970-es években kezdték el vizsgálni [[148](#), [149](#)], majd a 80-as és 90-es években vált népszerű eszközzé a szinaptikus folyamatok tanulmányozásának [[150](#)]. Egyik legelőnyösebb tulajdonsága a *Drosophila* NMJ-nek, hogy megfelelően nagyméretű struktúra ahhoz, hogy a szinaptikus fejlődés legfontosabb szakaszait, például a sejtvezeték átrendeződéseket megfigyeljük. Mindamellett az NMJ-ket egyedi mintázatuk alapján könnyű azonosítani, és elektrofiziológiai méréseket is tudunk rajtuk végezni. A *Drosophila* NMJ, hasonlóan a gerincesekhez, serkentő kémiai szinapszis, viszont a gerincesekétől eltérően az ingerületátvivő anyag a glutamát és nem az ACh. A posztzinaptikus oldalon ionotróp glutamát receptorok (GluR) találhatóak, amelyek nagyfokú homológiát mutatnak az emlős agy AMPA-típusú glutamát receptoraival. A fent említett tulajdonságai miatt a *Drosophila* NMJ kiváló kísérleti eszköz a szinaptikus fejlődés tanulmányozására [[151-155](#)].

Az embrionális Drosophila NMJ kialakulása és fejlődése

A *Drosophila* NMJ rendszer a KIR részét képező motoraxonok és a testfalhoz tapadó izmok kapcsolódásainak, vagyis szinapszisainak az összességét jelenti. Ahhoz, hogy ez a jól felépített, szervezett struktúra létrejöjjön, a KIR-ből kiinduló axonoknak meg kell találniuk a célsejtjeiket. Ezt a folyamatot axon navigálásnak hívjuk, ami az embrionális fejlődés során megy végbe [[156-159](#)]. Embrióban a KIR-ből kilépő motoraxonokat 6 különböző csoportba sorolhatjuk a perifériás elágazási mintájuk alapján: interszegmentális (ISN, ISNb, ISNd), szegmentális (SNa és SNe) és transzverzális (TN). Az interszegmentális idegek túlnyomó

többsége a következő poszterior szegmentet idegzik be, míg a szegmentális idegek ugyanabban a szegmensben találhatók, mint a célsejtjeik (15. ábra) [156-160].

15. ábra Az embrionális neuromuskuláris rendszer felépítése. A ventrális idegkötegből kilépő motorneuronok többsége (ISN, ISNb, ISNd, TN) a target sejtjeikhez képest egy szegmenttel anterior irányba helyezkednek el, míg a szegmentális motorneuronok (SNa, SNc) sejttestei és végződéseik ugyanabban a szegmentben találhatók. Az ábra a [156]-os publikáció alapján módosítva.

Nagyon fontos, hogy a motoraxon a neki megfelelő elágazási mintát vegye fel, mert enélkül nem képes megtalálni a célsejtjét. A motoraxonok perifériás elágazási mintája genetikailag determinált, számos gént, illetve fehérjét ismerünk, amelyek képesek meghatározni az axon elágazási pontoknál a növekedés irányát. Például az Eve transzkripció faktor szükséges és elégséges az ISN ideg dorzális elágazásához [161].

A motoraxonok a növekedési kúpon filopódiumokat növesztenek a célsejtjeiknek a keresése során, amelyek képesek csápszerű képletekként letapogatni a környezetüket. Ehhez hasonlóan az izmok is filopódiumokat növesztenek (miopódium), amelyek több axon végződéssel is kapcsolatba kerülhetnek (16. ábra) [162, 163].

16. ábra A neuronális filopódium és a posztzinaptikus miopódium kapcsolódása (A) A szinapszisok stabilizálódásának sematikus ábrázolása. (B) Az ISNb axon végződés filopódiumai (magenta) eléri a posztzinaptikus izomsejt miopódiumait (zöld) majd összekapcsolódnak és létrejön a szinaptikus kapcsolat. Az ábra a [162]-es publikáció alapján módosítva.

A partner felismerési folyamat kölcsönös, mind a pre- mind a posztzinaptikus oldalon folyik a keresés [163]. Az egymásra találást a pre- és posztzinaptikus filopódiumokon található transzmembrán, ún. sejtadhéziós fehérjék (CAM, cell adhesion protein) segítik elő. Ha megtörtént a felismerés, a két oldal sejtadhéziós fehérjéi összekapcsolódnak, amit transzszinaptikus kapcsolatnak nevezünk. Számos, a sejtadhéziós molekulák között létrejövő transzszinaptikus kapcsolatot ismerünk, ezek közül a legismertebb a neurexin-neurologin kettős [160, 164].

Az embrionális fejlődés végére (13-15. stádium) a célsejtek keresése befejeződik és a létrejött neuromuszkuláris rendszer felépítése kisebb módosulásokkal megőrződik egészen a lárvális fejlődés végéig. A *Drosophila* embrió 8 abdominális szegmentjéből 6-ban (A2-A7) megfigyelhető, hogy minden egyes hemisegmentben körülbelül 40 motoraxon sztereotíp módon innervál 30 egyedi izmot (15. ábra). Ennek következtében az egyedi NMJ-k könnyen azonosíthatóak, mivel a motoraxon hálózat felépítése és az izmok elhelyezkedése jellegzetes mintázatot vesz fel [156-160].

Miután létrejött a transzszinaptikus kapcsolat, a posztzinaptikus oldalon a GluR és a Disc large (Dlg) fehérjék kifejeződése jelentős mértékben megnő. A Dlg (PSD-95 fehérje emlős homológja) nagyon fontos eleme a posztzinaptikus oldálnak, ahol képes elősegíteni más fehérjék kihorgonyozását, mint például a GluR-t. A Dlg fehérje jelenlétével elkezdődik a GluR klaszterek kialakulása. A GluR klaszterek kialakulásával párhuzamosan a preszinaptikus oldalon lévő növekedési kúp stabilizálódik és létrejön a preszinaptikus végződés. A preszinaptikus végben eközben jelentős strukturális változások történnek, a posztzinaptikus GluR klaszterekkel szemben kialakulnak a preszinaptikus aktív zónák, amelyek kerek vagy

ovális ún. szinaptikus boutonokban helyezkednek el. Az embrionális fejlődés végére néhány szinaptikus bouton jön létre az axon terminálison [165, 166].

A lárvális Drosophila NMJ fejlődése

A lárvális fejlődés egyik nagyon fontos jellemzője, hogy megfelelő táplálék jelenlétében az állat testmérete jelentősen megnő, így az izmok is. Az embrióból kikelő első stádiumos lárva testfal izmának a felszíne körülbelül százszor nagyobb lesz a lárvális fejlődés végére. Az izom növekedése során az NMJ mérete is nő, azáltal, hogy új boutonok képződnek az izmok felszínén.

17. ábra A lárvális NMJ anatómiája. (A) A *Drosophila* lárvális NMJ rendszer felépítése az A1-A6 szegmentig bezárólag (a 7. abdominális szegment nincs feltüntetve az ábrán). A *Drosophila* motoros rendszer minden egyes hemisegmentben 30 egyedi izomból (zöld) és az azokat beidegző körülbelül 40 motorneuronból (piros) épül fel. Az A1 szegmentet kivéve, az A2-A7 a testfalizmoknak minden egyes hemisegmentben sztereotíp mintázata van. (B) A KIR-ből (központi idegrendszer) kilépő motoridegek két legnagyobb csoportja a szegmentális (SN, piros) és az interszegmentális (ISN, sárga, fekete, kék) idegek az izmok területén (zöld) több elágazási pontot létrehozva kialakítják az NMJ-t. (C) Az ISNb motoraxon a 6/7 izmot, míg az SNa ideg a 4-es izmot idegzi be, amelyek a legnépszerűbb vizsgálati objektumai a szinaptikus fejlődés tanulmányozásának. A motoraxon végződés (piros) az izomnak a felszínén (zöld) szinaptikus boutonokat hoz létre, amelyek száma a lárvális fejlődés során folyamatosan növekszik. Az ábra a [157]-es publikáció alapján módosítva.

A boutonok képződésével párhuzamosan az aktív zónák száma is emelkedik a boutonon belül. Az új boutonok képződése valamint a boutonon belüli aktív zóna szám emelkedés, azt eredményezi, hogy egy adott NMJ-n belül a lárvális fejlődés során nagyjából százszorosára

emelkedik az egyedi aktív zónák száma, ami hatékonyabb ingerületátvitelt tesz lehetővé a megnövekedett testfalizmon [167-169]. A lárvális NMJ presznaptikus idegvégződése az izom felszínén elágazik, ahol létrehozza a gyöngyfüzér szerűen elhelyezkedő szinaptikus boutonok láncolatát. Megfigyelhető, hogy a különböző hemiszegekben ugyanazon izmokhoz tartozó NMJ-knek hasonló mintázata és kiterjedése van. Például a 3. stádiumos vándorló lárvában a 4-es izomhoz tartozó NMJ az A2-A7 hemiszegekben rendszerint Y alakú elágazási mintát vesz fel és körülbelül 20-25 szinaptikus boutont alakít ki az izom felszínén (17. ábra). Ez a sztereotíp tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a *Drosophila* genetika széles tárházát felhasználva megvizsgáljuk milyen gének, hogyan befolyásolják a szinaptikus fejlődés folyamatait [147, 157, 158, 170, 171].

18. ábra A *Drosophila* NMJ sejtív felépítésének sematikus ábrázolása. Az alsó panelen lévő 3 terminális bouton rendelkezik egy pre- és egy posztzinaptikus oldallal. A preszinaptikus oldal sejtív komponensei alapján 3 fő strukturális egységre osztható: a preszinaptikus membránt körülvevő kortikális Spektrin/aktin hálózat (piros), az NMJ központi mikrotubulus kötege (kék) valamint a kortikális aktin és központi mikrotubulus köteget összekötő Ankyrin hálózat (zöld). Az ábra a [176]-os publikáció alapján módosítva.

Ahhoz, hogy létrejöjjön az NMJ az izom felszínén a sejtív összehangolt, dinamikus átrendeződésére van szükség. Sejtív szerveződés szempontjából lényeges különbségek figyelhetők meg a preszinaptikus és posztzinaptikus oldalak között (18. ábra). Az érett

nagyméretű bouton (2-3 μm) esetében a posztzinaptikus oldal bonyolult membránrendszert (subs synaptic reticulum, SSR) hoz létre [172]. Ez a struktúra a lárvális fejlődés során lassan, fokozatosan alakul ki. Az újonnan kialakult szinaptikus bouton még csak egy membrán réteggel rendelkezik, majd később betűrődések alakulnak ki rajta. Ennek eredményeképpen a szinaptikus bouton egy több rétegű, nagy felszínnel rendelkező komplex membránrendszer veszi körül [172]. Az SSR funkciója pontosan nem ismert, egyesek szerint fenntarthatja a szinaptikus fejlődésben fontos fehérjék magas koncentrációját, mások szerint elősegítheti a molekulák gyors transzportját [173]. Az SSR egy elektrodenz, fehérjében gazdag struktúra, amelynek eddig két fontos szerkezeti egységét ismerjük. Az egyik a Dlg vázfehérje, amely az SSR membránjában található és fontos szerepe van a GluR klaszterek toborzásában [165, 166]. A másik a Spektrin/aktin hálózat, amely többek között a Dlg fehérjék kihorgonyzásában vesz részt [174-176]. Ezzel szemben, a preszinaptikus oldal 3 szerkezeti egységre osztható. Ezek: a preszinaptikus membránt körülvevő kortikális Spektrin/aktin hálózat, az NMJ központi mikrotubulus kötege valamint a kortikális aktin és a központi mikrotubulus köteget összekötő Ankyrin hálózat (18. ábra) [177]. A preszinaptikus oldalon fontos megemlíteni még a preszinaptikus aktív zónát. Elektronmikroszkópos felvételeken az aktív zóna egy elektrodenz T alakú struktúrát (T-bar) vesz fel, amelynek proximális része a preszinaptikus membránhoz rögzül, míg a disztális oldal kiszélesedik és számos SV veszi körül [146, 178-181]. Ma már tudjuk, hogy ennek az elektrodenz, fehérjében gazdag struktúrának egyik nagyon fontos vázeleme a Brp. A Brp egy hosszúkás, filamentáris fehérje, amelynek hiányában nem képződnek funkcionális aktív zónák. A nagy felbontású STED (super-resolution stimulated emission depleted) mikroszkópiának köszönhetően ma már ismert, hogy a Brp N-terminális része az aktív zóna proximális részén a preszinaptikus membránban lévő Ca^{2+} csatornához rögzül (19. ábra B, C), míg a Brp C-terminális része az aktív zóna disztális kiszélesedő részén található (19. ábra A, C). A megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy az elektrodenz T-bar egyik fő komponense a Brp lehet [182-185]. A Brp-n kívül még a Syd-1 és a Liprin- α (Syd-2) is fontos elemei az aktív zóna összeszerelésnek [186-188]

19. ábra A *Drosophila* preszinaptikus aktív zóna felépítése. (A) A STED mikroszkópos képeken az aktív zóna szerveződésének a vizsgálata látható anti-Brp C-term (zöld) és anti-Brp N-term (magenta) ellenanyagok használatával. A felülnézeti képeken a Brp C-term mintázata körülöleli a Brp N-term jelet. (B) A STED mikroszkópos felvételeken az aktív zóna szerveződésének a vizsgálata látható anti-Brp C-term és anti-Ca²⁺ csatorna ellenanyagok használatával. A Ca²⁺ csatorna lokalizációja szinte teljesen átfed az anti-Brp N-term immunfestéssel (C) Az aktív zóna szerveződésének a sematikus modellje. Az aktív zónák összeszerelődésében a Brp és a Liprin- α egyaránt kulcsfontosságú. A filamentáris szerkezetű Brp N-terminális része a preszinaptikus membránnál található Ca²⁺ csatornához rögzül, míg a fehérje C-terminális része az aktív zóna disztális részén elősegíti az SV-k toborzását. Az aktív zónával szemközt a posztzinaptikus oldalon a GluR (GluRII, GluRIII) komplex található. Az ábra a [184]-es publikáció alapján módosítva.

Az aktin sejtváz szerepe és szabályozása a szinaptikus fejlődés során

Miután az axon végződés megtalálta a megfelelő célsejtet, az axon növekedési kúpja arborizációt hoz létre a célsejten, ami általában megelőzi a szinaptikus fejlődést. Az axonális arborizáció rövid, elágazó struktúrák összessége, amelyeken találhatóak a boutonok és az azokon lévő szinapszisok [189]. Mivel az axon arborizáció létrehozása és a szinaptikus fejlődés térben és időben nagyon közel történik, úgy gondoljuk a sejtek számos elemében ugyanazokat a sejtvázszabályozási mechanizmusokat használják ezekben a folyamatokban [190, 191]. Irodalmi adatok alapján a preszinaptikus aktin sejtváznak fontos szerepe lehet a szinaptikus kapcsolatok létrehozásában, ugyanis latrunculin-A (aktin depolimerizáló szer) kezelés hatására

fejlődő szinapszisokban a preszinaptikus összeszerelődés súlyosan érintett, ami egyben a szinapszisok számának csökkenését is okozza [192, 193].

Az aktin nukleátorok katalizálják az aktin filamentumok gyors összeszerelődését [8, 9], amelyek elméletileg elősegíthetik a terminális arborizáció struktúráinak létrejöttét. Emlősökben két aktin nukleátort ismerünk, amely részt vesz ezekben a folyamatokban. Az egyik a Cobl [34], amely a nem elágazó aktin filamentumok kialakításáért felelős, míg a másik az Arp2/3 komplex [194], amely eltérően a Cobl fehérjétől az elágazó aktin struktúrákat hoz létre. Az aktin nukleáció nem minden esetben segíti elő a terminális arborizációt, ugyanis az Arp2/3 komplex képes azt gátolni is. Az Arp2/3 aktivitása nagymértékben függ az ő aktivátoraitól (NPF), mint pl a WASP fehérje. Az NPF fehérjék a plazmamembránhoz lokalizálódnak és a Syndapinok képesek ott aktiválni őket. Ha az Arp2/3 elősegítené a terminális arborizációt, akkor azt várnánk, hogy a Syndapin hiánya kevesebb bouton eredményezne, pedig ennek pont az ellenkezője történik [195]. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az aktin nukleációs faktorok paradox módon képesek elősegíteni és gátolni is a terminális arborizációt celluláris kontextustól függően. Valószínűleg ebben az esetben az elágazó aktin filamentumok visszatartják a mikrotubulusok növekedését, így kevesebb terminális ág jön létre az axon végződésen [194, 195]. *Drosophilában* eddig két aktin nukleációs faktorról (Dia, Arp2/3) tudjuk, hogy szerepet játszik az NMJ terminális kialakulásában. A Dia [196] és az Arp2/3 [197] hiányában boutonok számának a csökkenése és abnormalis aktin szerveződés figyelhető meg, ami arra utal, hogy a fehérjék aktin nukleációs aktivitása szükséges a boutonok képződésében. Fontos megemlíteni még a kortikális Spektrin/aktin hálózatot. A legtöbb sejtben a kortikális membrán aktin sejtváza heterotetramer α - és β -Spektrin molekulákból áll, amelyeket rövid aktin filamentumok kötnek össze. A fejlődő *Drosophila* idegrendszerben mindkét Spektrin kifejeződik és a fehérjék hiányában súlyos NMJ fejlődési hibák alakulnak ki [174-176]. Ezzel összhangban, egerekben a β -SpektrinIII hiánya súlyos szinapszis képződési abnormalitásokat okoz [198, 199].

Az aktív zóna egy fehérjében gazdag struktúra, amelynek elsődleges funkciója a szinaptikus vezikulák toborzása és felszabadítása. Az aktív zóna összeszerelődés folyamatairól még elég hiányosak az ismereteink, de azt tudni lehet, hogy számos fehérje (Brp/ELKS-1, RIM, SYD-1, SYD-2/Liprin- α , Piccolo/Fife, Bassoon) részt vesz a fehérjekomplex kialakításában [146, 200]. Azt korábban már ismertük, hogy az aktin filamentumok gyűrűszerű struktúráként körbeveszik az SV-eket és az aktív zónákat patkány idegsejtekben, viszont arról nem volt ismeretünk, hogy részt vesznek-e az aktív zónák összeszerelődésében [201]. *C.elegans*-ban azonban bemutatták, hogy a neurabin homológ NAB-1 a szinapszisképződés során szükséges ahhoz, hogy az F-aktin hálózatot összekapcsolja a SYD2 és SYD-1 aktív zóna összeszerelő

fehérjékkel [202]. *Drosophila*-ban pedig a Nwk-ról (Nervous Wreck) tudjuk, hogy irányítja az aktív zóna összeszerelődést az aktin sejtváza szabályozása által. *nwk* mutánsokban kevesebb aktív zóna és csökkent szinaptikus transzmisszió figyelhető meg. Az Nwk az elágazó aktin filamentumok szabályozásáért felelős, ugyanis bemutatták, hogy az Nwk a Wasp és az Arp2/3 komplex-szel direkt kölcsönhatásban van, illetve a Wasp és az Nwk erős kolokalizációt mutat egymással a preszinaptikus oldalon [203]. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az aktin az aktív zóna összeszerelődés upstream eleme. Ezzel összhangban emlős fiatal szinapszisokban a preszinaptikus F-aktin depolimerizációja az aktív zóna protein Bassoon klaszterek eltűnését okozza [192]. Érdekes, hogy az aktív zóna fehérjék is képesek befolyásolni a preszinaptikus aktin organizációt. A Piccolo emlős szinapszisokban számos aktinkötő fehérjével kölcsönhatásba kerül és platformot biztosít a térbeli aktin filamentumok kialakulásának az aktív zóna környékén. Patkány idegsejtekben az aktivált DAAM1 (formin típusú aktin nuklátor) a Piccolo-hoz kötődik, amely interakció irányítja az F-aktin összeszerelődést. DAAM1 hiányos neuronokban a preszinaptikus F-aktin szerveződés súlyosan érintett. Összességében a Piccolo által irányított folyamatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az aktin szerveződésben egy visszajelzési mechanizmus valósuljon meg az aktív zóna összeszerelődés során [204-206].

A posztszinaptikus oldalon lévő aktin sejtváznak is fontos szerepe van a szinapszisképződésben. Az emlősök agyában a serkentő szinapszisok többségében a posztszinaptikus oldalon dendrittüskék találhatók, amelyek morfológiai szempontból sokszínű, aktinban gazdag struktúrák. A tüskék sejtváza szerveződésében a hatalmas elágazási rendszerrel rendelkező aktin filamentumok a dominánsak. Ezenkívül a dendrittüskékben nagymennyiségű monomerikus G-aktin is található, amely biztosítja az aktin utánpótlást a dinamikus sejtváza-átrendeződésekhez [207, 208]. Az aktin filamentumok kialakításában 3 fontos aktin összeszerelő faktort azonosítottak: az Arp2/3 komplexet, a forminokat és a profilint. Ezek közül talán a legjelentősebb az Arp2/3 komplex, amelynek szüksége van természetesen az NPF fehérjékre is, mint pl. N-Wasp, WAVE, WASH stb. Az Arp2/3 és az NPF fehérjék hiányában súlyos morfológiai változások figyelhetők meg a dendrittüskékben [209, 210]. A forminokra is szükség van a dendrittüskékben, ugyanis a dendrittüskék felszínén kialakulhatnak filopódia-szerű nyúlványok, amelyekben párhuzamosan futó nem elágazó aktin filamentumok találhatók [211, 212]. A profilin pedig az Arp2/3 komplex és a forminok számára biztosítja a nagymennyiségű monomerikus G-aktint a polimerizáció helyszínén [213, 214]. *Drosophila*-ban a posztszinaptikus rész aktin sejtvázaról és annak szabályozásáról eddig nem sokat tudunk, de az biztosnak tűnik, hogy a Spektrin/aktin hálózat fontos a

posztzinaptikus rész felépítésében [171, 174, 175], valamint szerepet játszik a Dlg-vel együtt a GluR klaszterek kialakításában [166].

A mikrotubulusok szerepe és szabályozása a szinapszisok kialakulásában

A mikrotubulusok alapvető sejtvázas elemek a neuronokban. Részt vesznek az axon növekedésben, az intracelluláris transzportban és a sejthalak fenntartásban [95, 215]. Emlősökben eddig elég keveset tudunk arról, hogy a preszinaptikus mikrotubulusoknak mi a funkciója. *Drosophila*-ban számos gént ismerünk, ami befolyásolja a preszinaptikus mikrotubulus szerveződését [147]. A legismertebb ezek közül a Futsch, amely az emlős MAP1B *Drosophila* ortológja. A MAP1B-hez hasonlóan egy mikrotubulus asszociált fehérje, amely képes a mikrotubulusokhoz kötődni. A fehérje hiányában a központi mikrotubulus köteg fragmentálódik, ami az NMJ-ben csökkent bouton számot eredményez [122, 123]. Ezek alapján valószínűleg a Futsch az NMJ-ben elősegíti a mikrotubulusok stabilizálódását. A korábban említett DRF formin a Dia is befolyásolja a mikrotubulus organizációt az NMJ-ben valószínűleg a Dlar és a Trio által szabályozott jelátviteli útvonal effektor fehérjéjeként [196]. A *dia* mutáns szinapszisokban a pionír mikrotubulusok (+) vég dinamikája jelentős mértékben megváltozik. A Dia valószínűleg a pionír mikrotubulusok (+) végét képes stabilizálni, amely elősegítheti a bouton képződését. Mivel a Dia az aktin organizációt is befolyásolja az NMJ-ben, ezért nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a Dia a mikrotubulus (+) véget stabilizáló hatása közvetett [196]. A következő fehérje a kizárólag idegrendszerben kifejeződő Ank2, amely egy óriási adaptor molekula. Az Ank2 legismertebb funkciója, hogy összeköti a kortikális Spektrin/aktin hálózatot a központi mikrotubulus köteggel. Az Ank2 hiánya súlyos problémákat okoz a mikrotubulus szerveződésben, az NMJ terminális részén a mikrotubulusok gyakran hiányoznak, míg az NMJ középső harmadában hatalmas mikrotubulus felhalmozódások figyelhetők meg [216-218]. Végül a kanonikus Wnt szignalizáció bizonyos tagjairól is tudjuk, hogy részt vesznek a szinaptikus bouton képződésben a mikrotubulusok szabályozása által [219, 220]. A *Drosophila* NMJ preszinaptikus oldalán a divergens kanonikus Wnt útvonal működik (20. ábra), ami eltérően a kanonikus útvonaltól β -katenin független és nem befolyásolja a Wnt célgének transzkripcióját. Wnt hiányában a Gsk3- β (*Drosophila* Shaggy vagy Sgg) foszforilálja a mikrotubuluskötő Futsch fehérjét, ami olyan változást okoz a mikrotubulus szerveződésben, ami csökkenti a szinaptikus bouton képződést. Ezzel szemben Wnt jelenlétében a Fz2 receptor és az Lrp5/6 (*Drosophila* Arrow) ko-receptor komplex aktiválja a Dsh fehérjét, gátolva az Sgg függő Futsch foszforilációt [221], ami stabilizálja a

mikrotubulusokat, ezzel elősegítve az új boutonok létrejöttét [219, 220, 222]. Az utóbbi időben az is kiderült, hogy egy ismeretlen molekuláris mechanizmus által az Ank2 szintén a Wnt jelátvitel szabályozása alatt áll és valószínűleg ebben az útvonalban együttműködik a Futsch-csal [223]. Ha episztázis analízisben vizsgáljuk a *futsch*; *Ank2* kettős homozigóta mutáns állatokat, akkor az tapasztalható, hogy a Futsch hiánya képes szuppresszálni az Ank2 mikrotubulus aggregációs fenotípusát. Valószínűleg a Futsch mikrotubulus stabilizáló funkciója szükséges ahhoz, hogy mikrotubulus aggregátumok létrejöjjenek az *Ank2* mutáns állatokban. A hierarchia viszony nem egyértelmű a két fehérje között, mert a *futsch*; *Ank2* kettős homozigóta mutánsok NMJ fenotípusa eltér a *futsch* egyes mutánsokétól [218].

20. ábra A divergens Wnt kanonikus jelátviteli útvonal feltételezett működése *Drosophila* NMJ-ben. A preszinaptikus oldalon lévő Wnt szignalizáció befolyásolja a mikrotubulus szerveződést elősegítve ezzel az új boutonok létrejöttét. Az ábra a [219]-es publikáció alapján módosítva.

A posztzinaptikus mikrotubulus organizációról eddigi ismereteink alapján nem sokat tudunk. Az emlős dendrittuskében korábban nem sikerült detektálni sem a mikrotubulusokat sem a mikrotubuluskötő fehérjéket [224]. Néhány közleményben volt utalás arra, hogy a mikrotubulusok megtalálhatóak a tuskékban, de egyértelmű bizonyíték nem volt rá. Néhány

éve azonban több független irodalmi adat is megjelent arról, hogy a mikrotubulus (+) vége képes belépni a dendrittüskékbe [225-227]. Ezenkívül azt is találták, hogy a mikrotubulus (+) vége képes szabályozni az F-aktin szintet, ami létfontosságú a dendrittüske morfológiájának a megőrzésében [227]. Ezeket az eredményeket megerősíti az, hogy a mikrotubulus (+) végkötő EB3 fehérje csendesítése nagymértékben csökkentette hippocampális idegsejtkultúrákban a dendrittüskék számát [225, 227]. Mindent egybe véve úgy tűnik, hogy a szinaptikus sejtvez és funkció a dendrittüskékben érzékeny a mikrotubulus dinamika változásaira. *Drosophila* ismereteink nagyon szegényesek a posztszinaptikus mikrotubulusok vonatkozásában, valószínűleg a Spektrin/aktin hálózat és a mikrotubulusok között van valamilyen kapcsolat, de ennek funkciójáról, illetve jelentőségéről szinte semmit sem tudunk [176].

CÉLKITŰZÉSEK

A dDAAM formin típusú sejtvázsabályozó fehérje idegrendszeri funkcióját néhány évvel ezelőtt kezdtük el vizsgálni. A kísérleteink során megállapítottuk, hogy a dDAAM nagy mennyiségben kifejeződik az adult idegrendszerben, legfőképpen az agy nyúlványban és szinapszisban gazdag neuropil régiójában. Továbbá az is kiderült, hogy a dDAAM az aktin összeszerelő aktivitása révén szerepet játszik az axon növekedés és navigáció folyamataiban. Később számos bizonyítékot adtunk arra vonatkozólag, hogy a dDAAM képes közvetlenül kötődni a mikrotubulusokhoz, valamint szerepe lehet az aktin/mikrotubulus kölcsönhatások elősegítésében. Folytatva tovább ezt a munkát, a következő célokat tűztük ki a kísérleteink során:

1. Tömegspektrometriai módszerekkel azonosítani a dDAAM lehetséges idegrendszer-specifikus kötőpartnereit.
2. Megvizsgálni, hogy a dDAAM a sejtvázsabályozás egyik fontos szereplőjeként részt vesz-e a szinaptikus fejlődésben.
3. Felderíteni a dDAAM szerepét a szinaptikus fejlődés során végbemenő sejtvázátreendeződési folyamatokban.
4. Genetikai interakciós vizsgálatok segítségével kideríteni, hogy milyen jelátviteli útvonalakkal állhat kapcsolatban a dDAAM az NMJ kialakulása során.
5. Megvizsgálni, hogy a dDAAM szerepet játszik-e a szinaptikus aktív zónák létrejöttében.
6. Elektrofiziológiai módszerekkel megvizsgálni, hogy a dDAAM hiánya befolyásolja-e szinaptikus transzmisszió hatékonyságát.

EREDMÉNYEK

A dDAAM kölcsönható partnereinek azonosítása központi idegrendszerből

A dDAAM formin fehérje idegrendszeri funkciójának jobb megértéséhez biokémiai eszközökkel próbáltuk kideríteni, hogy a dDAAM milyen fehérjekomplexek tagja lehet. Ehhez egy nagy léptékű affinitástisztítást végeztünk, amelynek eredményét tömegspektrometriai módszerekkel analizáltuk. Az affinitástisztításnak számos módja létezik attól függően, hogy milyen oszlopot használunk a fehérjék kikötéséhez. A mi választásunk az anti-Flag oszlopra esett, mert mások tapasztalatai alapján kellően specifikus, illetve egyszerű és könnyű vele dolgozni. Az anti-Flag tisztításhoz szükségünk volt olyan dDAAM fúziós fehérjére, amely Flag taggal van ellátva. A tag egy olyan fehérjerészlet, amely lehetővé teszi, hogy a cél fehérjénk felismerhetővé váljon, így egy komplex szöveti mintából a feltárás után specifikusan ki tudjuk húzni a fehérjénket és szerencsés esetben a kölcsönható partnereit is.

A tag sok esetben befolyásolhatja a fehérje konformációját és működését attól függően, hogy a fehérjerészlet a célfehérje N- vagy C-terminálisán helyezkedik el, így úgy döntöttünk, hogy létrehozunk N-terminálisan (3xFlag::FLDAAM) és C-terminálisan tagelt (FLDAAM::3xFlag) teljes hosszúságú (FL) DAAM fúziós fehérjéket. A tageléshez 3xFlag taget használtunk, hogy megnöveljük a tisztítás specificitását és hatékonyságát. A fúziós fehérjék funkcionális vizsgálatához menekítési kísérleteket végeztünk, ahol az UAS/Gal4 rendszert használtuk, amely lehetővé teszi, hogy egy adott szövetben vagy minden szövetben kifejezzük a fúziós fehérjéket.

A menekítési kísérletekben arra voltunk kíváncsiak, hogy a dDAAM null mutáns allél letális fenotípusát képesek-e menekíteni a dDAAM fúziós fehérjéket kifejező *UAS-3xFlag-FLDAAM* és *UAS-FLDAAM-3xFlag* transzgének általános (*da-Gal4*) drivert használva. Azt tapasztaltuk, hogy az *UAS-3xFlag-FLDAAM/+; da-Gal4/+* kombináció nem menekítette a *dDAAM^{Ex68}* letális fenotípusát, azonban az *UAS-FLDAAM-3xFlag; da-Gal4/+* kombináció képes volt erre. A menekítési kísérletek azt mutatták, hogy a dDAAM N-terminális végén található Flag tag befolyásolja a fehérje funkcióját, viszont a C-terminális végén nem, ezért a FLDAAM::3xFlag fúziós fehérje alkalmas lehet az anti-Flag affinitástisztítás elvégzéséhez. Olyan mutáns törzseket hoztunk létre, amelyek kifejezik az FLDAAM::3xFlag fehérjét. A fúziós fehérje túltermelése esetén a következő lehetséges problémák merülhetnek fel: Először, ha vad típusú háttérben termeljük túl a FLDAAM::3xFlag fehérjénket, akkor az endogén

dDAAM fehérje képes kompetálni a kötőpartnerért a fúziós fehérjével. Másodszor, a túltermeléssel olyan nagymértékben lesz jelen a FLDAAM::3xFlag fehérje, hogy képes lehet más fehérjékkel aspecifikusan kapcsolatot kialakítani.

A fentebb említett problémák elkerülése végett az affinitástisztításhoz két különböző törzset hoztunk létre. Az első törzs esetében egy olyan hipomorf *dDAAM* mutáns háttéren termeltük túl a fehérjét (*dDAAM^{Ex1}; UAS-FLDAAM-3xFlag/+; act-Gal4/+*), amelyben az endogén dDAAM fehérje szintje jelentős mértékben alacsonyabb a vad típushoz képest, így elkerüljük azt, hogy az endogén fehérje elvegye a lehetséges kötő partnereket. A második törzsnél egy bonyolultabb megközelítést alkalmaztunk. A *dDAAM* genomikus környezetében génkonverziós technika alkalmazásával egy C-terminálisan 3xFlag tagelt „knock-in” allélt (*dDAAM^{3xFlag}*) hoztunk létre, ami azt eredményezte, hogy a dDAAM az összes a Flybase adatbázis által prediktált izoformája 3xFlag taget hordoz a fehérje C-terminális végén (21. ábra).

21. ábra A *dDAAM^{Flag}* knock-in allél felépítése a *dDAAM* genomikus környezetében. A *dDAAM* gén 3' végére a STOP kodon helyére beépítettünk 75 extra nukleotidot, amely a 3xFlag tag szekvencia részletet és a STOP kodont foglalja magába.

A létrehozott *dDAAM^{3xFlag}* allél homo- és hemizigóta formában életképes, valamint a fúziós fehérje szintje közel azonos a vad típuséval, ami megerősíti a korábbi eredményeinket, vagyis hogy a dDAAM::3xFlag fehérje funkcionálisan aktív és ezáltal alkalmas lehet a fehérje tisztítás elvégzésére (22. ábra).

22. ábra A dDAAM fehérje kifejeződési szintje a $dDAAM^{Flag}$ mutáns állatokban (A-B) A dDAAM fehérje mennyiségének vizsgálata Western blottal. Az anti-p94 ellenanyagot belső kontrollként használtuk. (A) Az anti-dDAAM-R4 Western blot alapján a dDAAM::Flag kifejeződése közel azonos a vad típushoz képest. (B) Az anti-Flag Western blot egyértelműen jelzi, hogy a dDAAM::Flag fehérje csak a $dDAAM^{3xFlag}$ állatokban fejeződik ki, a kontrollban (w^{118}) nem.

Az affinitástisztítás elvégzése során adult fejeket tártunk fel 3 különböző mintából kiindulva, ami a két dDAAM fúziós fehérjét kifejező vonalat ($dDAAM^{Ex1}; UAS-FLDAAM3xFlag/+; act-Gal4/+$ és $dDAAM^{3xFlag}$) és a vad típusú kontrollként használt (w^{118}) törzset jelenti. A vad típusú kontroll minta az oszlophoz és az anti-Flag ellenanyaghoz aspecifikusan kikötődött fehérjék kizárására szolgált.

Uniprot ID	Fehérje	egyedi peptid	Σ peptid
M9MSM5	DAAM**	147	2771
Q9W596	Futsch*	24	37
Q9NFU0	FMR1*	5	10
Q7KU92	Ankyrin2**	5	9
P18431	Shaggy*	3	4

23. ábra A dDAAM lehetséges kötőpartnereinek MS analízissel történő azonosítása A tisztítást követően a dDAAM::Flag fúziós fehérjét tartalmazó fehérjekomplexeket MS analízissel vizsgáltuk. Lehetséges dDAAM kötőpartnerként számos szinaptikus és mikrotubuluskötő fehérjét azonosítottunk. * azokat a fehérjéket jelöli, amelyek csak az anti-Flag mintában azonosíthatóak a kontrollban (w^{118}) nem. ** jelöli azokat a fehérjéket, amelyeknek a relatív mennyisége legalább kétszerese a kontrollhoz képest. A fehérjék relatív mennyisége az egyes mintákban megbecsülhető az ún. spektrumszámlálás módszerével. Ehhez először meghatározzuk, hogy az adott mintasorozaton belül egy adott fehérjére összesen hány azonosított peptid esik, illetve ezt a számot elosztjuk az összes azonosított peptidszámmal. A kapott hányados mintasorozatok közötti összehasonlításával megbecsülhető az adott fehérje mennyiségi változása, ha a normalizált peptidszámok hányadosa a medián érték 0.5*-énél kisebb vagy 2*-énél nagyobb, akkor tekintjük mérvadónak a változást. Azokat a fehérjéket tekintettük pozitív találatnak, amelyeket legalább 3 egyedi peptiddel azonosítottunk a dDAAM::Flag-et tartalmazó mintában.

A 3 különböző mintából származó fehérjéket eluáltuk az anti-Flag oszlopról, majd ezt követően tömegspektrometriai (LC/MS-MS) vizsgálatnak vetettük alá. Az LC/MS-MS vizsgálatok után azokat a fehérjéket tekintettük lehetséges dDAAM kötőpartnernek, amelyek a kontroll mintában, nem vagy csak kis mennyiségben azonosíthatóak szemben a fúziós fehérje mintákkal, ahol ezeknek a fehérjéknek a mennyisége jelentősen megnő. Meglepetésünkre a dDAAM lehetséges kötőpartnerei között számos szinaptikus (Futsch, Ank2, Sgg, FMR1) és/vagy mikrotubulus szabályozásban résztvevő (Futsch, Shaggy) fehérjét azonosítottunk (23. ábra). A biokémiai kísérletek után úgy döntöttünk érdekes lenne megvizsgálni, hogy a dDAAM a sejtvázaszabályozás egy fontos szereplőjeként részt vesz-e a szinaptikus fejlődésben vagy a szinaptikus működésben.

A dDAAM fehérje szerepének vizsgálata az embrionális szinapszisképződésben

A szinapszisképződés folyamatainak vizsgálatához elsősorban a lárvális NMJ-t választottuk mint szinaptikus modellrendszert, de érdekesnek tartottuk megvizsgálni azt is, hogy részt vesz-e a dDAAM a szinapszisképződés korai folyamataiban. Ehhez 15-17 stádiumos embriókat választottunk, amelyekben a motoraxonok felismerik a célsejtjüket és elkezdődik a szinapszisok érése. Először megvizsgáltuk azt, hogy a dDAAM fehérje kifejeződik-e az embrionális motoraxonok terminálisainál. A vizsgálatainkhoz az anti-FasciclinII (FasII) ellenanyagot választottuk embrionális motoraxon markerként (24. ábra B), amely nagymértékű kolokalizációt mutatott a dDAAM fehérje mintázattal mind az embrionális KIR területén, mind az idegek perifériás végződésénél, ahol az NMJ található (24. ábra C). Ezenkívül a mikroszkópos felvételeken az is egyértelműen látszik, hogy a dDAAM a preszinaptikus idegvégződés mellett a posztzinaptikus izomsejtben is jelen van (24. ábra A), ami jelzi azt, hogy a dDAAM pre- és posztzinaptikus kifejeződést egyaránt mutat. A lokalizációs eredményeket megerősítve funkcionális vizsgálatokat is végeztünk, ahol a *dDAAM* null mutáns alléljának (*dDAAM^{Ex68}*) hatását vizsgáltuk szintén 15-17 stádiumú embrionális NMJ-ken. A funkcióvesztéses analízishez a 6/7 és a 12/13 izmokhoz tartozó ISNb axon végződést vizsgáltuk. A vizsgálatok alapján a *dDAAM^{Ex68}* mutáns embriók 63%-a mutatott motoraxon navigálási vagy növekedési hibát az NMJ terminálisoknál, ami egyértelműen jelzi, hogy a dDAAM szükséges már a szinapszisképződés korai folyamataiban is (25. ábra).

24. ábra A dDAAM expressziós mintázata az embrionális központi idegrendszer területén. (A-C) A dDAAM kifejeződésének vizsgálata 15. stádiumú kontroll (w^{1118}) embriókon anti-dDAAM-R4 immunfestéssel (A, C). A dDAAM nagymértékű kolokalizációt mutat a Fas II motorneuron specifikus fehérjével (B, C) beleértve az axon terminális régióját is (kinagyítva a fő panelek alatt). A skála mérete: 20 μm (A-C), 10 μm (A-C a kinagyított képeken).

25. ábra A dDAAM fehérje szükséges az embrionális NMJ képződéshez. (A) A vad típusú embriók több mint 90%-ban (C) a Fas II pozitív ISNb motoraxonok a 6/7 és 12/13 izmoknál szinaptikus végződéseket hoznak létre (fekete nyilak). (B) Az ISNb axon terminálisok dDAAM hiányában korai terminációkat vagyis axon navigálási hibákat (fehér nyilak) mutatnak a mutáns embriók 63%-ban (C). Továbbá a $dDAAM^{Ex68}$ mutáns ISNb motoraxonok esetében növekedési hibák is gyakran előfordulnak, amit jelez az erős FasII felhalmozódás (piros nyíl). A skála mérete: 20 μm (A-B). *** $p < 0.001$. $n \geq 100$ (C).

A dDAAM fehérje szükséges a lárvális NMJ képződéshez

Ahogy az a bevezetőben is említésre került, a lárvális növekedés legnagyobb kihívása, hogy az NMJ-k képesek legyenek követni az izomméret nagymértékű növekedését a szinaptikus transzmisszió hatékonyságának csökkenése nélkül. Ehhez a bouton és az aktív zóna képződés folyamatainak szigorú koordinálására van szükség. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a dDAAM érintett-e ezekben a folyamatokban, megnéztük a dDAAM fehérje kifejeződését az NMJ terminálisoknál. A szinaptikus végek megjelenítéséhez az anti-HRP preszinaptikus membrán markert és az anti-Dlg posztszinaptikus markert használtuk. A mikroszkópos vizsgálatok alapján, hasonlóan az embrionális kifejeződési mintához, a dDAAM a pre- és a posztszinaptikus oldalon egyaránt kifejeződik (26. ábra A), ahol túlnyomó részt kortikális feldúsulást mutat. A lárvális NMJ-ben megfigyelhető dDAAM kortikális felhalmozódása a *dDAAM* null mutáns állatokban szinte teljesen eltűnik (26. ábra B), ami arra utal, hogy az anti-dDAAM-R4 ellenanyag specifikus az NMJ terminálisban.

26. ábra A dDAAM nagymértékben kifejeződik a lárvális NMJ pre- és posztszinaptikus oldalán. (A-B) A konfokális képeken anti-HRP (magenta), anti-Dlg (cián) és anti-dDAAM-R4 (zöld) immunfestésekkel vizsgáltuk a lárvális 4-es izom NMJ végződését. (A) A vad típusú állatokban a dDAAM erős kortikális felhalmozódást mutat a pre- és posztszinaptikus oldalon egyaránt. (B) A *dDAAM^{Ex68}* mutáns NMJ-ben az anti-dDAAM-R4 immunfestés szinte teljesen eltűnik, ami az ellenanyag specifikusságára utal. A skála mértéke: 5 μ m.

A lokalizációs után funkcionális vizsgálatokat terveztünk. Összhangban az embrionális NMJ analízissel funkcióvesztéses vizsgálatokat végeztünk a *dDAAM*^{Ex68} amorfnek tekintett alléljával. Fontos megemlíteni, hogy a *dDAAM* gén citológiaiilag az X kromoszómára térképeződik, ezért hemizigóta *dDAAM*^{Ex68} null mutáns állatokkal dolgoztunk, amelyek nagyobb része korai stádiumú lárvaként elpusztul, viszont néhány egyed eléri a 3. lárvális stádiumot csökkent test- és izomméret kíséretében. Figyelembe véve, hogy az izomméret az NMJ fejlődés egyik kulcs tényezője, hasonló méretű 2. stádiumú vad típusú, illetve *dDAAM* mutáns lárvákat vizsgáltunk, amelyekben az ugyanolyan típusú izmok felszíne nagymértékben megegyezett egymással (27. ábra I, J). Anti-HRP és anti-Dlg szinaptikus markereket használva azt tapasztaltuk, hogy a 4-es izomhoz tartozó NMJ szinaptikus boutonainak száma 35%-kal alacsonyabb a *dDAAM* null mutánsban a vad típushoz képest (27. ábra A, B, G). Hasonló bouton szám csökkenést tapasztaltunk a *dDAAM* mutáns 6/7 izom NMJ terminálisainál (27. ábra D, E, H), ami arra utal, hogy a *dDAAM*-nak általános szerepe lehet az NMJ fejlődésben. A *dDAAM* mutánsban látható bouton szám csökkenést az NMJ terminális hosszának csökkenése is kíséri a 4-es és 6/7 izomnál egyaránt (27. ábra K,L), ami megerősíti azt a feltételezésünket, hogy a *dDAAM*-nak szerepe van az NMJ terminális kialakulásában. A további kísérleteinkben csak a 4-es izomhoz tartozó NMJ-t vizsgáltuk annak egyszerű Y alakú struktúrája és könnyű azonosíthatósága miatt. Habár a 2. stádiumos lárvák vizsgálatából származó eredmények egyértelműnek tűntek, a funkcióvesztéses kísérleteinket ki akartuk terjeszteni vándorló 3. stádiumos állatokra is, ugyanis a dinamikusan növekvő 2. stádiumos lárvához képest a jóval nagyobb méretű 3. stádiumos NMJ egy finomabb és részletesebb vizsgálatot tesz lehetővé. Korábbi eredményeink alapján tudjuk, hogy a *dDAAM* fontos szerepet játszik a trachea kutikula mintázat kialakításában [228], ezért úgy gondoltuk, hogy a *dDAAM*^{Ex68} null mutáns állatokban megfigyelhető trachea fenotípus egy olyan hipoxiás állapotot idéz elő, ami felelős lehet az állatok csökkent testméretért és letalitásáért.

27. ábra A dDAAM hiánya bouton szám csökkenést és rövidebb NMJ végződést eredményez.

(A-F) Anti-HRP és anti-Dlg NMJ immunfestések második fejlődési stádiumú lárvák 4-es (A-C) és 6/7-es (D-F) izmainál vizsgálva a kontroll (w^{1118}) (A, D), $dDAAM^{Ex68}$ (B, E) és $dDAAM^{Ex68}; NR$ ($dDAAM^{Ex68}/Y; UAS-FLDAAM/+; D42-Gal4/+$) (C, F) genotípusokat. Az NMJ terminálisok morfológiáját a 4-es és 6/7-es izmoknál a bouton szám (G, H) az izomfelszín (I, J) és az NMJ hossz (K, L) függvényében jellemeztük a fent említett genotípusokban $n \geq 25$. A skála mértéke: 5 μm (A-F). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével (G-L). *** $p < 0.001$

A trachea fenotípus menekítéséhez *dDAAM^{Ex68}* null mutáns háttéren a dDAAM teljes hosszúságú formáját tracheaspecifikus szabályozás alatt álló driverrel (*btl-Gal4*) túltermeltük, létrehozva ezzel (*dDAAM^{Ex68} /Y; btl-Gal4, UAS-FLDAAM/+*) mutáns kombinációt, amit a későbbiekben *dDAAM^{Ex68} ;TR*-ként fogok hivatkozni. Az elvártaknak megfelelően a *dDAAM^{Ex68} ;TR* állatokban szakadásmentes, vad típusra emlékeztető trachearendszer alakult ki, amely menekítette az *dDAAM^{Ex68}* null mutáns állatok csökkent test- és izomméretét, valamint letális fenotípusát. Tehát a tracheaspecifikus menekítéssel sikerült olyan *dDAAM* mutáns 3. stádiumos vándorló lárvákat létrehozni, amelyekben az izomfelszínnek a mérete megegyezik az ugyanolyan korú vad típusúéval, viszont a pre- és posztzinaptikus oldalon egyaránt dDAAM hiányos állapot van.

28. ábra A preszinaptikus dDAAM szükséges a lárvális bouton képződéshez. (A-F) A konfokális képeken anti-HRP immunfestéssel vizsgáltuk a lárvális 4-es izom NMJ végződését. A kontroll (*elav-Gal4/+*) (A) és a posztzinaptikus *dDAAM* RNSi 1 állatokban (*mef2-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+*) (D) az NMJ terminálisok a vad típusra jellemző gyöngyfüzéroszerű bouton szerveződést mutatnak, ettől eltérően a *dDAAM^{Ex68} ;TR* (*dDAAM^{Ex68} /Y; btl-Gal4, UAS-FLDAAM/+*) (B), a pre- és posztzinaptikusan dDAAM csendesített (*elav-Gal4, mef2-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+*) (C), valamint a preszinaptikusan csendesített állatokban (*elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+* és *elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+*) (E, F) bouton szám csökkenés és bouton fúziós fenotípus (csillag jelölés) figyelhető meg. (G) A bouton szám változásának statisztikai elemzése a különböző *dDAAM* mutánsokban. $n \geq 25$. A skála mértéke: 5 μ m (A-F). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével (G). *** $p < 0.001$

Összhangban a korábbi vizsgálatokkal, a 3. stádiumos vándorló *dDAAM^{Ex68}; TR* állatokban a bouton szám 45%-os csökkenését figyeltük meg a vad típushoz képest (28. ábra B, G). A mikroszkópos képek vizsgálata során azt is észrevettük, hogy a boutonokat összekötő interboutonikus régiók, amik a vad típusú NMJ-ben a boutonnál lényegesen keskenyebb struktúrák, kiszélesednek és azok átmérője gyakran megközelíti a bouton átmérőjét (későbbiekben bouton fúziós fenotípus). Ahhoz, hogy megerősítsük a legutóbbi megfigyeléseinket elhatároztuk, hogy RNS interferencia segítségével csendesítjük a *dDAAM* gént az NMJ terminálisban. Először a pre- és posztzinaptikus oldalon egyaránt túltermeltük a *dDAAM* RNSi konstrukciókat idegrendszer specifikus *elav-Gal4* és izomspecifikus *mef2-Gal4* driverek segítségével. Két független RNS interferencia vonalat használtunk (*UAS-dDAAM RNSi 1* és *UAS-dDAAM RNSi 2*), azért hogy elkerüljük az off-target hatás lehetőségét. A csendesítés után mindkét vonal esetében a *dDAAM^{Ex68}; TR* állatokra emlékeztető csökkent bouton számmal és fúziós boutonnal járó NMJ fenotípus volt megfigyelhető (28. ábra C, G, nincs mutatva). A kétoldali csendesítés után megvizsgáltuk, hogy külön-külön a pre- vagy posztzinaptikus csendesítésnek van-e valamilyen hatása a szinaptikus fejlődésre. A preszinaptikus *dDAAM* csendesítés bouton szám csökkenéshez vezetett (24. ábra E-G), viszont a posztzinaptikus RNSi nem okozott változást az NMJ morfológiában (24. ábra D, G). Így a csendesítési kísérletek a *dDAAM* preszinaptikus szerepére utalnak. A csendesítés specifikusságának és hatékonyságának a tesztelésére további kísérleteket végeztünk el. Először Western blottal néztük meg azt, hogy a két különböző *dDAAM* RNSi transzgénnel csendesített állatokban mennyire csökken le a *dDAAM* fehérje szintje. A denzitometriai elemzést követően a *UAS-dDAAM RNSi 1* vonal esetében a *dDAAM* fehérje szintje körülbelül 98%-kal, míg a *UAS-dDAAM RNSi 2* vonal esetében nagyjából 92%-kal csökken a vad típushoz képest, ha az *elav-Gal4*, *mef2-Gal4* driver kombinációt használtuk (29. ábra A, B). Összhangban a Western blot kísérletekkel az anti-*dDAAM* immunfestés szinte teljesen eltűnt a *dDAAM* csendesített NMJ terminálisokban (29. ábra C, D).

29. ábra A dDAAM csendesítés hatékonyságának a vizsgálata. (A, B) A Western blot kísérletek alapján a dDAAM specifikus RNSi vonalak *elav-Gal4* driver használatával (*elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+* és *elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 2/+*) és nagy hatékonysággal csendesítik a dDAAM gént a KIR-ben. (C) A kontroll (*elav-Gal4, mef2-Gal4/+*) állatokban látható kortikális dDAAM felhalmozódás (zöld) szinte teljesen eltűnik a pre- és posztzinaptikusan dDAAM csendesített állatokban (*elav-Gal4, mef2-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+*) (D), ami nem befolyásolta az ant-HRP (cián) és anti-Dlg (magenta) szinaptikus markerek festődési mintázatát. Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével (I). $n \geq 10$. A skála mértéke: 3 μ m (C, D).

Annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy az általunk megfigyelt NMJ fenotípusok valóban a preszinaptikus dDAAM hiányának köszönhetőek, menekítési kísérleteket végeztünk a mutáns analízishez használt *dDAAM^{Ex68}* alléllal. A korábban használt *UAS-FLDAAM* transzgént a preszinaptikus oldalon, motorneuron-specifikus driverrel (*D42-Gal4*) termeltettük túl *dDAAM^{Ex68}* mutáns háttéren, ezzel létrehozva a (*dDAAM^{Ex68}/Y; UAS-FLDAAM/+; D42-Gal4/+*) mutáns állatokat (későbbiekben *dDAAM^{Ex68}; NR*). A preszinaptikusan menekített *dDAAM^{Ex68}; NR* egyedekben vad típushoz hasonló NMJ morfológia alakult ki a bouton szám és az NMJ hossz vonatkozásában egyaránt (27. ábra C, F, G, H, K, L). Összességében a dDAAM funkcióvesztéses vizsgálata megmutatta, hogy a dDAAM befolyásolja az NMJ fejlődés folyamatait, elősegítve a szinaptikus boutonok kialakulását. Habár a fehérje mindkét szinaptikus félen kifejeződik, a funkcióvesztéses analízis a dDAAM preszinaptikus szerepére utal.

A dDAAM a preszinaptikus mikrotubulus stabilizálódás pozitív szabályozó faktora

Mivel a dDAAM egy formin típusú sejtvázsabályozó fehérje, ezért úgy gondoltuk, hogy megvizsgáljuk a szerepét az NMJ citoskeletális szerveződésében. A korábban ismertetett MS analízis legígéretesebb dDAAM kölcsönható partnereként a Futsch fehérje tűnt, ami egy széles körben használt preszinaptikus mikrotubulus marker. Ismert tény, hogy a Futsch kötődve a mikrotubulusokhoz képes elősegíteni azok stabilizálódását, ezáltal elősegítve az új boutonok képződését [122, 123]. A fentiek alapján felmerült, hogy a dDAAM befolyásolja-e a preszinaptikus mikrotubulus szerveződést.

A preszinaptikus mikrotubulusok vizsgálatához anti-Tubulin és anti-Futsch immunfestést használnak leginkább, amelyek közül az anti-Futsch immunfestés a szélesebb körben elterjedt, mivel a Futsch csak preszinaptikusan fejeződik ki. Az anti-Tubulin ellenanyagok kevésbé népszerű markerek, mert a pre- és posztzinaptikus oldalon lévő mikrotubulusokat egyaránt felismerik, megnehezítve ezzel a vizsgálatukat. A vad típusú preszinaptikus motoraxon végződésben az anti-Futsch immunfestést használva megfigyelhető, hogy a központi mikrotubulus sejtvázs egy egységes kötegbe rendeződik [122], amely fokozatosan a preszinaptikus terminális disztális része felé haladva elvékonyodik (30. ábra A-Ab). A terminális boutonban a mikrotubulus leginkább szabálytalan módon szétterül vagy alacsony előfordulási gyakorisággal alig észlelhető (30. ábra Ab). Ettől eltérően a *dDAAM^{Ex68}*; *TR* állatokban a preszinaptikus központi mikrotubulus köteg az anti-Futsch immunfestés alapján fragmentált megjelenésű, illetve a mikrotubulusok a terminális boutonokból gyakran hiányoznak (30. ábra B-Bb). Hasonlóan a *dDAAM^{Ex68}*; *TR* NMJ végződésekhöz a preszinaptikusan dDAAM csendesített NMJ terminálisokban a Futsch lokalizációja szabálytalan granulált mintázatot vesz fel valamint a terminális boutonokban gyakran nem detektálható (30. ábra C-Cb).

30. ábra A *dDAAM* mutáns NMJ-ben a preszinaptikus mikrotubulus köteg abnormális szerveződést mutat. (A-C) A mikrotubulus szerveződés vizsgálata konfokális képeken anti-Futsch (zöld) és anti-HRP (magenta) immunfestést használva a 4-es izomhoz tartozó NMJ terminálisokon. A csillagok a képeken az NMJ centrális (a) és terminális (b) részét jelölik, amelyek kinagyítva láthatóak. A mikrotubulus rendszer a *dDAAM^{Ex68}; TR* és a preszinaptikus *dDAAM RNSi1* (*elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi1/+*) mutáns NMJ-k centrális régiójában (Ba, Ca) fragmentált szerveződésű és gyakran hiányzik a terminális részen (Bb, Cb) ellentétben a kontrollal (*elav-Gal4/+*) (Aa, Ab). (D) Az inter-boutonikus régió átmérőjének vizsgálata az NMJ centrális részén ($n \geq 15$). (E) A mikrotubulus szerveződés vizsgálata terminális boutonokban ($n \geq 45$). A skála mértéke: 5 μ m (A-C), 2 μ m (Aa-Cb). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

Annak érdekében, hogy megerősítsük azt, hogy valóban dezorganizált a mikrotubulus szerveződés a *dDAAM* mutáns preszinaptikus idegvégződésekből, anti-Tubulin immunfestést

végeztünk, amely közvetlenül jelöli ki a mikrotubulusokat. Habár a mikrotubulus szerveződés nem annyira egyértelmű a terminális boutonokban ezzel a festéssel, az jól látszik, hogy a központi mikrotubulus köteg, nagyon hasonlóan az anti-Futsch festéshez, fragmentált és dezorganizált szerveződést mutat a *dDAAM* mutáns NMJ-ben (31. ábra).

31. ábra A dDAAM hiánya a mikrotubulus szerveződés fragmentálódását okozza.

(A-B) A mikrotubulus rendszer vizsgálata kontroll (*w¹¹¹⁸*) és *dDAAM* mutáns NMJ-ben anti-Tubulin (zöld) és anti-HRP (magenta) immunfestést használva. Az A és B panelen lévő csillagok az NMJ centrális (Aa, Ba) és terminális (Ab, Bb) részét jelölik. A skála mértéke: 5 μ m (A, B), 2 μ m (Aa-Bb).

Az irodalomban jól ismert tény, hogy a preszinaptikus mikrotubulusok rendezett struktúrájának felbomlása gyakran a szinaptikus komponensek leépülését vagy szinaptikus visszahúzódást (retrakciót) okoz [147]. Annak érdekében, hogy letezzük ennek a lehetőségét, megvizsgáltuk a szinaptikus szerveződést mindkét szinaptikus oldalon. A vad típusú NMJ terminálisban a preszinaptikus aktív zóna komplex-szel szemben mindig egy szomszédos glutamát receptor klaszter foglal helyet, így biztosítva ezzel az ingerületátvitelt (32. ábra A) [155]. Ha a glutamát receptor klaszterrel szemben eltűnik az aktív zóna komplex, amit szinaptikus visszahúzódásnak hívunk, az azt jelenti, hogy a preszinaptikus aktív zóna leépült vagy felbomlott, mivel a szinapszisképződés kezdetén az egyébként a GluR klaszterrel együtt alakult ki [147]. A szinaptikus retrakció vizsgálatához a preszinaptikus aktív zónákat felismerő anti-Brp és a posztzinaptikus glutamát receptorokat kijelölő anti-GluRIII ellenanyagokat használtuk. A mikroszkópos felvételek alapján a *dDAAM* null mutáns NMJ-

ben a szomszédos aktív zóna-glutnát receptor mintázat a vad típushoz hasonló szerveződést mutatott, ami jelzi, hogy a dDAAM fehérje hiánya nem okoz szinaptikus retrakciót (32. ábra B). A fenti eredmények azt sugallják, hogy a dDAAM képes lehet elősegíteni a preszinaptikus mikrotubulusok stabilizálódását, amely nagyon fontos eleme az új bouton képződésnek, de elhanyagolható a funkciója a szinaptikus szerkezet megőrzésében.

32. ábra A dDAAM hiánya nem okoz szinaptikus retrakciót. A szinaptikus terminálisokban anti-Brp (zöld), anti-GluRIII (magenta) és anti-HRP (cián) immunfestéssel vizsgáltuk az aktív zóna és a Glu receptor klaszter szerveződését. A vad típusú kontrollhoz (w^{1118}) (A) hasonlóan a $dDAAM^{Ex68}$ (B) mutánsban a szomszédos Brp-GluRIII mintázat szabályos elrendeződést mutat. A skála mértéke: 5 μ m (A,B).

A formin típusú fehérjék leginkább ismert tulajdonsága az aktin összeszerelő aktivitásukhoz köthető [42, 44]. Emellett egyre több bizonyíték utal arra, hogy a forminok képesek befolyásolni a mikrotubulus organizációt [124]. Számos forminról bebizonyították, hogy *in vitro* koszedimentációs tesztekben képes kötődni a mikrotubulusokhoz [22, 126-129], valamint sejtes rendszerekben képes elősegíteni a mikrotubulusok stabilizálódását [127, 129, 133-135, 204]. Ezek után adódik a kérdés, hogy a dDAAM, a DAAM formin alcsalád egyetlen *Drosophila* képviselője, képes-e kötődni a mikrotubulusokhoz. A csoportunk által nemrég közölt eredménye alapján úgy tűnik a dDAAM fehérje katalitikus FH2 doménje, valamint az extrém C-terminális farok rész egyaránt képes *in vitro* körülmények között a mikrotubulusokhoz kötődni [129]. Ennek eredményeképpen az a kérdés vetődött fel bennünk, hogy a dDAAM fehérje aktinhoz és/vagy mikrotubulushoz köthető funkciója szükséges a szinaptikus fejlődésben. A kérdés megválaszolásához menekítési kísérleteket végeztünk el

olyan transzgénekkel, amelyek a teljes hosszúságú dDAAM forma pontmutáns konstrukcióit hordozták.

33. ábra A dDAAM aktinkötő funkciója nem szükséges a preszinaptikus bouton képződéshez. (A-F) A *dDAAM^{Ex68}* menekítése során vad típusú és mutáns *FLDAAM* konstruktokat termeltünk túl *D42-Gal4* driverrel. A 4-es izomhoz tartozó NMJ-ket második stádiumos állatokban vizsgáltuk anti-HRP markerral (magenta) a *w¹¹¹⁸* kontroll törzs (A) használatával. A *dDAAM* mutáns NMJ fenotípus (B) menekíthető volt a vad típusú *UAS-FLDAAM* (C) és az egyes pontmutáns *UAS-FLDAAM⁷³²* (D) transzgének használatával. Ezzel szemben a kettős pontmutáns verzió *UAS-FLDAAM⁸⁷⁶⁻⁸⁸¹* (E) nem volt képes menekíteni a csökkent bouton számot. (F) A bouton szám változásának statisztikai elemzése a menekítési kísérletek során ($n \geq 15$). A skála mértéke: 5 μ m (A-E). *** $p < 0.001$

Az első transzgén esetében (*UAS-FLDAAM^{I732A}*) a 732-es pozícióban lévő izoleucint cseréltük ki alaninra, amely egy olyan, a forminok között konzervált aminosav [60, 72, 230, 231], amely az aktinkötésben esszenciális. A másik transzgenikus konstrukcióban (*UAS-FLDAAM^{K876/881A}*) a 876- és 881-es pozíciókban lévő pozitívan töltött aminosavakat cseréltük ki alaninra, amely ekvivalens az aktin és mikrotubulus kötésre képtelen mDia1 K989/994A kettős mutánssal [130]. A vad típusú *UAS-FLDAAM* valamint a mutáns *UAS-FLDAAM^{I732A}* transzgén *dDAAM^{Ex68}* háttéren *D42-Gal4* motorneuron-specifikus driverrel meghajtva egyaránt képes volt menekíteni a *dDAAM* null mutáns NMJ fenotípusát (33. ábra A, B, C, D, F). Ezzel ellentétben a kettős mutáns *UAS-FLDAAM^{K876/881A}* transzgén nem volt képes helyreállítani (33. ábra E, F) a *dDAAM* null mutánsra jellemző abnormális NMJ morfológiát és csökkent bouton számot. A kísérletek alapján úgy tűnik, hogy a *dDAAM* NMJ fejlődésben betöltött szerepe elsősorban a mikrotubulus szerveződéshez köthető, míg az aktin összeszerelő aktivitása nem szükséges a bouton képződés elősegítéséhez.

Mivel az aktin inkompetens *FLDAAM* (*UAS-FLDAAM^{I732A}*) képes volt menekíteni a *dDAAM^{Ex68}* mutáns állatok NMJ fenotípusát, úgy gondoltuk, hogy az aktin organizáció nem

érintett a *dDAAM* mutáns motoraxon terminálisokban. A preszinaptikus F-aktin hálózat valószínűleg egy érzékeny struktúra, amit hagyományos phalloidines festéssel nem lehet megjeleníteni. A preszinaptikus aktin vizualizációjához, ezért az aktin egy formáját az aktin5C::GFP-t termeltettük túl idegrendszer-specifikus driverrel (*elav-Gal4*) vad és *dDAAM^{Ex68}* mutáns háttéren, amit aztán anti-GFP festéssel detektáltunk (34. ábra). Az előzetes elgondolásainkkal összhangban, a *dDAAM* hiánya nem befolyásolta az aktin organizációt, ami megerősítette azt a hipotézisünket, hogy a preszinaptikus kortikális aktin hálózat kialakításában és szervezésében elhanyagolható szerepe lehet a *dDAAM*-nak.

34. ábra A *dDAAM* null mutáció nem befolyásolja a preszinaptikus aktin szerveződést. (A, B) A konfokális képeken az aktin organizációt kontroll (*UAS-aktinGFP/+; elav-Gal4/+*) (A) és *dDAAM* mutáns (*dDAAM^{Ex68}/Y; UAS-aktinGFP/+; elav-Gal4/+*) (B) axon terminálisokban vizsgáltuk. A preszinaptikus aktin szerveződés megjelenítéséhez anti-HRP (magenta) és anti-GFP (zöld) immunfestést használtunk. A kortikális aktin szerveződés a *dDAAM* mutáns preszinaptikus idegvégződésekben hasonlóan a vad típushoz a teljes NMJ területén nagyobb strukturális defektusok nélkül. A skála mértéke: 5 μ m (A, B).

A konstitutívan aktív C-DAAM elősegíti az új boutonok kialakulását

A funkcióvesztéses vizsgálatok alapján az NMJ növekedés során a *dDAAM* elősegíti az új boutonok képződését. A továbbiakban kíváncsiak voltunk arra, hogy ha a fehérje aktivitását megemeljük, akkor annak milyen hatása lesz az NMJ morfológiára vagy a bouton képződésre. Ahogyan a bevezetőben is említésre került, a forminok 7 alcsoportjából 6 a *Drosophilában* is megtalálható, amelyek legnagyobb csoportja a DAAM alcsoportot is magába foglaló DRF forminok. A DRF forminok közös jellemzője, hogy multidomén szerkezetű, dimerizációra képes fehérjék, amelyek döntő hányada a sejtekben inaktív, mivel az N-terminálison lévő DID és a C-terminálison lévő DAD domén kölcsönhatásba lép egymással kialakítva a molekulában

egy autoinhibíciós konformációt, amely szterikusan gátolja a fehérje katalitikusan aktív C-terminális régióját. Egy bizonyos aktivátor jel hatására, pl. Rho típusú kis GTPáz bekötődésével azonban a DID-DAD interakció megszűnik, ami lehetővé teszi, hogy az aktin és mikrotubulus kötésben fontos C-terminális régió szabaddá váljon [42, 44]. Korábbi munkáinkból már ismert volt az, hogy az inaktivációért felelős DID domént tartalmazó N-terminális régió eltávolításával, képesek vagyunk egy olyan csonkolt dDAAM fehérjét (C-DAAM) létrehozni, amely konstitutívan aktív formaként viselkedik [39, 228, 231, 232]. A teljes hosszúságú dDAAM forma idegrendszer specifikus (*elav-Gal4*) túltermelésével a fehérje inaktivációja miatt nem láttunk változást az NMJ morfológiájában, viszont a csonkolt C-DAAM túltermeléssel ugyanazt a drivert használva egy igen jelentős bouton szám növekedést figyeltünk meg az NMJ terminálisokban (35. ábra A-C). A C-DAAM preszinaptikus túltermelésével a motoraxon végződéseken nagy számban megjelentek az újonnan képződő, kisméretű ún. szatellita boutonok (35. ábra Cb). A bouton szám emelkedés mellett érdekes módon az interbouton régió kiszélesedett valamint a központi mikrotubulus köteg fragmentált és dezorganizált szerkezetűvé vált (35. ábra Ca), ami egyértelműen funkcióvesztés hatásáról árulkodik.

35. ábra A preszinaptikus C-DAAM túltermelése elősegíti az új bouton képződést. (A-C) A preszinaptikus axon terminálisok vizsgálata kontroll (*elav-Gal4/+*) (A), (*UAS-FLDAAM/+; elav-Gal4/+*) (B) és (*UAS-C-DAAM/+; elav-Gal4/+*) (C) állatokban anti-HRP és anti-Futsch immunfestés használatával. A csillagok az NMJ központi (a) és terminális (b) részét jelölik, amely részek kinagyítva is láthatóak. (D) A bouton szám változása a túltermeléses vizsgálatokban ($n \geq 25$). A skála mértéke: 5 μ m (A-C), 2 μ m (Aa-Cb). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

A funkcióvesztéses fenotípuskomponensek megjelenése azért történik, mert feltehetőleg a teljes hosszúságú endogén dDAAM a túltermelt C-DAAM formával dimerizálódik és lokálisan egy dDAAM hiányos állapotot hoz létre. Ezt a hipotézist megerősítik azok a korábbi megfigyeléseink, hogy a C-DAAM tracheaspecifikus túltermelésével szintén funkcióvesztéses fenotípus figyelhető meg, amely hatás csökkenthető, ha a C-DAAM mellett a teljes hosszúságú dDAAM-ot is túltermeljük. Tehát elmondhatjuk, hogy a C-DAAM preszinaptikus túltermelése funkciónyeréses hatással bír a bouton szám vonatkozásában, ami arra utal, hogy a dDAAM elősegíti az NMJ extenziót új boutonok kialakításával.

A dDAAM a Dlar/Trio/Dia jelátviteli egységtől függetlenül szabályozza a szinaptikus bouton képződést

A formin típusú fehérjék vizsgálata során felmerülhet a kérdés vajon az általunk vizsgált formin funkciója átfed-e más forminok funkciójával. Az irodalomban a forminok közül eddig csak a *dia*-ról lehet tudni, hogy részt vesz az NMJ fejlődésben [196]. Fontos megemlíteni, hogy a *dia* esetében leírt NMJ fenotípusok számos tekintetben eltérőek a dDAAM mutánsokhoz képest. A bouton szám a *dia* mutáns NMJ végződéseknél hasonló csökkenést mutat, mint a dDAAM mutánsokéban, viszont az inter-boutonikus régió kiszélesedése nem látható. Továbbá úgy tűnik, hogy a dDAAM-mal ellentétben, a Dia részt vesz a preszinaptikus aktin organizációban, valamint a konstitutívan aktív formája nincs hatással az NMJ morfológiára és a szinaptikus bouton képződésre [196]. A következőekben domináns genetikai kölcsönhatásokban vizsgáltuk, hogy a dDAAM és a Dia között van-e funkcionális redundancia a bouton képződés vonatkozásában. Ahhoz, hogy ezt jól körbejárjuk a *dia*-n kívül még a *Dlar* és a *trio* génekkel is végeztünk domináns genetikai vizsgálatokat, amelyek a *dia*-val együttműködnek a szinapszisképződés folyamataiban [196]. Az interakciós tesztekben a dDAAM^{Ex68}; *TR* törzset kombináltuk össze a *Dlar* vagy a *dia* heterozigóta null mutációival. Megállapítható, hogy sem a *Dlar* és sem a *dia* null allélja vad típusú kromoszóma felett nem befolyásolta jelentősen a dDAAM^{Ex68}; *TR* mutánsokra jellemző NMJ morfológiát (36. ábra).

36. ábra A *dia* és a *Dlar* nem mutat domináns genetikai interakciót a *dDAAM*-mal. A vad típusú kontroll (w^{1118}) (A) és mutáns állatok (B-D) NMJ végződéseinek a vizsgálata a preszinaptikus anti-HRP markerral történt. A genetikai interakciós vizsgálatok során, amikor a $dDAAM^{Ex68}; TR$ (B,E) állatokat össze kombináltuk a *dia* és *Dlar* heterozigóta null mutáns alléljaival, jelentősen nem változott meg a $dDAAM^{Ex68}; TR$ genotípusra jellemző csökkent bouton szám (C-E). (E) A bouton szám változása az interakciós vizsgálatokban ($n \geq 25$). A skála mértéke: 5 μm (A-D). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

Mivel a *dia* null mutáns allélja kettős heterozigóta formában mind a *Dlar* mind a *trio* amorf alléljával erős domináns genetikai interakciót mutatott [196], ezért megvizsgáltuk a heterozigóta *dDAAM* mutáns állatokat is genetikai interakciós tesztben. A kontroll egyszeresen heterozigóta *dDAAM*, *dia* és *trio* mutáns állatokban az elvártaknak megfelelően vad típusra emlékeztető NMJ végződés figyelhető meg (37. ábra D), amely fenotípus számottevő mértékben nem változott meg a kettős heterozigóta $dDAAM/+; dia/+$ és $dDAAM/+; trio/+$ mutáns állatok motoraxon terminálisaiban sem (37. ábra A, B, C, D). Végül kettős homozigóta *dDAAM; dia* mutáns állatokban akartuk megvizsgálni, hogy a két fehérje egymástól függetlenül működik-e. Mivel a kettős homozigóta *dDAAM; dia* mutáns kombináció embrió letális, ezért *dDAAM/Dia* kettős csendesítést végeztem az NMJ-ben idegrendszer specifikus (*elav-Gal4*) drivert használva (37. ábra A-D). Az egyszeres *Dia* csendesítés a leírtakhoz [196] hasonló csökkent bouton számot eredményezett (38. ábra B), míg az egyszeres *dDAAM* csendesítés hasonlóan a korábbi kísérletekhez csökkent bouton számot és bouton fúziós fenotípust okozott (38. ábra C).

37. ábra A *dia* és a *trio* nem mutat genetikai kölcsönhatást a *dDAAM*-mal transzheterozigóta formában. Az interakcióban szereplő mutáns genotípusok NMJ terminálisait anti-Dlg (zöld) és anti-HRP (magenta) szinaptikus markerekkel vizsgáltuk (A-C). A *dia* (B) és a *trio* (C) null allélok egy kópiában *dDAAM^{Ex68}* heterozigóta háttéren nem változtatták meg a *dDAAM^{Ex68}/+*, *dia⁵/+* és *trio¹/+* kontrollokra jellemző bouton számot (D). (D) A bouton szám változása az interakciós vizsgálatokban (E) ($n \geq 25$). A skála mértéke: 5 μ m (A-D). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

A kettős *dDAAM*/*Dia* csendesített állatokban a mutáns NMJ terminálisok morfológiája leginkább a *dDAAM* funkcióvesztéses fenotípusára hasonlított a kiszélesedő inter-boutonok miatt (38. ábra D). A genetikai interakciós vizsgálatok alapján valószínűleg a *Dlar*/*trio*/*dia* szignalizációs egység a *dDAAM*-tól függetlenül működik, viszont a kettős csendesítés azt jelzi, hogy a *dDAAM* által irányított folyamat a szignalizációs hierarchiák rendszerében lentebb vagy egy szinten van a *Dlar*/*trio*/*dia* szignalizációs komplex-szel.

38. ábra A *dia-dDAAM* szinaptikus csendesítésének vizsgálata NMJ-ben. (A-D) A vizsgálatokban szereplő kontroll (*elav-Gal4/+*) (A) és formin csendesített (B-D) NMJ terminálisokat anti-HRP (magenta) preszinaptikus markerrel vizsgáltuk. A *dDAAM* és *dia* RNSi konstruktokat pánneurális (*elav-Gal4*) driver használatával termeltük túl. A preszinaptikus *dia* csendesítés (*elav-Gal4/+; UAS-dia-RNSi/+*) (B) az irodalmi adatokkal összhangban [196] bouton szám csökkenést idéz elő, míg a *dDAAM* preszinaptikus csendesítése (*elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi/+*) (C) hasonlóan a kettős *dia-dDAAM* csendesítéshez (D) (*elav-Gal4/+; dia-UAS-RNSi/UAS-dDAAM-RNSi*) csökkent bouton számot és bouton fúziós fenotípust okozott. A skála mértéke: 5 μ m (A-D).

A *dDAAM* domináns genetikai interakciót mutat a *wg* és *Ank2* génekkel

A mikrotubulus rendszer megfelelő szabályozása kulcsfontosságú eleme a szinaptikus bouton képződésnek. Számos génmutációról ismert, hogy tönkreteszi a szabályos mikrotubulus szerveződést, ami befolyásolja a bouton képződést. Habár egyik mutáns esetében sem beszélhetünk arról, hogy a szinaptikus fenotípus teljesen ekvivalens a *dDAAM* mutánsával, mégis vannak olyan párhuzamok a fenotípusok karakterisztikájában, ami alapján kijelölhetjük azokat a jelátviteli útvonalakat, amelyek együttműködhetnek a *dDAAM*-mal. A vizsgálatainkhoz szintén domináns genetikai kölcsönhatásokat végeztünk, amelyekben a *dDAAM^{Ex68}*; *TR* kiindulási törzset kombináltuk össze a mikrotubulus sejtvázsabályozáshoz köthető gének heterozigóta null mutáns alléljaival (39. ábra).

39. ábra A *dDAAM* domináns genetikai kölcsönhatást mutat az *Ank2* és a *wg* génekkel. A vad típusú kontroll (*w¹¹¹⁸*) (A) és mutáns állatok (B-G) NMJ végződéseinek a vizsgálata a preszinaptikus anti-HRP markerral történt. A genetikai interakciós vizsgálatok során, amikor a *dDAAM^{Ex68}; TR* (B, H) állatokat összekombináltuk a *tkv⁷* heterozigóta null mutáns alléljaival, jelentősen nem változott meg a *dDAAM^{Ex68}; TR* genotípusra jellemző csökkent bouton szám (C, H). Ezzel ellentétben a *wg^{l8}* és *Ank2⁵¹⁸* null allélek heterozigóta formában jelentősen csökkentették a *dDAAM^{Ex68}; TR* mutánsra jellemző bouton számot (D, F, H). (A, E, G, I) Az *Ank2* és *wg* gének egy kópiájának hiánya jelentősen nem befolyásolja a bouton számot a vad típushoz képest. (H, I) A bouton szám változása az interakciós vizsgálatokban ($n \geq 25$). A skála mértéke: 5 μ m (A-G). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

Az interakció vizsgálata során először azt vizsgáltuk, hogy egy kópia *tkv*, *wg* és *Ank2* hiánya befolyásolja-e a *dDAAM^{Ex68}; TR* NMJ fenotípusát a bouton szám tekintetében. A *tkv* amorf allél (39. ábra C, H) nagymértékben nem befolyásolta a *dDAAM* mutánsra (39. ábra B, H) jellemző szinaptikus bouton számot, viszont a *wg* és *Ank2* mutációk jelentősen, mintegy 30%-kal csökkentették azt (39. ábra D, F, H). Más közleményekkel összhangban a *wg* és az *Ank2* mutációk önmagukban heterozigóta formában (39. ábra A, E, G, I) nincsenek hatással a boutonok képződésére [218, 222], ami jelzi, hogy itt valóban egy domináns genetikai kölcsönhatásról lehet szó. Érdekes megemlíteni, hogy korábbi vizsgálatok alapján a *dDAAM* fehérjét egyértelműen a Wnt/Fz szignalizációhoz kötötték [136, 144, 231]. Ezenkívül a *wg* és

Ank2 mutáns NMJ terminálisok bouton szám csökkenést, abnormális mikrotubulus szerveződést valamint bouton fúziót mutatnak [218, 222, 223], amely fenotípuskomponensek, ha nem is ugyanabban a formában, de megfigyelhetőek a *dDAAM* mutánsokban is. Később fény derült arra, hogy a Wg/Fz2 jelátviteli út az *Ank2*-vel együtt befolyásolja a preszinaptikus mikrotubulus szerveződést [223]. A fenti irodalmi adatok megerősítik azt a feltételezésünket, hogy a *dDAAM* együttműködhet a Wg/*Ank2* szignalizációs egységgel.

A *dDAAM* az *Ank2-XL* fehérjével együtt szabályozza a preszinaptikus mikrotubulus köteg organizációját

A genetikai interakciós vizsgálatok után megpróbáltuk episztázis kísérletekkel meghatározni a *dDAAM* fehérje helyzetét a Wg/*Ank2* jelátviteli útvonalban. Az *Ank2* egy downstream eleme ennek a jelátviteli útnak, amelyben adaptor fehérjeként összekapcsolja a kortikális aktin hálózatot a központi mikrotubulus köteggel. Az *Ank2* fehérje hiányában a mikrotubulus szerveződés abnormális, a terminális boutonokból a mikrotubulusok eltűnnek, valamint az NMJ gyöngyfűzér struktúrája felbomlik, hosszú megnyúlt fúziós boutonok kialakulásával, amelyekben mikrotubulus aggregáció figyelhető meg [216-218]. Sok esetben az *Ank2* mutáns NMJ végződéseken eltűnnek a posztszinaptikus glutamát receptorokkal szemközti aktív zóna komplexek jelezve azt, hogy a dezorganizált mikrotubulusok szinaptikus instabilitást okoznak. A hierarchia viszonyok meghatározásához kettős hemi- és homozigóta *dDAAM; Ank2* mutánsokat használtunk. Két különböző *Ank2* mutáns állt a rendelkezésünkre. Az *Ank2-XL^Δ* egy olyan transzpozon excíziós mutáns, amely specifikusan csak az *Ank2-XL* izoformát távolítja el a rendszerből [218], míg az *Ank2^{null}* allél esetében az összes *Ank2* izoforma érintett [217].

40. ábra Episztázis analízis az *Ank2* és a *dDAAM* között. (A-B') A mikrotubulus organizációt az *Ank2-XL Δ* és *dDAAM^{Ex68}; Ank2-XL Δ* mutánsok NMJ terminálisaiban anti-HRP (magenta) és anti-Tubulin (zöld) immunfestéssel vizsgáltuk. (A' és B') A nagy felbontású képeken látható 4-es izom centrális NMJ régiója az A és B paneleken csillaggal jelölve. Az *Ank-XL* mutáns bouton fúziós és mikrotubulus aggregációs fenotípusát (A, A') a *dDAAM* hiánya szuppresszálja a kettős mutánsban (B, B'). (C) Az inter-bouton régió átmérőjének változása ($n \geq 45$). A skála mértéke: 5 μ m (A, B), 2 μ m (A', B'). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

Az *Ank2-XL* hiányában bouton fúzió és az azt kitöltő mikrotubulus aggregáció figyelhető meg (40. ábra A, A', C), viszont szinaptikus instabilitás nem tapasztalható [218]. Meglepő módon a kettős hemi- és homozigóta *dDAAM^{Ex68}; Ank2-XL Δ* mutánsokban eltűnt a mikrotubulus felhalmozódás a preszinaptikus idegvégződésekből, mivel a központi mikrotubulus köteg átmérője közel a vad típussal megegyező lett (40. ábra B, B', C). Továbbá az is érdekes, hogy a *dDAAM* és az *Ank2-XL Δ* egyes mutánsokban ugyan megfigyelhető volt a szinaptikus bouton összeolvadás, a kettős mutánsokban helyreállt a vad típusú gyöngyfűzészerű szinaptikus bouton szerveződés. Ha a kettős mutáns analízisben az *Ank2-XL Δ* mutáns allélt az *Ank2^{null}* allélra cseréltem ki, akkor is hasonló megfigyeléseket tapasztaltunk, ami megerősíti az előző eredményesort (41. ábra). A fenti eredmények arra utalnak, hogy az *Ank2* fehérjéhez képest a *dDAAM* downstream elemként viselkedik. Habár a *dDAAM* hiánya képes szuppresszálni a mikrotubulus aggregációt, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy ez *Ank2-XL* függő. Ha pedig az *Ank2-XL* jelen van, akkor a *dDAAM* hiánya mikrotubulus fragmentációt okoz. Mivel sem a *dDAAM; Ank2-XL Δ* sem a *dDAAM; Ank2^{null}* kettős mutánsok esetében nem a „tisztá” *dDAAM* funkcióvesztéses NMJ fenotípus látható, ezért a *dDAAM* és *Ank2* közti kapcsolat valószínűleg sokkal komplexebb, mint egy szimpla lineáris útvonal.

41. ábra Episztázis analízis az *Ank2* és a *dDAAM* között. (A-B') A mikrotubulusok szerveződését az *Ank2*⁵¹⁸ (*Ank2*^{null}) és *dDAAM*^{Ex68}; *Ank2*⁵¹⁸ mutánsok 4-es izom NMJ végződéseiben anti-HRP (magenta) és anti-Tubulin (zöld) immunfestéssel vizsgáltuk. (A' és B') A nagy felbontású képeken az NMJ centrális része az A és B paneleken csillaggal jelölve. Az *Ank2* null mutáns bouton fúziós és mikrotubulus aggregációs fenotípusát (A, A') a *dDAAM* hiánya szupresszálja a kettős mutánsban (B, B'). A skála mértéke: 5 μ m (A, B), 2 μ m (A', B').

A *dDAAM* együttműködik a preszinaptikus Wg szignalizáció egyik sejtvez effektor fehérjéjével a Futsch-csal

Az *Ank2* mellett a mikrotubuluskötő Futsch fehérjéről is ismert, hogy a szinaptikus Wg szignalizáció egyik effektor molekulája, és a *dDAAM*-hoz hasonlóan az *Ank2* fehérjével együtt részt vesz a központi mikrotubulus köteg szabályozásában [218, 223]. Hasonlóan az *Ank2*-höz a Futsch esetében is egyes és kettős *dDAAM/futsch* mutánsokat vizsgáltunk. A *futsch* valamint a *dDAAM* lokusz egyaránt az X kromoszóma disztális végén helyezkedik el és a két gén egymástól való távolsága <0,1Mbp, ami azt jelenti, hogy szinte lehetetlen *dDAAM*<*futsch* kettős mutánst rekombinációval létrehozni. Így elhatároztuk, hogy a CRISPR/Cas9 technika segítségével új *futsch* null mutációt hozunk létre vad típusú és *dDAAM*^{Ex68} null mutáns háttérén is. A Flybase predikció alapján az első kódoló exon az összes Futsch izoformában megtalálható, ezért úgy döntöttünk, hogy az első kódoló exonban létrehozunk egy 300 bp-os deléciót, amely frameshiftet okoz a génen belül. Az új 300 bp-os deléciót hordozó *futsch*^{CR13} allélt Western blotlalt és immunfestéssel teszteltük le. Sem a Western bloton, sem az immunfestésen nem detektálható a fehérje, ezért kijelenthető, hogy a *futsch*^{CR13} egy protein null allél (42. ábra A, B, C). Az új *futsch*^{CR13} allél a korábbi *futsch*^{K68} null allélhoz hasonlóan csökkent bouton számot, kismértékű bouton méret növekedést és vad típusú mikrotubulus szerveződést mutat az NMJ

végződésben (42. ábra D, D', F). Ezzel ellentétben a hemizigóta $dDAAM^{Ex68}$, $futsch^{CR13}$ kettős mutáns NMJ terminálisokban csökkent bouton szám, bouton fúzió, valamint szakadozott mikrotubulus kötegek jelentek meg (42. ábra E, E', F), ami nagyon hasonlít a $dDAAM$ fenotípusra. A fenti kísérletek alapján a $dDAAM$ episztatikus a $futsch$ -hoz képest.

42. ábra A $dDAAM$ episztatikus a $futsch$ -hoz képest a bouton képződés során. Az új $futsch$ CRISPR allél (B) esetében az anti-Futsch (zöld) immunfestés szinte teljesen eltűnik a kontrollhoz (w^{1118}) (A) képest a 4-es izom NMJ végződésében. Az immunfestéshez hasonlóan a Western blot kísérletben az anti-Futsch jel alig detektálható a $futsch^{CR13}$ mintában (C). A Western blotban a minták fehérje mennyiségének az összehasonlításához az anti-p94 ellenanyagot használtuk kontrollként. (D, D') A $futsch^{CR13}$ mutáns NMJ végzésekben (D, D') enyhe bouton szám csökkenés figyelhető meg, míg a kettős mutáns ($dDAAM^{Ex68}$, $futsch^{CR13}$) (E, E') esetében a $dDAAM$ fenotípusra emlékeztető fragmentált, szakadozott mikrotubulusok kiszélesedő inter-boutonikus régióval. (D, E) A csillagok a nagy felbontású képek helyeit jelölik az NMJ középső harmadánál. Az inter-boutonikus régió átmérőjének változása a mutáns NMJ-k centrális részén (F) ($n \geq 45$). A skála mértéke: 5 μ m (D, E), 2 μ m (D', E'). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

A dDAAM Brp függő jelenléte moduláris funkcióval bír a szinaptikus transzmisszióban

43. ábra A dDAAM R1 és R4 ellenanyagok specifikusságának vizsgálata. (A-C) A Western blot kísérletek alapján a dDAAM specifikus RNSi vonalak *elav-Gal4* driver használatával (*elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+* és *elav-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 2/+*) nagy hatékonysággal csendesítik a *dDAAM* gént a KIR-ben. A 130 kDa-os magasságban lévő jel mindkét ellenanyag használatával szinte teljesen eltűnik. A kontroll (*elav-Gal4, mef2-Gal4/+*) állatokban látható kortikális (D) és pöttyszerű (F) dDAAM (zöld) felhalmozódás szinte teljesen eltűnik a pre- és posztzinaptikusan dDAAM csendesített állatokban (*elav-Gal4, mef2-Gal4/+; UAS-dDAAM-RNSi 1/+*) (E, G), ami nem befolyásolta az anti-HRP (cián) és anti-Dlg (magenta) szinaptikus markerek festődési mintázatát. Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével (C). $n \geq 10$. A skála mértéke: 3 μ m (D-G).

A dDAAM szinaptikus lokalizációjának vizsgálatához a dDAAM-R1 és R4 poliklonális nyúl ellenanyagokat használtam. Ha a két ellenanyagot megvizsgáljuk lárvális NMJ-ben, akkor a dDAAM-R4 ellenanyag kortikális felhalmozódást (43. ábra D), míg a dDAAM-R1 ellenanyag, meglepő módon aktív zóna mintázatra emlékeztető pöttyszerű mintát mutat (43. ábra F). Annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy mindkét ellenanyag specifikusan működik, további kontroll kísérleteket végeztem el. Először RNSi segítségével a pre- és posztzinaptikus oldalon egyaránt csendesítettem a dDAAM-ot *elav-Gal4, mef2-Gal4* driver

kombináció segítségével, majd mindkét ellenanyaggal immunfestéseket végeztem a mutáns NMJ terminálisokon. A dDAAM csendesített NMJ terminálisokban mindkét ellenanyaggal csak egy alig detektálható gyenge háttérfestődés látszik, ami az ellenanyagok specifikusságára utal (43. ábra E, G). Az immunfestés után kíváncsiak voltunk arra, hogy az ellenanyagok Western bloton is működnek-e. A Western blot kísérletekhez egy vad és két dDAAM RNSi mintát használtam. Az előhívott filmekben egyértelműen látszik, hogy a vad típusú mintában a 130kDa-os tartományban detektálható jel szinte teljesen eltűnik a dDAAM RNSi mintákban, míg az összfehérje mennyisége nem változik. Ez alapján elmondható, hogy mindkét ellenanyag specifikusan felismer egy a Flybase prdedikciónak megfelelő körülbelül 130 kDa-os fehérjét (43. ábra A, B, C). Korábbi kísérleteink alapján elmondható, hogy a dDAAM-R1 ellenanyag specifikus az embrionális trachearendszerben [228], a dDAAM-R4 ellenanyag pedig az embrionális KIR-ben [232]. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a dDAAM-R1 specifikus-e a KIR-ben és a dDAAM-R4 a tracheában, illetve azt is meg akartuk vizsgálni, hogy valamelyik ellenanyag esetleg csak az aktív vagy inaktív konformációval rendelkező dDAAM fehérjét ismer-e fel. A vizsgálatainkhoz 15-17 stádiumos w^{1118} , $dDAAM^{Ex68}$ és $dDAAM^{Ex68}; TR$ embriókat használtunk. Az embrionális KIR vizsgálatához minden esetben BP102 ellenanyagot használtunk KIR axonális markerként. A dDAAM-R1 és dDAAM-R4 ellenanyag egyaránt specifikusan kijelölte a KIR-t vad típusú embriókban (44. ábra A, D), amelyben a két ellenanyag nagymértékű átfedést mutat a BP102 mintával. Ezzel szemben a $dDAAM^{Ex68}$ és $dDAAM^{Ex68}; TR$ mutáns embriókban a dDAAM-R1 és dDAAM-R4 festődés szinte teljesen eltűnik a KIR axonokból (44. ábra B, C, E, F). Az is jól megfigyelhető, hogy a $dDAAM^{Ex68}; TR$ embriókban az FLDAAM kizárólag a tracheában fejeződik ki, amelyet a dDAAM-R1 és dDAAM-R4 ellenanyag egyaránt felismer (44. ábra C, F).

44. ábra A dDAAM-R1 és R4 ellenanyagok festési mintázatának összehasonlítása embrionális hasi idegkötegben (HIK). (A-F) Konfokális képeken hasonlítottuk össze a dDAAM-R4 és R1 ellenanyagok (zöld) festési mintázatát 15-17 stádiumos kontroll (A, D) és *dDAAM* mutáns (B, C, E, F) embriókban. Az R1 (A) és R4 (D) ellenanyagok nagy specifikussággal jelölik ki a HIK-et a vad típusú embriókban. A HIK kijelölésére a BP102 axonális markert (magenta) használtuk, amelynek mintázata nagyrészt átfed az R1 és R4 ellenanyagokkal. (B, E) A *dDAAM^{Ex68}* mutánsokban a dDAAM jel mind az R1 mind az R4 ellenanyag esetében szinte teljesen eltűnik az embriók teljes területéről, míg a *dDAAM^{Ex68}; TR* embriókban (C, F) szinte kizárólag a tracheában detektálható a dDAAM jel, a BP102 marker alapján a HIK axonok dDAAM negatívak. A skála mértéke: 20 μ m (A-F).

45. ábra A dDAAM-R1 és R4 ellenanyagok festési mintázatának összehasonlítása embrionális trachearendszerben. (A-F) Konfokális képeken hasonlítottuk össze a dDAAM-R4 és R1 ellenanyagok (zöld) festési mintázatát 15-17 stádiumos kontroll (A, D) és *dDAAM* mutáns (B, C, E, F) embriókban. Az R1 (A) és R4 (D) ellenanyagok nagy specifikussággal jelölik ki a tracheaágakat a vad típusú embriókban, valamint a nagy felbontású képeken (a csillagok a kinagyított trachea-elágazások helyeit jelzik), amelyek a panelek jobb alsó sarkában helyezkednek el, a dDAAM nagyrészt szubkortikális felhalmozódást mutat. A trachea kijelölésére az anti- E-Cad ellenanyagot (magenta) használtuk, amely az embrionális sejthatárok markere. (B, E) A *dDAAM*^{Ex68} mutánsokban a dDAAM jel mind az R1 mind az R4 ellenanyag esetében szinte teljesen eltűnik az embriók teljes területéről, (C, F) míg a *dDAAM*^{Ex68}; *TR* embriókban szinte kizárólag a tracheában detektálható a dDAAM jel. A *dDAAM*^{Ex68}; *TR* nagy felbontású képein pöttyökben megjelenő dDAAM aggregátumok láthatóak mindkét ellenanyaggal. A skála mértéke: 20 μ m (A-F), 5 μ m (nagy felbontású képek a panelek sarkában A-F).

Az embrionális trachearendszer vizsgálatához az E-Cad ellenanyagot használtuk markerként, amely az embrionális sejthatárokat jelöli ki. A vad típusú embriókban a dDAAM-R1 és dDAAM-R4 ellenanyag specifikusan kijelöli az embrionális tracheahálózatot, amelynek mintázata leginkább szubkortikális (45. ábra A, D). A *dDAAM^{Ex68}* embriókban a dDAAM-R1 és dDAAM-R4 festés szinte teljesen eltűnik az egész embrióból (45. ábra B, E), viszont a *dDAAM^{Ex68}; TR* embriókban kizárólag a tracheában (45. ábra C, F) detektálható a dDAAM jel. A kinagyított képeken jól látszik, hogy míg a vad típusú embriók trachea ágaiban a dDAAM egységes szubkortikális mintát mutat (45. ábra A, D), addig a *dDAAM^{Ex68}; TR* embriókban a dDAAM gyakran pöttyökben aggregálódik (45. ábra C, F) valószínűleg a magasabb fehérje szint miatt. Összességében a dDAAM-R1 és dDAAM-R4 ellenanyag egyaránt felismeri az endogén és az aggregált dDAAM fehérjét is. Az aggregátumokban felhalmozódó dDAAM valószínűleg inaktív, mert a trachea specifikus FL-DAAM túltermelésnek nincs trachea fenotípusa ellentétben a konstitutívan aktív C-DAAM formával [228], ezért nem valószínű, hogy bármelyik ellenanyag is csak az aktív vagy az inaktív fehérjét ismerné fel.

46. ábra A dDAAM nagyon erős kolokalizációt mutat a preszinaptikus Brp-vel. A kontroll (*w¹¹¹⁸*) NMJ terminálisokat anti-dDAAM-R1 (zöld), anti-GluRIII (magenta) és anti-Brp (magenta) immunfestésekkel vizsgáltuk a 4-es izomnál. A dDAAM pöttyyszerű lokalizációja részlegesen átfed a posztszinaptikus GluRIII klasztereivel, míg a Brp esetében majdnem teljes az átfedés. A skála mértéke: 2 μ m (A, B).

A dDAAM-R1 és R4 ellenanyag tesztelése után megvizsgáltuk, hogy a dDAAM-R1 pontszerű klaszterei a preszinaptikus aktív zónákkal vagy a posztszinaptikus GluR klaszterekkel fednek át. Ennek eldöntésére immunfestéseket végeztünk, amelyek alapján a dDAAM egyértelműen preszinaptikus lokalizációt mutat, ahol szinte teljesen átfed az aktív zóna magi komponensével, a Brp-vel. Nagy felbontású STED mikroszkópiát alkalmazva az anti-Brp N term ellenanyag mintázata felülnézetből egy pontot rajzol ki, míg az anti-Brp C term

(nc82) immunfestés szintén felülnézetből egy gyűrű alakú struktúrát vesz fel a Brp N-term körül (19. ábra A) [184]. Kíváncsiak voltunk vajon a dDAAM a Brp N- vagy C-terminális részénél található. A jobb képminőség és felbontás érdekében két csatornás STED mikroszkópiát alkalmaztunk, amellyel 50 nm-es laterális felbontást értünk el. A felülnézeti STED képeken a dDAAM jel az anti-Brp C-term ellenanyaghoz hasonlóan gyűrű alakú struktúrát rajzol ki, amely nagyrészt átfed a Brp C-term jellel (47. ábra A). A maximum jelintenzitások távolság becslése alapján a két jel nagyjából 20 nm-re helyezkedik el egymástól (47. ábra B), a dDAAM jel legnagyobb részt a Brp gyűrű belső pereménél található. Tehát a dDAAM a Brp azon fehérjéjéhez lokalizálódik, amely a szinaptikus vezikulák toborzásáért felelős.

47. ábra A dDAAM preszinaptikus lokalizációjának vizsgálata STED mikroszkópiával. (A) A kontroll (w^{1118}) NMJ festések alapján a dDAAM preszinaptikus pötyyszerű felhalmozódása az aktív zóna komplex disztális végéhez nagyon közel található. A fehérjék lokalizációját anti-Brp C-term.(zöld) és anti-dDAAM-R1 (magenta) ellenanyagokkal vizsgáltuk. (B) A dDAAM-Brp maximum jelintenzitásainak változása a szórás feltüntetésével ($n \geq 20$). A skála mértéke: 750 nm (A), 250 nm nagy felbontású oldal és felülnézet (A).

Az aktív zóna összeszerelődésének első lépései közé tartozik az olyan központi vázelemek megjelenése, mint pl. a Brp [182, 184, 185]. A Brp jelenléte nagyon fontos az aktív zóna képződésben, mert a fehérje hiányában nem jönnek létre funkcionális aktív zónák [182]. Kíváncsiak voltunk arra, hogy preszinaptikus aktív zóna komplexek hiányában létrejönnek-e dDAAM klaszterek, és ha nem, akkor mi történik a fehérjével. Létrehoztunk transzheterozigóta *brp* null mutáns állatokat, amelyekben nem meglepő módon eltűntek a preszinaptikus dDAAM klaszterek (48. ábra).

48. ábra A dDAAM fehérje aktív zóna közeli lokalizációja Brp függő. A kontroll (A, A'), *dDAAM^{Ex68}* (B, B') és *brp* null (*brp^{Δ6.1}/brp⁶⁹*) (C, C') NMJ terminálisokat anti-dDAAM-R1 (zöld), anti-Brp (magenta) és anti-HRP (cián) immunfestésekkel vizsgáltuk. Ellentétben a vad típusú kontrollal a *dDAAM* és *brp* null mutáns NMJ-kben a dDAAM preszinaptikus pöttyszerű felhalmozódása szinte teljesen eltűnik. A fehér négyzetek az A, B és C paneleken a nagy felbontású képek (A', B', C') helyeit jelzik. A skála mértéke: 5 μ m (A, B, C), 2 μ m (A', B', C').

Western blot kísérletek alapján elmondható, hogy a Brp hiánya valószínűleg nem befolyásolja a dDAAM fehérje stabilitását, mert a vad és a *brp^{null}* mintákban a dDAAM fehérje szintje közel azonos (49. ábra A). Ezenkívül a *brp* null mutáns NMJ végződésekből az anti-dDAAM-R4 kortikális mintája a vad típuséhoz hasonló (49. ábra B, C). Következésképpen a dDAAM klaszterek létrejöttéhez Brp függő aktív zóna képződésre van szükség, de az aktív zóna komplex hiánya nem befolyásolja a dDAAM fehérje stabilitását.

49. ábra A Brp hiánya nem befolyásolja a dDAAM fehérje stabilitását. (A) A Western blot kísérlet alapján a *brp* null KIR-ben a dDAAM kifejeződési szintje közel azonos a vad típusú kontrollal (*w¹¹¹⁸*). (B, C) A kontroll és a *brp* mutáns NMJ végződéseket anti-Brp (magenta), anti-dDAAM-R4 (zöld) és anti-HRP (cián) immunfestésekkel vizsgáltuk. A Brp fehérje hiányában (C) a kortikális dDAAM felhalmozódás a vad típuséhoz (B) nagyon hasonló, amely nagyrészt átfed a preszinaptikus membrán markerral. A skála mértéke: 3 μ m (B, C).

A következőkben megvizsgáltuk, hogy a dDAAM hiánya okoz-e bármilyen változást az aktív zóna ultrastruktúrájában. Először STED mikroszkóppal vizsgáltuk a vad és a *dDAAM^{Ex68}* aktív zóna szerveződést anti-Brp C- és N-term kettős immunfestéssel. A *dDAAM* null mutánsokban a Brp mintázat mindkét ellenanyaggal a vad típushoz hasonlóan látszott, azonban a Brp C term által kirajzolt gyűrű átmérője kis mértékben megnőtt a mutánsokban a vad típushoz képest (50. ábra A, B, E). Az aktív zóna vázát felépítő elektrodenz fehérjekomplex elektronmikroszkóppal kiválóan vizsgálható, mert egy jellegzetes T alakú struktúrát vesz fel.

50. ábra A dDAAM hiánya befolyásolja az aktív zóna komplex ultrastrukturális felépítését. (A, B) Az aktív zóna morfológiájának vizsgálata STED mikroszkópos képeken kontroll (*w¹¹¹⁸*) (A) és *dDAAM^{Ex68}* (B) mutáns NMJ-ben anti-Brp N (magenta) és C term (zöld) ellenanyagok használatával. A STED analízis alapján a Brp gyűrű átmérőjének enyhe nem szignifikáns (n.s.) mértékű emelkedése figyelhető meg a *dDAAM* mutánsokban (E). (C, D, F) Az aktív zóna elektronmikroszkóppal történő vizsgálata alapján a *dDAAM* mutánsokban a T-bar tető enyhe nem szignifikáns (n.s.) mértékű kiszélesedése (F) valamint az aktív zóna membránjának 200 nm-es környezetében az SV szám szignifikáns mértékű kismértékű csökkenése (G) figyelhető meg. (E-G) A Brp gyűrű átmérőjének, a T-bar tető hosszának és az SV szám változásának vizsgálata kontroll és *dDAAM* mutáns állatokban ($n \geq 70$). A skála mértéke: 750 nm (A, B), 100 nm (C, D). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. *** $p < 0.001$

Az előző kísérletekhez hasonlóan vad és *dDAAM^{Ex68}* mutánsokban vizsgáltuk meg az aktív zóna szerveződést. A *dDAAM* mutánsokban drasztikus változást nem láttunk az aktív zóna komplex T alakú struktúrájában (T-bar), viszont a T struktúra felső része kissé megnyúlt a *dDAAM^{Ex68}* mutánsban a vadhoz képest (50. ábra C, D, F). Az elektronmikroszkópos vizsgálatok azt is lehetővé tették, hogy megvizsgáljuk a szinaptikus vezikulák (SV) számát az aktív zóna környezetében. Megfigyelhető volt, hogy a *dDAAM* mutáns aktív zónák 200 nm-es környezetében az SV sűrűség egy kicsit kisebb, de szignifikáns csökkenést mutatott (50. ábra C, D, G). Az ultrastrukturális vizsgálatok alapján a *dDAAM* nem létfontosságú az aktív zóna komplex kialakításában és az SV-k összegyűjtésében, de képes lehet finoman hangolni ezeket a folyamatokat. Illetve az is elképzelhető, hogy azért látunk gyenge fenotípusokat az aktív zónák tekintetében, mert a *dDAAM* aktív zónához köthető funkciója redundáns lehet esetleg más forminokéval.

51. ábra A dDAAM befolyásolja a szinaptikus transzmisszió hatékonyságát. (A-E) A 6/7 izom NMJ terminálisainak elektrofiziológiai vizsgálata (TEVC, two-electrode voltage clamp) kontroll (*w¹¹¹⁸*) és *dDAAM^{Ex68}; TR* állatokban. (A, C) A *dDAAM* hiányában kiváltott EPSP (excitatorikus posztzinaptikus potenciál) amplitúdója körülbelül 19%-kal kisebb a vad típusú kontrollhoz képest, (B, D, E) ettől eltérően a spontán excitatorikus miniáramok karakterisztikájában nem láttunk szignifikáns (n.s.) különbséget. Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. * $p < 0.05$, *** $p < 0.001$. $n \geq 10$ (C-E).

Végezetül elektrofiziológiai módszerekkel megvizsgáltuk azt, hogy a *dDAAM* hiánya befolyásolja-e a szinaptikus transzmisszió hatékonyságát. TEVC (two-electrode voltage clamp)

kísérleteket végeztünk vad típusú és mutáns $dDAAM^{Ex68}$; *TR* állatokon. Habár a spontán szinaptikus áramok karakterisztikájában nem láttunk változást (51. ábra B, D, E), a kiváltott akciós potenciál (AP) amplitúdója 19%-kal kisebb volt a $dDAAM^{Ex68}$; *TR* állatokban a vad típushoz képest (51. ábra A, C). A $dDAAM$ mutánsokban megfigyelhető csökkent SV szám az aktív zóna környezetében valószínűleg összefüggésben van a csökkent kiváltott AP-val, de hogy pontosan milyen mechanizmusokat érint, az további vizsgálatokat igényel. Összességében elmondható, hogy a $dDAAM$ tagja az aktív zóna fehérjekomplexnek, amelynek hiánya befolyásolja a szinaptikus felszabadulás mértékét.

EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

Az idegrendszer fejlődése során milliónyi szinaptikus kapcsolat jön létre és szűnik meg, amely nélkülözhetetlen feltétele olyan komplex idegi folyamatoknak, mint pl. a tanulás, a memóriaképzés és az érzékelés. Az utóbbi évtizedek neurobiológiai kutatásai fényt derítettek arra, hogy a szinaptikus fejlődés, funkció és struktúra fenntartásának bonyolult folyamataiban a sejtváznak a dinamikus átrendeződése is fontos szerepet játszik. Az aktin és a mikrotubulus sejtvázzal egyaránt részt vesz a szinaptikus stabilizálódás, a bouton képződés és a szinaptikus vezikulák felszabadulásának a mechanizmusában. Az aktin és a mikrotubulus organizáció összetett jelátviteli útvonalak szabályozásán keresztül valósul meg. A tudásunk folyamatosan bővül új upstream sejtvázzszabályozó elemek megismerésével, viszont még keveset tudunk arról, hogy a sejtvázz effektor fehérjéi miként kötődnek az aktin/mikrotubulus sejtvázzhoz és hogyan szabályozzák azokat. A sejtvázz effektor fehérjéinek vizsgálatával jobban megérthetjük a sejtvázz-átrendeződések dinamikus folyamatait. A figyelmünk fókuszába a formin fehérjecsaldába tartozó dDAAM került, amely az aktin összeszerelő aktivitása révén szerepet játszik az axon növekedés és navigáció folyamataiban [231, 232]. Legutóbbi *in vitro* eredményeink alapján a dDAAM az aktin mellett képes a mikrotubulusokhoz is kötődni, amelynek *in vivo* szerepe lehet a növekedési kúpnál az aktin/mikrotubulus kölcsönhatásokban [129]. A dolgozatban szereplő kísérletek arra összpontosultak, hogy megvizsgáljuk a dDAAM sejtvázz effektor fehérje miként befolyásolja a sejtvázzszerveződést a szinaptikus fejlődés és funkció folyamataiban.

Először megállapítottuk, hogy a dDAAM a szinapszisképződés egyik korai szereplője, már az embrionális fejlődés során szükség van a fehérje kifejeződésére. A dDAAM fehérje hiányában az embrionális ISNb motoraxon növekedési és navigálási hibát egyaránt mutat az NMJ terminálisoknál. A vizsgálatainkat kiterjesztve a lárvális NMJ végződés vizsgálatára megállapítható, hogy a dDAAM pre- és posztzinaptikusan is kifejeződik. A *dDAAM* mutáns NMJ terminális lárvában abnormális fejlődést mutat bouton szám és NMJ morfológia tekintetében. A dDAAM hiányos motoraxon végzésekben drasztikus bouton szám csökkenés figyelhető meg, illetve a boutonokat összekötő inter-boutonikus régió kiszélesedik bouton

fúziós fenotípust eredményezve. További funkcióvesztéses vizsgálatokból kiderült, hogy a látott NMJ fenotípusokat elsősorban a dDAAM preszinaptikus hiánya okozza.

Mivel az eredmények a dDAAM preszinaptikus szerepére utaltak, kíváncsiak voltunk arra, hogy a dDAAM hiánya befolyásolja-e a preszinaptikus mikrotubulus és/vagy aktin szerveződést a motoraxon végződésben. Mivel a Futsch, mint preszinaptikus mikrotubulus marker a legígéretesebb dDAAM kölcsönható partnernek tűnt, ezért a mikrotubulus rendszert vizsgáltuk először a *dDAAM* mutánsokban. A vad típusú NMJ-ben látható rendezett központi mikrotubulus köteg struktúrája dDAAM hiányában fragmentált és dezorganizált szerveződést mutat. A forminokat eddig főként aktin polimerizációs faktorként ismertük, de az utóbbi időben egyre több munka foglalkozik a mikrotubuluskötő funkciójukkal is. A csoportunk eredményei alapján a dDAAM képes *in vitro* kötődni a mikrotubulusokhoz valamint a dDAAM fehérje hiánya befolyásolja a mikrotubulusok morfológiáját és azok dinamikájának néhány aspektusát primer idegsejtekben [129]. Egy másik érdekes megfigyelésünk, hogy a dDAAM *in vitro* képes keresztkötni az aktin és mikrotubulus filamentumokat, amely nagyon fontos lehet az axon növekedés irányának a meghatározásában. A fentiek miatt úgy gondoltuk, érdekes lenne megvizsgálni, hogy vajon a dDAAM aktin és/vagy mikrotubuluskötő funkciója fontos-e a bouton képződésben. A menekítési kísérletek alapján a dDAAM aktin összeszerelő aktivitása nem szükséges a bouton képződés során. Ezután felmerült bennünk a kérdés, hogy a *dDAAM* mutáns NMJ-ben vajon a preszinaptikus aktin organizáció érintett-e. A *dDAAM* mutáns preszinaptikus motoraxon végződésben az aktin szerveződés a vad típushoz nagyon hasonló volt, így ez az eredmény megerősített bennünket abban, hogy a dDAAM aktin összeszerelő aktivitása nem szükséges a bouton képződés során.

A funkcióvesztéses kísérletek alapján a dDAAM preszinaptikus jelenléte képes elősegíteni a bouton képződést. Azért, hogy megerősítsük ezt a megfigyelésünket funkcionyeréses vizsgálatokat végeztünk. A dDAAM a DRF forminok tagjaként rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a fehérje aktivátor hiányában inaktív konformációt vesz fel. A fehérje N- és C-terminális része közötti intramolekuláris interakció gátolja a katalitikus FH1-FH2 domének aktivitását [42, 44]. A fehérje N-terminális régiójának eltávolításával létrehoztunk egy olyan csonkolt dDAAM formát (C-DAAM), amely aktív formaként viselkedett. A C-DAAM preszinaptikus túltermelése jelentős mértékben megemelte a bouton

számot, ami megerősíti azt az elképzelésünket, hogy a dDAAM a bouton képződés pozitív szabályozó faktora.

Egy nagyjából 10 évvel ezelőtti közleményben bemutatták, hogy egy másik DRF formin a Dia fontos szerepet játszik az NMJ fejlődésben [196]. A Dia a pre- és posztzinaptikus oldalon egyaránt kifejeződik, de a funkcionális vizsgálatok a Dia preszinaptikus szerepére utaltak. A Dia hiánya egyértelműen befolyásolja az aktin és mikrotubulus szerveződést, ami bouton szám csökkenést okoz. Bemutatták továbbá, hogy a Dia valószínűleg a Dlar és a Trio által szabályozott jelátviteli útvonal effektor fehérjéje [196]. A dDAAM hasonlóan a Dia-hoz mindkét szinaptikus oldalon jelen van, aminek hiánya szintén csökkent bouton számot eredményez. Ezenkívül közös jellemzője még a két fehérjének, hogy a preszinaptikus hiányuk okozza a bouton szám csökkenést. Fontos különbség viszont, hogy kizárólag a dDAAM mutánsokban figyelhető meg a kiszélesedő inter-bouton régió a *dia* mutánsokban nem. Ezenkívül a sejtváza gyakorolt hatásukban is lényeges különbségek vannak. A Dia-tól eltérően a dDAAM hiányának nincs hatása az aktin szerveződésre, amit megerősít az, hogy az aktinkötésre képtelen dDAAM forma képes menekíteni az NMJ fejlődési hibákat. A mikrotubulusok szerveződésére mindkét forminnak hatása van, de míg a dDAAM hiánya a teljes mikrotubulus köteg instabilitását okozza, addig a Dia esetében „csak” a dinamikus pionír mikrotubulusok érintettek. Végül a két formin úgy tűnik két különböző jelátviteli útvonal szabályozása alatt áll. A dDAAM a genetikai interakciós tesztek és az NMJ fenotípusok alapján egyértelműen a Wg/Ank2 jelátviteli úthoz tartozik, ezzel szemben a Dia a Dlar és a Trio fehérjék szabályozása alatt áll. Érdekes módon más idegrendszeri struktúrákra is jellemző, hogy ez a két formin egymástól függetlenül működik. A gombatestben a dDAAM a nyúlványnövekedés pozitív regulátora a Wnt/PCP rendszeren keresztül [231], míg a Dia egy eddig ismeretlen jelátviteli útvonalban inkább a nyúlvány növekedés leállításáért felelős. Összességében a két formin típusú fehérje különböző módon szabályozódik és jelentősen eltér a preszinaptikus mikrotubulus szerveződésre gyakorolt hatásuk. A Dia elsősorban a mikrotubulus dinamikát modulálja a pionír mikrotubulusokon keresztül [196], míg a dDAAM a központi mikrotubulus köteg stabilizációjáért felelős a preszinaptikus végződésben.

A mikrotubulus rendszer megfelelő szabályozása rendkívül fontos a szinaptikus bouton képződés mechanizmusában. Számos jelátviteli utat hoztak összefüggésbe a preszinaptikus

mikrotubulusokkal, ezek egyik legfontosabb képviselője a Wg/Wnt jelátviteli útvonal [219, 220]. A kanonikus Wnt szignalizációban a Wg kötődése a Fz receptorhoz és ko-receptorához az LRP5/6-hoz (*Drosophila* Arrow) aktiválja a Dishevelled (Dsh) fehérjét, ami gátolja a destruktív komplexet. Wnt hiányában a destruktív komplex egyik tagja a Gsk3- β (*Drosophila* Shaggy vagy Sgg) foszforilálja a β -katenint, ami annak lebontásához vezet. Ezzel szemben a Wnt molekula bekötődésével a Dsh aktiválódik, ami a destruktív komplex szétesését eredményezi. A destruktív komplex hiányában a β -katenin feldúsul, és a sejtmagba kerül, ahol Wnt target géneket aktivál [145]. Jelenlegi tudásunk szerint a *Drosophila* NMJ preszinaptikus oldalán a divergens kanonikus Wnt szignalizáció működik, ami eltérően a klasszikus kanonikus útvonaltól β -katenin független és nem befolyásolja a Wnt célgének transzkripcióját. Wnt hiányában az Sgg foszforilálja a mikrotubuluskötő Futsch fehérjét, ami olyan változást okoz a mikrotubulus szerveződésben, ami csökkenti a szinaptikus bouton képződést. Ezzel szemben Wnt jelenlétében egy eddig ismeretlen receptor és az Arrow ko-receptor komplexe aktiválja a Dsh fehérjét gátolva az Sgg függő Futsch foszforilációt, ami a mikrotubulusok stabilizálásához vezet, ezzel elősegítve az új boutonok létrejöttét [219, 220]. Fontos megemlíteni, hogy a dDAAM emlős homológját az mDAAM1 fehérjét, eredetileg egy Dsh asszociált Wnt jelátviteli komponensként azonosították [136]. Kezdetben az mDAAM1 fehérjét a nem kanonikus Wnt/PCP rendszerhez kötötték [136], majd később a kanonikus Wnt útvonallal is kapcsolatba hozták. A mi csoportunk is a *Drosophila* DAAM-ot először a nem kanonikus Wnt/PCP rendszerrel hozta összefüggésbe az axon növekedés során [231]. A legújabb, a dolgozatban szereplő eredményeink pedig azt sugallják, hogy a dDAAM a divergens kanonikus Wnt jelátviteli út egyik komponenseként befolyásolja a szinaptikus fejlődés folyamatait [233]. A fentiek alapján a dDAAM, hasonlóan a Dishevelled fehérjéhez, a kanonikus és nem kanonikus Wnt jelátviteli útvonal tagjaként egyaránt jellemezhető. A kísérleteinkben bebizonyítottuk, hogy a wg és a dDAAM domináns genetikai kölcsönhatást mutat az NMJ fejlődésben. A Wg és a dDAAM kapcsolatát erősíti, hogy a dDAAM funkcióvesztéses fenotípusa számos elemében hasonlít a wg fenotípushoz. Mindkét mutáns NMJ végződésben megfigyelhető a boutonok számának a csökkenése és a mikrotubulus rendszer instabilitása. Az NMJ morfológiát érintő eltérések mellett a dDAAM és a Wg hiánya egyaránt hatással van az aktív zóna komplex felépítésére. Az Ank2 a Wg jelátviteli út

szabályozása által szintén befolyásolja a mikrotubulus dinamikát és szerveződést. Az *Ank2* egy óriási adaptor molekula, amely összekapcsolja a kortikális Spektrin/aktin hálózatot a központi mikrotubulus köteggel. Az *Ank2* null mutáció a terminális boutonokban gyakran a mikrotubulus szerveződés teljes hiányát és a központi mikrotubulus köteg jelentős megvastagodását okozza [216, 217]. Habár a bouton fúziós fenotípus az *Ank2* és *Wg* jelátviteli útvonal mutánsaira (*wg*, *dsh*, *arr*) egyaránt jellemző [219, 220] (kivéve *futsch*, *sgg*), fontos különbség, hogy csak az *Ank2* hiányában jön létre mikrotubulus aggregáció a preszinaptikus végződésben. Tehát az *Ank2* valószínűleg más jelátviteli útvonallal is kapcsolatban lehet. Ettől függetlenül mindenképpen elmondható, hogy az *Ank2* és a *Futsch* a *Wg/Arr/Dsh/Sgg* szignalizációs egységtől downstream helyezkedik el [223]. A kérdés az, hogy vajon a *dDAAM* ebben a hierarchia viszonyban hol helyezkedik el. A genetikai episztázis kísérletekben a *dDAAM* hiánya egyértelműen szuppresszálta az *Ank2* mutáns aggregált mikrotubulus fenotípusát. A *Futsch*-hoz hasonlóan a *dDAAM* szükséges ahhoz, hogy az *Ank2* mutánsokban kialakuljon a preszinaptikus mikrotubulus akkumuláció. Ebben a kísérleti elrendezésben a *dDAAM* az *Ank2*-től downstream helyezkedik el, mint mikrotubulus stabilizáló faktor. A *dDAAM; Ank2* kettős mutáns fenotípusa viszont nem teljesen azonos a *dDAAM* mutáns NMJ fenotípusával, ami arra utal, hogy nem egy egyszerű alá-fölé rendeltségi viszony van a két fehérje között. Ettől eltérően a *dDAAM/futsch* kettős mutáns állatokban csökkent bouton szám, bouton fúzió valamint szakadozott mikrotubulus kötegek észlelhetőek hasonlóan a *dDAAM* egyes mutánsokhoz. Az eddigi eredmények alapján valószínűleg az *Ank2*, *Futsch* és *dDAAM*, mint sejtváz effektor fehérjék egy általunk eddig nem ismert komplex jelátviteli struktúrában szabályozzák a mikrotubulus dinamikát és szerveződést.

Az információ akciós potenciál formájában érkezik a preszinaptikus idegvégződésre és adódik át jelmolekulák (glutamát) segítségével a posztzinaptikus félre. A preszinaptikus félen a glutamát apró vezikulákba csomagolódik, amelyek felszabadulása az aktív zónánál történik. Lokalizációs vizsgálatok alapján a *dDAAM* fehérje a preszinaptikus oldalon membránhoz közeli kortikális és aktív zóna felhalmozódást egyaránt mutat. A nagy felbontású STED mikroszkópia lehetővé tette, hogy megállapítsuk, hogy a *dDAAM* felhalmozódás egy gyűrűszerű struktúrát rajzol ki, ami nagyrészt átfed a *Brp* C-terminális fehérjerész mintázatával, ami az aktív zóna fehérjekomplex disztális vége [184]. A lokalizációs vizsgálatok mellett

funkcionális bizonyítékokat is találtunk arra vonatkozólag, hogy a dDAAM befolyásolhatja az aktív zóna kialakulását, illetve annak működését. Megvizsgálva az aktív zónák ultrastrukturális szerkezetét a *dDAAM* mutáns állatokban az aktív zóna átmérője kis mértékben megnőtt. Továbbá a kiváltott AP amplitúdója kisebb a *dDAAM* mutánsban, amit megerősít az, hogy az aktív zóna környezetében a szinaptikus vezikulák számának a csökkenését tapasztalhatjuk. Érdekes módon nemrégiben kiderült, hogy a Futsch szintén modulálja a szinaptikus transzmissziót [234]. A dDAAM-hoz hasonlóan a Futsch az aktív zóna komplex környezetében is megtalálható valamint a *futsch* mutánsban a szinaptikus felszabadulás hatékonysága csökken. Mivel mindkét fehérje a mikrotubulusok stabilizációjáért és organizációjáért lehet felelős, ezért elképzelhető, hogy részt vesznek az aktív zóna és a központi mikrotubulus köteg közti interakció kialakításában.

A mikrotubulus rendszer mellett jól ismert tény, hogy az F-aktin szerveződés szerepet játszik a szinaptikus felszabadulásban és tagja az aktív zóna fehérjekomplexnek [98, 192, 201, 202]. Habár az aktin összeszerelődésének a szabályozása nagyrészt ismeretlen, azt lehet tudni, hogy az aktív zóna komponens Piccolo egy fontos szabályozója gerincesekben az aktin filamentumoknak, azáltal, hogy számos aktinkötő fehérjével kölcsönhatásba kerül és platformot biztosít a térbeli aktin filamentumok kialakulásának [204, 206]. Primer neuron kultúrákban kimutatták, hogy az aktivált DAAM1 a Piccolo-hoz kötődik, és ez az interakció térben irányítja az F-aktin összeszerelődést. A DAAM1 hiányos neuronokban a preszinaptikus F-aktin szerveződés jelentősen megváltozik [206]. A mi eredményeink alapján a dDAAM aktin összeszerelő aktivitására nincs szükség a szinaptikus bouton képződésben, ettől független nem tudjuk kizárni annak a lehetőségét, hogy a dDAAM rendelkezik aktinhoz köthető funkcióval az aktív zóna környezetében. Mivel a dDAAM elősegíti az aktin-mikrotubulus interakciót a növekedési kúpban [129], elképzelhető, hogy az aktív zóna disztális részén fontos lehet ez a funkció a szinaptikus vezikulák toborzásában. További kísérletek szükségesek, hogy jobban megértsük ezeket a folyamatokat.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

Felhasznált *Drosophila* törzsek

Bloomingtoni *Drosophila* Törzsközpontból szerzett mutáns törzsek a katalógus számok feltüntetésével:

#3605 *w*¹¹¹⁸

#39058 *P{TRiP.HMS01978}attP2* (korábban dDAAM-RNSi 2)

#27390 *Mef2-Gal4*

#8816 *D42-Gal4*

#458 *elav*^{C155}-*Gal4*

#3242 *tkv*⁷

#8774 *Dlar*^{13.2}

#5351 *wg*¹⁻⁸

#8805 *futsch*^{N94}

#9138 *dia*⁵

Korábbi közleményekben használt mutáns törzsek a hivatkozás vagy a forrás feltüntetésével:

dDAAM^{Ex68} [[228](#)]

btl-Gal4 (C. Samakovlis)

futsch^{K68} (M-L. Parmentier)

brp^{A6.1} [[185](#)]

*brp*⁶⁹ [[182](#)]

*Ank2*⁵¹⁸ [[217](#)]

*Ank2-XL*⁴ [[218](#)]

A következő törzseket hoztuk létre:

UAS-CDAAM^{3XFlag}: A C-DAAM-nak megfelelő szekvencia részletet először ENTRY vektorba klónoztuk, majd LR reakcióval pTWF-C-DAAM konstruktot hoztunk létre, amit random a genomba építettünk be. Az általunk használt transzgenikus törzs 2. kromoszómáján található a túltermelő konstrukt.

P{UAS-FLDAAM}attPVIE-260B, *P{UAS-FLDAAM*⁷³²*}attPVIE-260B*, *P{UAS-FLDAAM*⁸⁷⁶⁻⁸⁸¹*}attPVIE-260B*. A különböző FLDAAM szekvencia részleteket először ENTRY vektorba klónoztuk (primer lista), majd LR reakcióval pTWattB-FLDAAM, pTWattB-FLDAAM⁷³² és

pTWattB-FLDAAM⁸⁷⁶⁻⁸⁸¹ konstruktokat hoztunk létre, amelyeket a 2. kromoszómán ugyanabba a genomikus pozícióba építettünk be (attP-VIE-260B).

P{UAS-shRNS-dDAAMFH2}attP2 (korábban dDAAM-RNSi 1): A 21 bázispár hosszúságú dDAAM szekvencia részletet (primer lista) pV20 vektorba klónoztuk, amit a 3. kromoszómán az attP2 dokkoló helyre építettünk be.

dDAAM^{3xFlag}: A Flag tagelt knock-in allélt gén konverziós technika segítségével hoztuk létre a korábban leírtaknak megfelelően [235].

futsch^{CR13} és *dDAAM^{Ex68}*, *futsch^{CR13}*: A *futsch* mutáns törzseket CRISPR/Cas9 technika segítségével hoztuk létre egy korábbi közleménynek a módszertana alapján [236]. Röviden a kísérlet menete a következő: vad (*w¹¹¹⁸*) és *dDAAM* mutáns háttéren 300 bázispáros deléciót hoztunk létre a *futsch* első kódoló exonjában. A létrejövő deléció frameshiftet és ezáltal korai terminációt okoz a fehérje transzlációjában. Az immunfestés és a Western blot alapján a *futsch^{CR13}* protein null allélnek tekinthető.

Lárvafile preparálása

A lárvákat PBS-ben boncoltam, majd szobahőmérsékleten 20 percig fixáltam 4%-os PBS-ben hígított paraformaldehiddel. A fixálás után a lárvafileket 3x20 percig PBST-vel mostam, majd Eppendorf csőbe helyeztem, és PBS-BT-ben 2h-t szobahőn blokkoltam.

Embriók preparálása

Az embriókat a táptalajról desztillált vízzel lemosva nylon membránon fogtuk fel, majd következő lépésben 1 percig hipóba (Clorox) áztattuk őket, eltávolítva az embrió külső, korion burkát. A dekorionizált embriókat desztillált vízzel mostuk, majd a felesleges vizet leitatva róluk, 3 ml N-heptánt tartalmazó szcintillációs üvegbe helyeztük át őket és 3 ml PBS-sel hígított 4%-os formaldehidet mértünk rá. A fixálás 20 percig tartott, ezután eltávolítottuk a formaldehydes (alsó) fázist. Következő lépésként 1,5 tf -20°C-os metanolt mértünk az embriókra, és a két elkülönülő fázist 45 mp-ig folyamatosan összeráztuk. A rázás során az embriók kb. 80%-nál felszakad az őket borító vitellin membrán, és a devitellinizált embriók az alsó (metanol) fázisba süllyednek. A devitellinizált embriókat Eppendorf csőbe tettük. Ezután az embriókra 1 ml PBS : metanol (1:1) keveréket mértünk. 10 perc múlva a PBS : metanol-os oldatot eltávolítottuk, 15 perc múlva a PBS : metanol-os oldatot eltávolítottuk, és PBS-T-vel

(PBS, 0,1% Triton-X) 3-szor 10 percig mostuk az embriókat, majd PBS-BT-vel (PBS, 0,1% Triton-X, 0,2% BSA) 2 h-t blokkoltuk.

Immunhisztokémia

A blokkolt, devitellinizált embriókat, vagy a kiboncolt és lefixált lárvafileket egy éjszakán keresztül (kb.18h) festettem 4°C-on PBS-BT-vel megfelelő koncentrációra kihígított elsődleges antitesttel, majd 4-ször 20 percig mostam őket. Ezután megfelelő koncentrációra PBS-BT-vel kihígított fluoreszcens vagy biotinilált másodlagos ellenanyagot tettem rájuk, és 2-3 h-t inkubáltam. A következő elsődleges ellenanyagokat használtam: nyúl anti-HRP (Jackson) 1:200, kecske anti-HRP-Alexa-647 (Jackson) 1:600, egér anti-Dlg (DSHB, 4F3) 1:100, egér anti-Futsch (DSHB, 22C10) 1:200, nyúl anti-Futsch C-term 1:1000 [221], egér anti-Brp C-term. (DSHB, nc82), nyúl anti-Brp N-term.[184] 1:1000, egér anti-acetilált-tubulin (Sigma, 6-11B-1) 1:1000, nyúl anti-dDAAM-R1 [228] 1:1000, nyúl anti-dDAAM-R4 [232] 1:500. Az elsődleges ellenanyag használatát követően a megfelelő Alexa-488,546 és 647 (Invitrogen) fluoreszcens festékekkel konjugált másodlagos ellenanyagokat használtuk.

Western blot

A kísérletek során mintánként 10 adult vagy lárvális agyat lizáltunk 100 µl lízis pufferben (0,1% SDS; 0,2% NaDoc; 0,05% NP40; 150mM NaCl; 50mM Tris-HCl), majd 10 percig forraltuk őket. A forralás után a mintákat 10 percig 13.000 rpm-en lecentrifugáltuk, majd denaturáló SDS gélen megfuttattuk. Az elválasztott fehérjéket Millipore PVDF membránra blottoltuk. A blottolási lépést követően a membránokat 5% sovány tejport tartalmazó TBST-ben blokkoltuk 3h-ig szobahőn, majd egy éjszakán át inkubáltuk őket a blokkolóban hígított megfelelő elsődleges ellenanyagokkal. Ezt követően a membránokat TBST-ben 3x20 percig mostuk, majd a megfelelő másodlagos ellenanyagokkal kiegészített 5% sovány tejpor TBST-s oldatában 1 h-t szobahőn inkubáltuk. Ezek után a membránokat 3x20 percig TBST-ben mostuk, majd Millipore Immobilon kemilumineszcens detekciós reagenssel előhívtuk. A következő elsődleges ellenanyagokat használtuk: nyúl anti-dDAAM-R4 [232] (1:500), egér anti-Flag (Sigma, M2, 1:500), egér anti-Futsch (DSHB, 22C10, 1:100) és nyúl anti-glycogen phosphorylase (1:20.000). Az elsődleges ellenanyag használatát követően a megfelelő anti-HRP (Invitrogen) másodlagos ellenanyagot használtuk 1:10.000 hígításban.

Tömegspektrometriai vizsgálat

Az anti-Flag affinitástisztítás után az eluált fehérjéket denaturáló gélelektroforézissel (SDS-PAGE) futtattuk meg. A vad típusú és a dDAAM::Flag sávokat kivágtuk a gélből és ezeket 12 darabra vágtuk, amelyeket tripszinnel emésztettünk. A tripszines kezelés után létrejövő peptideket LC-MS/MS analízissel vizsgáltuk nanoAcquity UPLC Orbitrap-Elite mass spectrometer (Thermo Fisher Scientific) rendszer segítségével. A csapdázáshoz 3% B oszlopot (Waters Symmetry C18 180 μm ×20 mm oszlop, 5 μm partikulum méret, 100 Å pórusméret, folyási sebesség: 10 $\mu\text{l/min}$) használtunk majd a peptideket 10-40%-os B lineáris gradiensen szeparáltuk 90 percen keresztül (75 μm ×104 mm oszlop MagicC18AQ, 3 μm partikulum méret, 200 Å pórusméret, solvent A 0.1% hangyasav/víz elegyével, solvent B comprising 0.1% hangyasav/ACN elegyével, folyási sebesség: 400 nl/min). A 10 legnagyobb mennyiségben jelen lévő többszörösen töltött ionokat választottuk ki minden egyes MS szkennből (m/z: 380-1600), amelyeken MS/MS analízist végeztünk CID (Collision-induced dissociation) aktivációval (normalizált ütközési energia:35). Az MS spektrumokat Orbitrap készülékből, míg a CID spektrumokat lineáris ion csapdázóból nyertük. A nyers adatokat átalakítottuk PAVA program segítségével és a kereséshez a Protein Prospector (v.5.19.4.) programot használtuk. Az azonosított peptidszekvenciákat az Uniprot adatbázisban (2016/09/06 verzió, 42488 fehérje szekvencia) lévő *Drosophila melanogaster* fehérjék szekvenciáihoz illesztettük. A fehérjék relatív mennyisége az egyes mintákban megbecsülhető az ún. spektrumszámlálás módszerével. Ehhez először meghatározzuk, hogy az adott mintasorozaton belül egy adott fehérjére összesen hány azonosított peptid esik, illetve ezt a számot elosztjuk az összes azonosított peptidszámmal. A kapott hányados mintasorozatok közötti összehasonlításával megbecsülhető az adott fehérje mennyiségi változása, ha a normalizált peptidszámok hányadosa a medián érték 0.5*-énél kisebb vagy 2*-énél nagyobb, akkor tekintjük mérvadónak a változást. Azokat a fehérjéket tekintettük pozitív találatnak, amelyeket legalább 3 egyedi peptiddel azonosítottunk a dDAAM::Flag-et tartalmazó mintában.

Elektronmikroszkópia

A kiboncolt lárvefiléket előfixáltuk (10 perc; 4% PFA és 0.5% glutáraldehid 0.1 M PBS-ben), majd glutáraldehiddel (60 perc; 2% glutáraldehid in 0.1 M Na⁺-kakodilát) tovább fixáltuk. A kakodilát pufferes mosást követően posztfixálást végeztünk (1% ozmium-tetroxid, 0.8% K₄Fe(CN)₆, 0.1 M Na⁺-kakodilát puffer). A kakodilát pufferes és vizes mosást követően 1% uranil acetáttal festettük a mintákat. A mintákat alkohol sorban dehidratáltuk, majd Epon

műgyantába ágyasztuk. A műgyanta polimerizációt követően az öntőformákon 60-65 nm-es vastag szériákat készítettünk, amelyeket posztfixáltuk és festettük uranil-acetáttal, illetve ólom-citráttal. A képeket JEM 1011; JEOL elektronmikroszkóppal készítettük Orius 1200A; Gatan kamerával. A T-barok elemzését manuálisan végeztük. A T-barok, boutonok és egyedi állatok száma a következő volt: T-bar: $w^{1118}=84$, $dDAAM^{Ex68}=72$; bouton: $w^{1118}=74$, $dDAAM^{Ex68}=67$; egyedi állat: w^{1118} és $dDAAM^{Ex68}$: 6

Elektrofiziológia

TEVC méréseket 3. stádiumos hím lárvákon végeztük el 25°C-on. A boncolást és a TEVC méréseket is HL3 (haemolymph-like solution 3) oldatban (összetétel mM-os koncentrációban: 70 NaCl, 5 KCl, 20 MgCl₂, 10 NaHCO₃, 5 trehalóz, 115 szukróz, 5 HEPES, pH 7.2) végeztük el. A boncolást Ca²⁺ mentes HL3 oldatban, míg a méréseket 1.5 mM-os Ca²⁺ HL3 oldatban végeztük 25°C-on. A kiváltott EPSP-t és a mini excitatorikus áramokat a 6/7 izmoknál a 2. és 3. abdominális szegmentben mértük. A mini excitatorikus áramokat -80 mV- os feszültségzárral, míg a kiváltott EPSP-t -60 mV-os feszültségzárral mértük 0.2 Hz-es serkentés mellett. Csak azokat a sejteket használtuk további mérésekre, amelyeknek a kezdeti membránpotenciálja -50 és -70 mV közötti, illetve a belső ellenállása ≥ 4 M Ω volt.

Képvizsgálat és elemzés

A konfokális képeket Olympus FV-1000 Laser Scanning Microscope (LSM) vagy Zeiss LSM 880 mikroszkópokkal készítettük. A képek minőségét Huygens deconvolution szoftver (Scientific Volume Imaging B.V.) használatával javítottuk. ImageJ/Fiji program alkalmazásaival mértük meg az NMJ különböző paramétereit.

A bouton szám, az NMJ hossz és az izomterület meghatározása

A 4-es és 6/7-es izomhoz tartozó NMJ-ket vizsgátuk az A2-5 szegmentekben legalább 10 egyedi állattal minden egyes genotípus esetén. 2 vagy 3 NMJ-t használtunk állatonként a bouton szám, az NMJ hossz, illetve az izomterület meghatározásához, ezáltal legalább 25 egyedi NMJ-t vizsgáltunk a genotípusok paramétereinek meghatározásához. Egy boutonnak tekintettünk minden kerek vagy ovális struktúrát a motoraxon végződésen az anti-HRP/Dlg immunfestés alapján. Az NMJ hosszának az NMJ két legtávolábbi pontjának távolságát tekintettük anti-HRP immunfestés alapján. Az izom területét a Dlg festés alapján állapítottuk meg a Fiji sokszög kijelölő eszköz segítségével.

Az inter-bouton átmérőjének a meghatározása

Az inter-bouton régió az NMJ azon része, amely hídszerű struktúraként összeköt 2 szomszédos boutont. Az inter-bouton rész vad típusú NMJ-ben rendszerint keskenyebb a boutonoknál és a mikrotubulus köteg teljesen kitölti. Ezzel ellentétben a *dDAAM* mutáns NMJ-ben az inter-bouton régió kiszélesedik és az abban található mikrotubulus köteg fragmentálódik. Az inter-bouton régió meghatározásához a 4-es izomhoz tartozó NMJ középső részét használtuk a 2. és 3. abdomnális szegmentben. A mérésekhez 3 szomszédos inter-bouton régiót használtunk minden egyes mintában; az inter-bouton régiók maximális átmérőjével számoltunk az anti-HRP immunfestés alapján. Minden egyes genotípus esetén 15 mintát vizsgáltunk (45 interbouton régió).

A mikrotubulus organizációjának a meghatározása a terminális boutonokban

A legtöbb vad típusú boutonban a mikrotubulus jól detektálható, leginkább szabálytalan módon szétterül vagy alacsony előfordulási gyakorisággal alig észlelhető anti-Futsch immunfestést használva. A terminális boutonokról készített képeket (30. ábra A-C) ugyanazokkal a beállításokkal készítettük használva a detektorok teljes dinamikus tartományát, így elkerülve a jelintenzitás túltelítettségét. A 30. ábra Ab, Bb és Cb paneljein Fiji programmal a fényerő és a kontraszt lineáris változtatásával megjelenítettük azt az információt, ami eredetileg is megtalálható volt a kiindulási képeken (30. ábra A-C). Minden egyes genotípusnál legalább 25 terminális boutont vizsgáltunk és a vad típus esetén a boutonok kb. 86%-ban detektáltunk mikrotubulus organizációt, míg a *dDAAM* mutánsok esetén ez csak kb. 40% volt.

STED mikroszkópia

A minta előkészítést és a festést egy korábbi közlemény módszertanának megfelelően végeztük el [187]. A lárvafileket 5 percig fixáltuk hideg metanolban. A 2 órás blokkolást követően a következő elsődleges ellenanyagokat használtuk: egér anti-Brp C-term. (DSHB, nc82) (1:100), nyúl anti-Brp N term. [184] (1:1000), nyúl anti-dDAAM-R1 [228] (1:2000). A következő másodlagos ellenanyagokat használtuk: anti-egér-Atto647N (1:500), anti-nyúl-Alexa594 (1:500). A megfestett lárvafileket ProLong Gold antifade reagens használatával tettük tárgylemezre. A kétcsatornás STED képeket TCS SP8 gSTED (Leica Microsystems) mikroszkóppal készítettük. HC PL APO CS2 100x objektívet használtunk (oil immersion, NA: 1.4). A STED képeket LAS X software (Leica Microsystems) segítségével generáltuk, majd

Huygenes Professional program segítségével dekonvolváltuk. Az ImageJ program varázspálca eszközét használtuk a Brp gyűrű átmérőjének meghatározásához.

Statisztikai elemzés

Az adatokat Prism program segítségével elemeztük (Version 5, GraphPad Software). Két csoport összehasonlításához két mintás t-próbát vagy Mann-Whitney *U*-próbát használtunk. ANOVA programot többszörös összehasonlításhoz használtuk. $p < 0.05$ esetén statisztikailag szignifikáns különbségről beszélünk (* $p < 0.05$, *** $p < 0.001$). Az oszlopok átlagértékeket ábrázolnak a szórások feltüntetésével. Az adatok valószínűleg normál eloszlásúak, de formálisan nem voltak tesztelve.

Primer lista

Primer név	Szekvencia	Felhasználás
dDAAM-732-F	CACCGCTCTGCTGAGCAAAC TG	<i>UAS-FLDAAM</i> ⁷³²
dDAAM-732-R	CAGTTCTGCGCCCGACGTCC	<i>UAS-FLDAAM</i> ⁷³²
dDAAM-876-881-F	GACACCGCGTCCAGTGCCG	<i>UAS-FLDAAM</i> ⁸⁷⁶⁻⁸⁸¹
dDAAM-876-881-R	CGCCAGCGCGTTGAGTGAC	<i>UAS-FLDAAM</i> ⁸⁷⁶⁻⁸⁸¹
dDAAMFH2-shRNS-F	CTAGCAGTGAGCGACATGGA GATATCAAATAGTTATATTC AAGCATATTTGATATCTCCAT GTCGCTCGCG	<i>UAS-shRNS-dDAAMFH2</i>
dDAAMFH2-shRNS-R	AATTCGCGAGCGACATGGAG ATATCAAATATGCTTGAATA TAACTATTTGATATCTCCATG TCGCTCACTG	<i>UAS-shRNS-dDAAMFH2</i>
pCFD4-Futsch-1F	TATATAGGAAAGATATCCGG GTGAACTTCGCAGCTGGCCC AGTTCCTGAGTTTTAGAGCT AGAAATAGCAAG	<i>futsch</i> ^{CR13} , <i>dDAAM</i> ^{Ex68} , <i>futsch</i> ^{CR13}
pCFD4-Futsch-3R	ATTTTAACTTGCTATTTCTAG CTCTAAAACGCCCGCTCACC GGCTGCTACGACGTTAAATT GAAAATAGGTC	<i>futsch</i> ^{CR13} , <i>dDAAM</i> ^{Ex68} , <i>futsch</i> ^{CR13}

FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK

γ -TuRC - γ -tubulin ring complex, γ -tubulin gyűrű komplex
+TIP - microtubule plus-end tracking proteins, (+) végekötő fehérjék
ACh – acetyl-choline, acetil-kolin,
AP - akciós potenciál
APC - adenomatous polyposis coli
Arp - actin-related protein
CC - coiled-coil
CAM - cell adhesion proteins, sejthéziós fehérjék
C-DAAM – konstitutívan aktív, C-terminális DAAM
CLASP - CLIP-associated protein
Cobl - Cordon-bleu
DAAM - dishevelled associated activator of morphogenesis
DAD - diaphanous autoregulatory domain
DD - dimerization domain
dDAAM - *Drosophila* DAAM
Dia - Diaphanous
DID - diaphanous inhibitory domain
Dlg - Disc large
DRF - diaphanous related formin
Dsh - Dishevelled
EB - end binding, végekötő
EPSP - excitatory postsynaptic potential, excitatorikus posztzinaptikus potenciál
F-aktin - aktin filamentum
FH1 - formin homology 1
FH2 - formin homology 2
FHOD - formin homology domain proteins
FMN - formins
FMNL - formin-like proteins
G-aktin - aktin monomer
GBD - GTPase-binding domain
GFP - green fluorescent protein, zöld fluoreszcens fehérje
GluR – glutamát receptor

HIK – hasi idegköteg
INF - inverted formins
ISN – intersegmental nerve, interszegmentális ideg
KIR – központi idegrendszer
Lmod - Leiomodin
MAP - microtubule associated protein, mikrotubulus-asszociált fehérje
MCAK - mitotic centromere-associated kinesin, mitotikus centromer asszociált kinezin
NMJ - neuromuscular junction, ideg-izom kapcsolat
NPF - nucleation-promoting factor
PBS - phosphate buffered saline
PCP - planar cell polarity
PRD - prolin-rich domain
Sgg - Shaggy
SN – segmental nerve, szegmentális ideg
SSR – subsynaptic reticulum, szubszinaptikus retikulum
STED - super-resolution stimulated emission depleted
SV – synaptic vesicle, szinaptikus vezikula
SxIP - szerin, x aminosav, ileucin, prolin aminosavakból álló tetrapeptid motívum
TEVC – two-electrode voltage clamp
TN – transverse nerve, transzverzális ideg
WASP - wiscott-aldrich syndrome protein
WH2 - WASP homology 2 domain

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani **Dr. Mihály Józsefnek**, hogy 2008-ban csatlakozhattam a csoportjához. Köszönöm a lehetőséget, a sok rám fordított energiát, türelmet, és a rengeteg segítséget.

Köszönettel tartozom **Dr. Gombos Ritának**, aki diákkörös témavezetésem vállalta magára, és elindított a kutatói pálya rögzös útján. Köszönöm a rengeteg átadott szellemi és technikai tudást, a sok jó tanácsot, a szakmai és baráti beszélgetéseket, és hogy megmutatta azt a szemléletet, amivel igazán jó kutatóvá válhat az ember.

Szeretném megköszönni **Dr. Szikora Szilárdnak** és **Dr. Földi Istvánnak** a kísérletekben és az első szerzős cikk megírásában nyújtott segítséget. Külön köszönöm azokat a vitákat és beszélgetéseket, amelyeket folytattunk számos tudományos kérdésről, illetve az élet különböző területeiről.

Köszönöm továbbá **Berente Anikónak**, **Csendesné Aninak**, **Gyáni Editnek** és **Velkeyné Krausz Ildikónak** a rengeteg technikai segítséget, amivel könnyebbé tették számomra a labormunkát.

Köszönöm **Gerhát Gabinak**, **Farkas Dávidnak**, **Kaltenecker Péternek** és **Tóth Krisztinának** a szakmai segítségüket és a hasznos beszélgetéseiket.

Köszönettel tartozom továbbá a **laborunk egykori tagjainak**, hogy mindenben segítettek, amiben tudtak.

Köszönöm **Dr. Hegyi Péternek** és **Dr. Maléth Józsefnek**, hogy az I. számú Belgyógyászati Klinikán használhattam a konfokális mikroszkópjukat.

Köszönöm a pécsi partnereinknek, **Dr. Nyitrai Miklósnak**, **Dr. Bugyi Beátának**, **Dr. Tóth Mónika Ágnesnek**, **Dr. Huber Tamásnak**, **Dr. Barkó Szilviának** és **Leipoldné Vig Andreának**, hogy érdekes tudományos témákon dolgozhattunk együtt.

Köszönöm a berlini együttműködő partnereinknek, **Dr. Stephan Sigristnek** és **Torsten Götznek** az áldozatos munkájukat, amely rendkívül sokat javított az első szerzős cikkem szakmai minőségén. Továbbá köszönöm a segítséget a Sigrist labor többi tagjának is; **Mathias Böhmenak**, **Janine Lützkendorfnak**, **Malou Mampellnak** és **Christina Hollmannak**.

Szeretném megköszönni **Dr. Udvardy Andornak, Pintér Lajosnak, Dr. Sipos László Attilának, Dr. Darula Zsuzsannának, Dr. Siklós Lászlónak, Dr. Juhász Gábornak, Dr. Kovács Leventének és Dr. Medzihradszky Katalinnak** a sok szakmai segítséget és hasznos tanácsot, amit itt a Biológiai Kutatóközpontban adtak.

Szeretnék köszönetet mondani **egykori tanárainak**, akik erősítették bennem a természettudományos pálya iránti szeretetemet. Kiemelném gimnáziumi tanárait, **Modok Baláznét** kémia, **Varga-Sabjáné Szabó Sarolta** biológia tanáromat, valamint **Dr. Tamás Gábor** és **Dr. Sente Magdolna** egyetemi tanárait, akiknek köszönhetően ragadott meg véglegesen a tudományterület szépsége.

Köszönöm **Dr. Honti Viktornak** és **Dr. Jankovics Ferencnek**, amiért rövid határidővel elvállalták a dolgozatom bírálatát.

Köszönöm az **SZBK hatodik emeleti *Drosophila* közösségének**, hogy szakértelmükkel és segítségükkel hozzájárultak a dolgozat létrejöttéhez. Külön köszönöm **Dr. Gyurkovics Henriknek** a gyakran éjszakába nyúló, rendkívül tanulságos és érdekfeszítő diskurzusokat.

Köszönöm az **SZBK Genetikai Intézet vezetőinek, és minden tagjának**, akik valamilyen módon szakmai segítséget nyújtottak a munkám során.

Köszönöm továbbá a Szegeden élő külföldi kutatóknak, **Arno Dobisnak, Sergio Castelvetroanak, Imran Abou Babanak, Amin Al-awarnak, Jacoob Mirnek** és **Ahmed Al-Janabinak** a rengeteg hasznos szakmai segítséget, valamint az érdekes beszélgetéseket.

Végezetül szeretném megköszönni a **családomnak, a rokonaimnak, és a barátaimnak**, hogy mindig mellettem álltak, és mindenben számíthattam rájuk. Köszönöm!

FINANSZÍROZÁS

A munkámat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatai (GINOP-2.3.2-15-2016-00001 és GINOP-2.3.2-15-2016-00032) támogatták.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az agyban kialakuló milliárdnyi szinaptikus kapcsolat nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy bonyolult idegi hálózatok alakuljanak ki. A szinaptikus fejlődés és a funkció mechanizmusainak a vizsgálatával jobban megérthetünk olyan komplex idegi folyamatokat, mint pl. a tanulás, a memória és az érzékelés. Az utóbbi évtizedek neurobiológiai kutatásai fényt derítettek arra, hogy a szinaptikus fejlődés, funkció és struktúra fenntartás bonyolult folyamataiban a sejtvázas dinamikus átrendeződése is fontos szerepet játszik ebben. Annak ellenére, hogy számos olyan fehérjét ismerünk, amely képes szabályozni az aktin és a mikrotubulus szerveződést, még nagyrészt ismeretlen a sejtvázas szabályozás mechanizmusainak a többsége a szinaptikus fejlődés során. A tudásunk folyamatosan bővül új upstream sejtvázas szabályozó elemek megismerésével, viszont még keveset tudunk arról, hogy a sejtvázas effektor fehérjék miként kötődnek az aktin/mikrotubulus sejtváshoz és hogyan szabályozzák azokat. A sejtvázas effektor fehérjék vizsgálatával jobban megérthetjük a sejtvázas-átrendeződések dinamikus folyamatait.

Néhány évvel ezelőtt kezdtük el vizsgálni a *Drosophila* DAAM, formin típusú sejtvázas szabályozó fehérje szerepét neuronális folyamatokban. Számos *Drosophila* neuronális modellrendszert használva megállapítottuk, hogy a dDAAM az aktin összeszerelő aktivitása révén szerepet játszik az axon növekedés és navigáció folyamataiban. Később számos bizonyítékot adtunk arra vonatkozólag, hogy a dDAAM képes közvetlenül kötődni a mikrotubulusokhoz, valamint szerepe lehet az aktin/mikrotubulus kölcsönhatások elősegítésében. Tovább folytatva ezt a munkát, a dolgozatban a dDAAM szerepét vizsgáltam a szinaptikus fejlődés folyamataiban.

Először megállapítottuk, hogy a dDAAM a szinapszisképződés egyik korai szereplője, már az embrionális fejlődés során szükség van a fehérje kifejeződésére. A dDAAM fehérje hiányában az embrionális motoraxon növekedési és navigálási hibát egyaránt mutat az NMJ terminálisoknál. A vizsgálatainkat kiterjesztve a lárvális NMJ végződés vizsgálatára megállapítható, hogy a dDAAM pre- és posztzinaptikus kifejeződést egyaránt mutat. A dDAAM mutáns NMJ terminális lárvában abnormális fejlődést mutat bouton szám és NMJ morfológia tekintetében. A dDAAM hiányos motoraxon végzések drasztikus bouton szám

csökkenést mutatnak, illetve a boutonokat összekötő inter-boutonikus régió kiszélesedik bouton fúziós fenotípust eredményezve. Habár a dDAAM mindkét szinaptikus oldalon kifejeződik, további funkcióvesztés vizsgálatokból kiderült, hogy a látott NMJ fenotípusokat elsősorban a dDAAM preszinaptikus hiánya okozza

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a dDAAM preszinaptikus szerepét az NMJ fejlődés során, elhatároztuk, hogy megvizsgáljuk a sejtvázszerződést az NMJ terminálisokban. Mivel a Futsch, mint preszinaptikus mikrotubulus marker a legígéretesebb dDAAM kölcsönható partnernek tűnt, ezért a mikrotubulus rendszert vizsgáltuk először a *dDAAM* mutánsokban. A vad típusú preszinaptikus motoraxon végződésben megfigyelhető, hogy a központi mikrotubulus sejtváz egy egységes kötegbe rendeződik, amely fokozatosan a preszinaptikus végződés disztális része felé haladva elvékonyodik. Ezzel ellentétben a dDAAM hiányában fragmentált és dezorganizált szerződést mutat a központi mikrotubulus köteg, valamint a terminális boutonokból gyakran hiányoznak a mikrotubulusok. A forminokat eddig főként aktin polimerizációs faktorként ismertük, de az utóbbi időben egyre több eredmény áll rendelkezésünkre arra vonatkozólag, hogy képesek szabályozni a mikrotubulusokat is. Ezek alapján úgy gondoltuk, érdekes lenne megvizsgálni, hogy vajon a dDAAM aktin és/vagy mikrotubuluskötő funkciója fontos-e a bouton képződésben. A kérdés megválaszolásához menekítési kísérleteket végeztünk olyan teljes hosszúságú dDAAM pontmutáns fehérjékkel, amelyek nem képesek az aktinhoz vagy az aktinhoz és a mikrotubulusokhoz kötődni. A vad típusú és az aktin inkompetens teljes hosszúságú dDAAM fehérje képes volt menekíteni a *dDAAM* mutáns NMJ fenotípusát, ezzel szemben az aktin és mikrotubulus kötésre képtelen kettős mutáns nem volt képes helyreállítani a vad típusú NMJ morfológiát. Ez után felmerült bennünk a kérdés, hogy a *dDAAM* mutáns NMJ-ben vajon a preszinaptikus aktin organizáció érintett-e. A *dDAAM* mutáns preszinaptikus motoraxon végződésben az aktin szerződés a vad típushoz nagyon hasonló volt. Ezek az eredmények megerősítettek bennünket abban, hogy a dDAAM elsődleges funkciója a mikrotubulus sejtvázsabályozáshoz köthető az NMJ fejlődés során, míg az aktin összeszerelő aktivitása nem tűnik fontosnak a szinaptikus bouton képződés folyamataiban.

A funkcióvesztéses kísérletek alapján a dDAAM preszinaptikus jelenléte képes elősegíteni a bouton képződést. A továbbiakban kíváncsiak voltunk arra, hogy ha a fehérje

aktivitását megemeljük, akkor annak milyen hatása lesz az NMJ morfológiára vagy a bouton képződésre. Korábbi kísérleteink során sikerült a dDAAM N-terminális részének az eltávolításával egy konstitutívan aktív dDAAM formát létrehozunk, amit C-DAAM-nak hívunk. A C-DAAM preszinaptikus túltermelése jelentős mértékben megemelte a bouton számot, ami megerősíti azt az elképzelésünket, hogy a dDAAM-nak meghatározó szerepe van a boutonok kialakulásában.

Miután bebizonyítottuk, hogy a dDAAM a bouton képződés pozitív szabályozó faktora, érdekesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a szinapszisképződésben részt vevő másik formin típusú fehérje a Dia befolyásolja-e a dDAAM NMJ fejlődésben betöltött szerepét. A Dia pre- és posztzinaptikus kifejeződést egyaránt mutat és elősegíti a bouton képződést. A *dia* mutánsokban a bouton szám csökkenése, valamint a boutonikus régió növekedése figyelhető meg. A Dia fehérje hiánya a preszinaptikus oldalon az aktin és a mikrotubulus szerveződést egyaránt befolyásolja. A genetikai interakciós kísérleteink alapján a Dia és a dDAAM függetlenül működik a szinaptikus bouton képződésben. Ezt megerősíti, hogy a Dia-tól eltérően a *dDAAM* nem mutat genetikai kölcsönhatást a *trio*-val transzheterozigóta mutáns kombinációban. Összességében elmondható, hogy a dDAAM szinaptikus működésmódja a Dlar/Trio/Dia szignalizációs egységtől valószínűleg független.

Ezek után kíváncsiak voltunk arra, hogy a dDAAM működését milyen jelátviteli útvonalak szabályozzák. A genetikai interakciós vizsgálatok alapján a dDAAM együttműködhet a Wg és az Ank2 fehérjékkel az NMJ fejlődés során. Érdekes módon korábban már leírták, hogy a dDAAM tagja lehet a Wnt/Fz jelátviteli útnak különböző szövetekben. Illetve azt is tudjuk, hogy a divergens kanonikus Wnt/Wg jelátviteli út az Ank2-vel együtt szabályozza a preszinaptikus mikrotubulus organizációt. A fenti adatok megerősítik azt az elképzelésünket, hogy a dDAAM a Wg és az Ank2 fehérjékkel együttműködik a megfelelő NMJ morfológia létrehozásában. Korábbi kísérletekben bemutatták, hogy az Ank2 valószínűleg a Wg szignalizáció egyik effektor fehérjéje az NMJ terminális kialakulásában. Így érdekesnek találtuk megvizsgálni a dDAAM helyzetét ebben a hierarchia rendszerben episztázis kísérletek használatával. A korábbi eredményekkel összhangban az *Ank2* null mutáns állatokban csökkent bouton szám és nagymértékű mikrotubulus felhalmozódás volt megfigyelhető az NMJ végződéseken. Ezzel szemben a kettős homozigóta *dDAAM; Ank2* mutánsokban a dDAAM

hiánya képes volt megszüntetni az *Ank2* mutánsra jellemző mikrotubulus felhalmozódást, valamint az inter-boutonikus régió kiszélesedését. A kísérletek alapján a *dDAAM* episztatikus az *Ank2*-höz képest, valamint a *dDAAM* mikrotubulus stabilizáló szerepe ebben a hierarchia rendszerben valószínűleg downstream szabályozó elemként viselkedik. A *dDAAM; Ank2* kettős mutáns fenotípusa viszont nem teljesen azonos a *dDAAM* mutáns NMJ fenotípusával, ami arra utal, hogy nem egy egyszerű alá-fölé rendeltségi viszony van a két fehérje között. Az *Ank2* mellett a mikrotubuluskötő Futsch fehérjéről is ismert, hogy a szinaptikus Wg szignalizáció egyik effektor molekulája. Hasonlóan az *Ank2*-höz a Futsch esetében is *dDAAM/futsch* kettős mutáns NMJ végződéseket vizsgáltunk, hogy jobban megértsük a *dDAAM* szerepét vagy helyzetét a divergens kanonikus Wg szignalizációban. A kettős mutáns NMJ végzésekben csökkent bouton szám, bouton fúzió valamint szakadozott mikrotubulus kötegek jelentek meg, ami nagyon hasonlított a *dDAAM* fenotípusra. A fenti eredmények alapján a *dDAAM* episztatikus a *futsch*-hoz képest.

Tovább folytatva a lokalizációs vizsgálatokat megállapítottuk, hogy a *dDAAM* fehérje a kortikális felhalmozódás mellett a preszinaptikus oldalon egy pöttyszerű kifejeződési mintát is mutat. Tovább vizsgálva ezt az érdekes pöttyszerű kifejeződési mintázatot, nagy felbontású STED mikroszkópiával megállapítottuk, hogy a *dDAAM* felhalmozódás egy gyűrűszerű struktúrát rajzol ki, ami nagyrészt átfed a Brp C-terminális fehérjerész mintázatával, ami az aktív zóna fehérjekomplex disztális vége. A lokalizációs vizsgálatok mellett funkcionális bizonyítékokat is találtunk arra vonatkozólag, hogy a *dDAAM* befolyásolhatja az aktív zóna kialakulását, illetve annak működését. Megvizsgálva az aktív zónák ultrastrukturális szerkezetét a *dDAAM* mutáns állatokban az aktív zóna átmérője kis mértékben megnőtt. Végezetül elektrofiziológiai mérésekkel megvizsgáltuk azt, hogy a *dDAAM* hiánya befolyásolja-e a szinaptikus transzmisszió hatékonyságát. Habár a spontán szinaptikus áramok karakterisztikájában nem láttunk változást, a kiváltott akciós potenciál mértéke kisebb volt *dDAAM* hiányában.

Ebben a munkában bemutattuk azt, hogy a formin típusú sejtvázsabályozó *dDAAM* fehérje képes elősegíteni az új bouton képződést és úgy tűnik, hogy moduláris funkcióval bír az aktív zóna képződésben és funkciójában.

SUMMARY

The building of complex neuronal circuits requires the formation of billions of synaptic connections in the brain. Elucidating synapse development and function is essential to understand cognitive processes such as learning, memory and perception. Over the last decades, a significant body of literature on the neuroscience has revealed that the dynamic cytoskeletal rearrangement is crucial for the stabilization and the remodeling of the synaptic connections. Despite the identification of numerous proteins that regulate actin and microtubule organization, the mechanisms of cytoskeletal control during synapse development have remained largely elusive. Our knowledge of the upstream cytoskeletal regulators is permanently growing, so we are starting to better understand how they function during synaptogenesis. However, much less is known about how the cytoskeletal effectors regulate the major elements of the cytoskeleton. A few years ago, we began to investigate the role of a formin type of cytoskeleton regulatory protein, *Drosophila* DAAM, during neuronal development. By using different *Drosophila* neuronal model systems we have shown that the actin assembly activity of dDAAM is required for axonal growth and guidance. Later, we have provided several pieces of evidence that dDAAM is able to bind directly to the microtubules and plays a role in the coordination of actin/microtubule crosstalk. As an extension of these studies, here we investigated the role of dDAAM during NMJ development in *Drosophila*.

To address whether dDAAM might be involved in synaptogenesis, firstly we examined the role of dDAAM during embryonic NMJ development. We revealed that dDAAM is highly enriched at the motoraxon terminals and the lack of dDAAM causes defects in motorneuron growth and guidance in the embryos. These data suggest that the dDAAM protein might indeed be required for the early steps of synaptic development. We next analyzed the larval NMJs and showed that dDAAM is present on both the pre- and postsynaptic sides. Moreover, in the *dDAAM* mutant NMJs we observed a decreased synaptic bouton number and abnormal NMJ morphology with stretched inter-bouton regions, often designated as a bouton fusion phenotype. Although dDAAM is expressed in both synaptic compartments, further mutational analyses argue for a primarily presynaptic role.

To gain deeper insights into presynaptic role of dDAAM in NMJ development, a set of experiments was carried out to analyze the underlying cytoskeleton in the motoraxon terminals. After large scale affinity purification and MS analysis, the Futsch protein which is a widely used microtubule marker in the NMJ, appeared to be the most promising interaction partner of dDAAM. Previous findings have established that Futsch is able to promote microtubule stabilization and new bouton formation; therefore we tested whether lack of dDAAM affects presynaptic microtubule organization. In wild type NMJs the presynaptic microtubules are organized into a prominent bundle of core filaments that becomes gradually thinner in the distal region of the presynaptic motoneurone terminal. By contrast, the *dDAAM* null mutation results in fragmentation of the core microtubule bundle and the microtubules are often absent from the terminal boutons. Although formins are best known for their ability to promote actin filament assembly, a mounting body of evidence supports that they are also involved in microtubule regulation; in particular, they have been implicated in microtubule stabilization in many cellular model systems. Hence, we tested which dDAAM activities are important for NMJ development. We carried out a series of rescue experiments with point mutant versions of the full-length dDAAM protein, in which we impaired actin interaction alone or actin and microtubule interactions together. The wild type and actin incompetent form of dDAAM rescued the *dDAAM* mutant NMJ phenotype while the actin and microtubule double mutant failed to restore the wild type NMJ morphology. In accordance with this, *dDAAM* mutant NMJ terminals do not appear to exhibit major alterations in presynaptic actin organization. These data suggest that the primary function of DAAM during NMJ development is presumably linked to its microtubule organizing role, whereas its actin filament assembly activity is likely to be dispensable for synaptic bouton formation.

To corroborate the presynaptic requirement of dDAAM for promoting bouton formation, we tested whether an increased activity of dDAAM affect synaptic bouton formation. We previously showed that removing the N-terminal part of dDAAM results in a constitutively active form, called C-DAAM. The presynaptically overexpressed C-DAAM caused an increase in bouton number at the NMJ terminals reinforcing further that this protein plays an instructive role in bouton formation.

After having demonstrated that dDAAM is a positive regulatory factor of bouton formation, we next wanted to examine whether there is a functional redundancy between dDAAM and Dia, another formin linked to synapse development. Dia is expressed both presynaptically and postsynaptically and has a presynaptic function in bouton formation. The lack of Dia leads to a decrease in bouton number with an increase in bouton area. Aberrations were reported in both the actin and microtubule organization on the presynaptic side. Based on our genetic interaction studies, Dia and dDAAM are likely to function independently during NMJ development. In agreement with this, unlike *dia*, *dDAAM* does not exhibit an interaction with *trio* in a transheterozygous mutant combination, and it appears likely that dDAAM is controlled independently of the Dlar/Trio/Dia module.

We next aimed to decipher which signaling pathways control the activity of dDAAM. Our genetic interaction experiments suggested that dDAAM works together with Wg and Ank2 during NMJ development. Interestingly, dDAAM has previously been linked to Wnt/Frizzled signaling in other cellular contexts. Furthermore, prior studies have revealed that presynaptic Wg signaling regulates the synaptic microtubule cytoskeleton in conjunction with Ank2. Thus, these data support the notion that dDAAM acts in concert with Wg and Ank2 during synapse development. It has previously been shown that Ank2 is likely to be a downstream factor of Wg signaling in NMJ development. Consequently, we attempted to determine the place of dDAAM in this hierarchy by epistasis analysis. In accordance with previous studies, *Ank2* null mutant NMJs displayed reduced bouton numbers with bouton fusions and strong microtubule accumulations in the presynaptic terminal. By contrast, in the double homozygous *dDAAM*; *Ank2* animals the absence of dDAAM was able to suppress the microtubule aggregation phenotype of *Ank2* and only a weak central microtubule bundle formed, and boutons no longer exhibited a fused appearance. These data regarding microtubule organization suggest that dDAAM is epistatic to Ank2, which implies a downstream regulatory position as a microtubule stabilization factor. The NMJ morphology and microtubule organization of *dDAAM*; *Ank2* double mutants are not identical to any of the single mutants suggesting a more complex interaction between dDAAM and Ank2 than a simple linear pathway. In addition to Ank2, the microtubule associated Futsch protein has also been shown to be a downstream effector protein of Wg signaling in synaptic growth. Similarly to Ank2, we examined *futsch/dDAAM* double

mutant NMJ terminals to determine the place of dDAAM in this divergent canonical Wg signaling pathway. The double mutant NMJs strongly resembled those of *dDAAM* single mutants, with significantly reduced bouton numbers, the presence of bouton fusions, and fragmented microtubule organization. Hence, *dDAAM* is clearly epistatic to *futsch*, and these results argue for dDAAM acting either downstream of Futsch or in a parallel pathway.

Using two different anti-dDAAM antibodies we revealed that besides its cortical accumulation, dDAAM is strongly expressed at the presynaptic terminal, forming a spot-like pattern. The application of STED microscopy allowed us to determine that dDAAM is enriched in a ring-like pattern in the immediate vicinity of the C-terminus of Brp, the distal part of active zone complex. Furthermore, we have shown that the presence of Brp is required for dDAAM localization at the active zone, but not vice versa. Moreover, we have proposed several lines of evidence that lack of dDAAM affects active zone formation and function. Although the lack of dDAAM has no major effect on active zone organization, active zones were slightly bigger in dDAAM mutant synapses. Finally, electrophysiological experiments were carried out to investigate whether *dDAAM* could influence the efficiency of synaptic transmission due to its prominent localization close to the sites of neurotransmitter release. Although spontaneous release was not altered, we observed a significant reduction in evoked excitatory NMJ currents. Collectively, these data suggest that dDAAM is strongly associated with the active zone scaffold, and its absence impairs synaptic vesicle release.

Our work described that dDAAM, a formin type of cytoskeleton regulatory protein, is able to promote the new synaptic bouton formation and appears to have a modulatory role during the formation and functioning of the active zones.

IRODALOMJEGYZÉK

1. Pollard, T.D., L. Blanchoin, and R.D. Mullins, Molecular mechanisms controlling actin filament dynamics in nonmuscle cells. *Annu Rev Biophys Biomol Struct*, 2000. 29: p. 545-76.
2. Siripala, A.D. and M.D. Welch, SnapShot: actin regulators I. *Cell*, 2007. 128(3): p. 626.
3. Siripala, A.D. and M.D. Welch, SnapShot: actin regulators II. *Cell*, 2007. 128(5): p. 1014.
4. Pollard, T.D. and G.G. Borisy, Cellular motility driven by assembly and disassembly of actin filaments. *Cell*, 2003. 112(4): p. 453-65.
5. Dominguez, R., Structural insights into de novo actin polymerization. *Curr Opin Struct Biol*, 2010. 20(2): p. 217-25.
6. Renault, L., B. Bugyi, and M.F. Carlier, Spire and Cordon-bleu: multifunctional regulators of actin dynamics. *Trends Cell Biol*, 2008. 18(10): p. 494-504.
7. Pollard, T.D. and J.A. Cooper, Actin, a central player in cell shape and movement. *Science*, 2009. 326(5957): p. 1208-12.
8. Dominguez, R., The WH2 Domain and Actin Nucleation: Necessary but Insufficient. *Trends Biochem Sci*, 2016. 41(6): p. 478-490.
9. Chesarone, M.A. and B.L. Goode, Actin nucleation and elongation factors: mechanisms and interplay. *Curr Opin Cell Biol*, 2009. 21(1): p. 28-37.
10. Mullins, R.D., W.F. Stafford, and T.D. Pollard, Structure, subunit topology, and actin-binding activity of the Arp2/3 complex from *Acanthamoeba*. *J Cell Biol*, 1997. 136(2): p. 331-43.
11. Welch, M.D., A. Iwamatsu, and T.J. Mitchison, Actin polymerization is induced by Arp2/3 protein complex at the surface of *Listeria monocytogenes*. *Nature*, 1997. 385(6613): p. 265-9.
12. Rotty, J.D., C. Wu, and J.E. Bear, New insights into the regulation and cellular functions of the ARP2/3 complex. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2013. 14(1): p. 7-12.
13. Mullins, R.D., J.A. Heuser, and T.D. Pollard, The interaction of Arp2/3 complex with actin: nucleation, high affinity pointed end capping, and formation of branching networks of filaments. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1998. 95(11): p. 6181-6.

14. Padrick, S.B., et al., Arp2/3 complex is bound and activated by two WASP proteins. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2011. 108(33): p. E472-9.
15. Ti, S.C., et al., Structural and biochemical characterization of two binding sites for nucleation-promoting factor WASp-VCA on Arp2/3 complex. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2011. 108(33): p. E463-71.
16. Boczkowska, M., et al., Structural analysis of the transitional state of Arp2/3 complex activation by two actin-bound WCAs. *Nat Commun*, 2014. 5: p. 3308.
17. Helgeson, L.A., et al., Interactions with actin monomers, actin filaments, and Arp2/3 complex define the roles of WASP family proteins and cortactin in coordinately regulating branched actin networks. *J Biol Chem*, 2014. 289(42): p. 28856-69.
18. Campellone, K.G. and M.D. Welch, A nucleator arms race: cellular control of actin assembly. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2010. 11(4): p. 237-51.
19. Pollard, T.D., Regulation of actin filament assembly by Arp2/3 complex and formins. *Annu Rev Biophys Biomol Struct*, 2007. 36: p. 451-77.
20. Quinlan, M.E., et al., Drosophila Spire is an actin nucleation factor. *Nature*, 2005. 433(7024): p. 382-8.
21. Rebowski, G., et al., X-ray scattering study of actin polymerization nuclei assembled by tandem W domains. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2008. 105(31): p. 10785-90.
22. Rosales-Nieves, A.E., et al., Coordination of microtubule and microfilament dynamics by Drosophila Rho1, Spire and Cappuccino. *Nat Cell Biol*, 2006. 8(4): p. 367-76.
23. Quinlan, M.E., et al., Regulatory interactions between two actin nucleators, Spire and Cappuccino. *J Cell Biol*, 2007. 179(1): p. 117-28.
24. Vizcarra, C.L., et al., Structure and function of the interacting domains of Spire and Fmn-family formins. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2011. 108(29): p. 11884-9.
25. Zeth, K., et al., Molecular basis of actin nucleation factor cooperativity: crystal structure of the Spir-1 kinase non-catalytic C-lobe domain (KIND)*formin-2 formin SPIR interaction motif (FSI) complex. *J Biol Chem*, 2011. 286(35): p. 30732-9.
26. Dietrich, S., et al., Structural and functional insights into the Spir/formin actin nucleator complex. *Biol Chem*, 2013. 394(12): p. 1649-60.
27. Carroll, E.A., et al., Cordon-bleu is a conserved gene involved in neural tube formation. *Dev Biol*, 2003. 262(1): p. 16-31.

28. Tam, V.C., et al., A type III secretion system in *Vibrio cholerae* translocates a formin/spire hybrid-like actin nucleator to promote intestinal colonization. *Cell Host Microbe*, 2007. 1(2): p. 95-107.
29. Schwintzer, L., et al., The functions of the actin nucleator Cobl in cellular morphogenesis critically depend on syndapin I. *EMBO J*, 2011. 30(15): p. 3147-59.
30. Ravanelli, A.M. and J. Klingensmith, The actin nucleator Cordon-bleu is required for development of motile cilia in zebrafish. *Dev Biol*, 2011. 350(1): p. 101-11.
31. Schuler, S., et al., Ciliated sensory hair cell formation and function require the F-BAR protein syndapin I and the WH2 domain-based actin nucleator Cobl. *J Cell Sci*, 2013. 126(Pt 1): p. 196-208.
32. Grega-Larson, N.E., et al., Cordon bleu promotes the assembly of brush border microvilli. *Mol Biol Cell*, 2015. 26(21): p. 3803-15.
33. Wayt, J. and A. Bretscher, Cordon Bleu serves as a platform at the basal region of microvilli, where it regulates microvillar length through its WH2 domains. *Mol Biol Cell*, 2014. 25(18): p. 2817-27.
34. Ahuja, R., et al., Cordon-bleu is an actin nucleation factor and controls neuronal morphology. *Cell*, 2007. 131(2): p. 337-50.
35. Husson, C., et al., Cordon-Bleu uses WH2 domains as multifunctional dynamizers of actin filament assembly. *Mol Cell*, 2011. 43(3): p. 464-77.
36. Haag, N., et al., The actin nucleator Cobl is crucial for Purkinje cell development and works in close conjunction with the F-actin binding protein Abp1. *J Neurosci*, 2012. 32(49): p. 17842-56.
37. Chereau, D., et al., Leiomodin is an actin filament nucleator in muscle cells. *Science*, 2008. 320(5873): p. 239-43.
38. Skwarek-Maruszewska, A., et al., Different localizations and cellular behaviors of leiomodin and tropomodulin in mature cardiomyocyte sarcomeres. *Mol Biol Cell*, 2010. 21(19): p. 3352-61.
39. Boczkowska, M., et al., How Leiomodin and Tropomodulin use a common fold for different actin assembly functions. *Nat Commun*, 2015. 6: p. 8314.
40. Woychik, R.P., et al., 'Formins': proteins deduced from the alternative transcripts of the limb deformity gene. *Nature*, 1990. 346(6287): p. 850-3.

41. Zuniga, A., et al., Mouse limb deformity mutations disrupt a global control region within the large regulatory landscape required for Gremlin expression. *Genes Dev*, 2004. 18(13): p. 1553-64.
42. Breitsprecher, D. and B.L. Goode, Formins at a glance. *J Cell Sci*, 2013. 126(Pt 1): p. 1-7.
43. Schonichen, A. and M. Geyer, Fifteen formins for an actin filament: a molecular view on the regulation of human formins. *Biochim Biophys Acta*, 2010. 1803(2): p. 152-63.
44. Chesarone, M.A., A.G. DuPage, and B.L. Goode, Unleashing formins to remodel the actin and microtubule cytoskeletons. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2010. 11(1): p. 62-74.
45. Higgs, H.N. and K.J. Peterson, Phylogenetic analysis of the formin homology 2 domain. *Mol Biol Cell*, 2005. 16(1): p. 1-13.
46. Rivero, F., et al., A comparative sequence analysis reveals a common GBD/FH3-FH1-FH2-DAD architecture in formins from Dictyostelium, fungi and metazoa. *BMC Genomics*, 2005. 6: p. 28.
47. Watanabe, N., et al., p140mDia, a mammalian homolog of Drosophila diaphanous, is a target protein for Rho small GTPase and is a ligand for profilin. *EMBO J*, 1997. 16(11): p. 3044-56.
48. Chang, F., Movement of a cytokinesis factor cdc12p to the site of cell division. *Curr Biol*, 1999. 9(15): p. 849-52.
49. Evangelista, M., et al., Bni1p, a yeast formin linking cdc42p and the actin cytoskeleton during polarized morphogenesis. *Science*, 1997. 276(5309): p. 118-22.
50. Imamura, H., et al., Bni1p and Bnr1p: downstream targets of the Rho family small G-proteins which interact with profilin and regulate actin cytoskeleton in *Saccharomyces cerevisiae*. *EMBO J*, 1997. 16(10): p. 2745-55.
51. Chan, D.C., M.T. Bedford, and P. Leder, Formin binding proteins bear WWP/WW domains that bind proline-rich peptides and functionally resemble SH3 domains. *EMBO J*, 1996. 15(5): p. 1045-54.
52. Kamei, T., et al., Interaction of Bnr1p with a novel Src homology 3 domain-containing Hof1p. Implication in cytokinesis in *Saccharomyces cerevisiae*. *J Biol Chem*, 1998. 273(43): p. 28341-5.
53. Tominaga, T., et al., Diaphanous-related formins bridge Rho GTPase and Src tyrosine kinase signaling. *Mol Cell*, 2000. 5(1): p. 13-25.

54. Uetz, P., et al., Molecular interaction between limb deformity proteins (formins) and Src family kinases. *J Biol Chem*, 1996. 271(52): p. 33525-30.
55. Pruyne, D., et al., Role of formins in actin assembly: nucleation and barbed-end association. *Science*, 2002. 297(5581): p. 612-5.
56. Sagot, I., et al., An actin nucleation mechanism mediated by Bni1 and profilin. *Nat Cell Biol*, 2002. 4(8): p. 626-31.
57. Pring, M., et al., Mechanism of formin-induced nucleation of actin filaments. *Biochemistry*, 2003. 42(2): p. 486-96.
58. Otomo, T., et al., Structural basis of actin filament nucleation and processive capping by a formin homology 2 domain. *Nature*, 2005. 433(7025): p. 488-94.
59. Shimada, A., et al., The core FH2 domain of diaphanous-related formins is an elongated actin binding protein that inhibits polymerization. *Mol Cell*, 2004. 13(4): p. 511-22.
60. Xu, Y., et al., Crystal structures of a Formin Homology-2 domain reveal a tethered dimer architecture. *Cell*, 2004. 116(5): p. 711-23.
61. Moseley, J.B., et al., A conserved mechanism for Bni1- and mDia1-induced actin assembly and dual regulation of Bni1 by Bud6 and profilin. *Mol Biol Cell*, 2004. 15(2): p. 896-907.
62. Alberts, A.S., Identification of a carboxyl-terminal diaphanous-related formin homology protein autoregulatory domain. *J Biol Chem*, 2001. 276(4): p. 2824-30.
63. Li, F. and H.N. Higgs, The mouse Formin mDia1 is a potent actin nucleation factor regulated by autoinhibition. *Curr Biol*, 2003. 13(15): p. 1335-40.
64. Otomo, T., et al., Structural basis of Rho GTPase-mediated activation of the formin mDia1. *Mol Cell*, 2005. 18(3): p. 273-81.
65. Rose, R., et al., Structural and mechanistic insights into the interaction between Rho and mammalian Dia. *Nature*, 2005. 435(7041): p. 513-8.
66. Otomo, T., et al., Crystal structure of the Formin mDia1 in autoinhibited conformation. *PLoS One*, 2010. 5(9).
67. Nezami, A., et al., Crystal structure of a complex between amino and carboxy terminal fragments of mDia1: insights into autoinhibition of diaphanous-related formins. *PLoS One*, 2010. 5(9).
68. Maiti, S., et al., Structure and activity of full-length formin mDia1. *Cytoskeleton (Hoboken)*, 2012. 69(6): p. 393-405.

69. Goode, B.L. and M.J. Eck, Mechanism and function of formins in the control of actin assembly. *Annu Rev Biochem*, 2007. 76: p. 593-627.
70. Gould, C.J., et al., The formin DAD domain plays dual roles in autoinhibition and actin nucleation. *Curr Biol*, 2011. 21(5): p. 384-90.
71. Vizcarra, C.L., B. Bor, and M.E. Quinlan, The role of formin tails in actin nucleation, processive elongation, and filament bundling. *J Biol Chem*, 2014. 289(44): p. 30602-13.
72. Vig, A.T., et al., The activities of the C-terminal regions of the formin protein disheveled-associated activator of morphogenesis (DAAM) in actin dynamics. *J Biol Chem*, 2017. 292(33): p. 13566-13583.
73. Downing, K.H. and E. Nogales, Tubulin and microtubule structure. *Curr Opin Cell Biol*, 1998. 10(1): p. 16-22.
74. Downing, K.H. and E. Nogales, New insights into microtubule structure and function from the atomic model of tubulin. *Eur Biophys J*, 1998. 27(5): p. 431-6.
75. Nogales, E., S.G. Wolf, and K.H. Downing, Structure of the alpha beta tubulin dimer by electron crystallography. *Nature*, 1998. 391(6663): p. 199-203.
76. Nogales, E., et al., High-resolution model of the microtubule. *Cell*, 1999. 96(1): p. 79-88.
77. Mitchison, T. and M. Kirschner, Dynamic instability of microtubule growth. *Nature*, 1984. 312(5991): p. 237-42.
78. Desai, A. and T.J. Mitchison, Microtubule polymerization dynamics. *Annu Rev Cell Dev Biol*, 1997. 13: p. 83-117.
79. Nogales, E. and H.W. Wang, Structural mechanisms underlying nucleotide-dependent self-assembly of tubulin and its relatives. *Curr Opin Struct Biol*, 2006. 16(2): p. 221-9.
80. Oakley, B.R., et al., Gamma-tubulin is a component of the spindle pole body that is essential for microtubule function in *Aspergillus nidulans*. *Cell*, 1990. 61(7): p. 1289-301.
81. Zheng, Y., M.K. Jung, and B.R. Oakley, Gamma-tubulin is present in *Drosophila melanogaster* and *Homo sapiens* and is associated with the centrosome. *Cell*, 1991. 65(5): p. 817-23.
82. Stearns, T., L. Evans, and M. Kirschner, Gamma-tubulin is a highly conserved component of the centrosome. *Cell*, 1991. 65(5): p. 825-36.

83. Nogales, E., Structural insights into microtubule function. *Annu Rev Biochem*, 2000. 69: p. 277-302.
84. Luduena, R.F., Multiple forms of tubulin: different gene products and covalent modifications. *Int Rev Cytol*, 1998. 178: p. 207-75.
85. Baas, P.W., et al., Stability properties of neuronal microtubules. *Cytoskeleton (Hoboken)*, 2016. 73(9): p. 442-60.
86. Wloga, D. and J. Gaertig, Post-translational modifications of microtubules. *J Cell Sci*, 2010. 123(Pt 20): p. 3447-55.
87. Song, Y. and S.T. Brady, Post-translational modifications of tubulin: pathways to functional diversity of microtubules. *Trends Cell Biol*, 2015. 25(3): p. 125-36.
88. Kollman, J.M., et al., Microtubule nucleation by gamma-tubulin complexes. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2011. 12(11): p. 709-21.
89. Bettencourt-Dias, M. and D.M. Glover, Centrosome biogenesis and function: centrosomics brings new understanding. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2007. 8(6): p. 451-63.
90. Basto, R., et al., Flies without centrioles. *Cell*, 2006. 125(7): p. 1375-86.
91. Nguyen, M.M., M.C. Stone, and M.M. Rolls, Microtubules are organized independently of the centrosome in *Drosophila* neurons. *Neural Dev*, 2011. 6: p. 38.
92. Kuijpers, M. and C.C. Hoogenraad, Centrosomes, microtubules and neuronal development. *Mol Cell Neurosci*, 2011. 48(4): p. 349-58.
93. Burbank, K.S. and T.J. Mitchison, Microtubule dynamic instability. *Curr Biol*, 2006. 16(14): p. R516-7.
94. Gundersen, G.G., E.R. Gomes, and Y. Wen, Cortical control of microtubule stability and polarization. *Curr Opin Cell Biol*, 2004. 16(1): p. 106-12.
95. Conde, C. and A. Caceres, Microtubule assembly, organization and dynamics in axons and dendrites. *Nat Rev Neurosci*, 2009. 10(5): p. 319-32.
96. Akhmanova, A. and M.O. Steinmetz, Microtubule +TIPs at a glance. *J Cell Sci*, 2010. 123(Pt 20): p. 3415-9.
97. Akhmanova, A. and M.O. Steinmetz, Tracking the ends: a dynamic protein network controls the fate of microtubule tips. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2008. 9(4): p. 309-22.
98. Korenbaum, E. and F. Rivero, Calponin homology domains at a glance. *J Cell Sci*, 2002. 115(Pt 18): p. 3543-5.

99. Zimniak, T., et al., Phosphoregulation of the budding yeast EB1 homologue Bim1p by Aurora/Ipl1p. *J Cell Biol*, 2009. 186(3): p. 379-91.
100. Komarova, Y., et al., EB1 and EB3 control CLIP dissociation from the ends of growing microtubules. *Mol Biol Cell*, 2005. 16(11): p. 5334-45.
101. Miller, R.K., et al., The CLIP-170 orthologue Bik1p and positioning the mitotic spindle in yeast. *Curr Top Dev Biol*, 2006. 76: p. 49-87.
102. Honnappa, S., et al., Key interaction modes of dynamic +TIP networks. *Mol Cell*, 2006. 23(5): p. 663-71.
103. Weisbrich, A., et al., Structure-function relationship of CAP-Gly domains. *Nat Struct Mol Biol*, 2007. 14(10): p. 959-67.
104. Gupta, K.K., et al., Minimal plus-end tracking unit of the cytoplasmic linker protein CLIP-170. *J Biol Chem*, 2009. 284(11): p. 6735-42.
105. Honnappa, S., et al., An EB1-binding motif acts as a microtubule tip localization signal. *Cell*, 2009. 138(2): p. 366-76.
106. Fong, K.W., et al., Interaction of CDK5RAP2 with EB1 to track growing microtubule tips and to regulate microtubule dynamics. *Mol Biol Cell*, 2009. 20(16): p. 3660-70.
107. Al-Bassam, J., et al., Stu2p binds tubulin and undergoes an open-to-closed conformational change. *J Cell Biol*, 2006. 172(7): p. 1009-22.
108. Mimori-Kiyosue, Y., et al., CLASP1 and CLASP2 bind to EB1 and regulate microtubule plus-end dynamics at the cell cortex. *J Cell Biol*, 2005. 168(1): p. 141-53.
109. Wu, X., X. Xiang, and J.A. Hammer, 3rd, Motor proteins at the microtubule plus-end. *Trends Cell Biol*, 2006. 16(3): p. 135-43.
110. Bieling, P., et al., Reconstitution of a microtubule plus-end tracking system in vitro. *Nature*, 2007. 450(7172): p. 1100-5.
111. Bieling, P., et al., CLIP-170 tracks growing microtubule ends by dynamically recognizing composite EB1/tubulin-binding sites. *J Cell Biol*, 2008. 183(7): p. 1223-33.
112. Brouhard, G.J., et al., XMAP215 is a processive microtubule polymerase. *Cell*, 2008. 132(1): p. 79-88.
113. Kline-Smith, S.L. and C.E. Walczak, The microtubule-destabilizing kinesin XKCM1 regulates microtubule dynamic instability in cells. *Mol Biol Cell*, 2002. 13(8): p. 2718-31.

114. Komarova, Y.A., et al., Cytoplasmic linker proteins promote microtubule rescue in vivo. *J Cell Biol*, 2002. 159(4): p. 589-99.
115. Lansbergen, G., et al., CLASPs attach microtubule plus ends to the cell cortex through a complex with LL5beta. *Dev Cell*, 2006. 11(1): p. 21-32.
116. Maiato, H., P. Sampaio, and C.E. Sunkel, Microtubule-associated proteins and their essential roles during mitosis. *Int Rev Cytol*, 2004. 241: p. 53-153.
117. Pacheco, A. and G. Gallo, Actin filament-microtubule interactions in axon initiation and branching. *Brain Res Bull*, 2016. 126(Pt 3): p. 300-310.
118. Dehmelt, L. and S. Halpain, The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins. *Genome Biol*, 2005. 6(1): p. 204.
119. Halpain, S. and L. Dehmelt, The MAP1 family of microtubule-associated proteins. *Genome Biol*, 2006. 7(6): p. 224.
120. Qiang, L., et al., Tau protects microtubules in the axon from severing by katanin. *J Neurosci*, 2006. 26(12): p. 3120-9.
121. Gong, C.X. and K. Iqbal, Hyperphosphorylation of microtubule-associated protein tau: a promising therapeutic target for Alzheimer disease. *Curr Med Chem*, 2008. 15(23): p. 2321-8.
122. Roos, J., et al., Drosophila Futsch regulates synaptic microtubule organization and is necessary for synaptic growth. *Neuron*, 2000. 26(2): p. 371-82.
123. Hummel, T., et al., Drosophila Futsch/22C10 is a MAP1B-like protein required for dendritic and axonal development. *Neuron*, 2000. 26(2): p. 357-70.
124. Bartolini, F. and G.G. Gundersen, Formins and microtubules. *Biochim Biophys Acta*, 2010. 1803(2): p. 164-73.
125. Palazzo, A.F., et al., mDia mediates Rho-regulated formation and orientation of stable microtubules. *Nat Cell Biol*, 2001. 3(8): p. 723-9.
126. Zhou, F., P. Leder, and S.S. Martin, Formin-1 protein associates with microtubules through a peptide domain encoded by exon-2. *Exp Cell Res*, 2006. 312(7): p. 1119-26.
127. Bartolini, F., et al., The formin mDia2 stabilizes microtubules independently of its actin nucleation activity. *J Cell Biol*, 2008. 181(3): p. 523-36.
128. Young, K.G., et al., INF1 is a novel microtubule-associated formin. *Mol Biol Cell*, 2008. 19(12): p. 5168-80.

129. Szikora, S., et al., The formin DAAM is required for coordination of the actin and microtubule cytoskeleton in axonal growth cones. *J Cell Sci*, 2017. 130(15): p. 2506-2519.
130. Daou, P., et al., Essential and nonredundant roles for Diaphanous formins in cortical microtubule capture and directed cell migration. *Mol Biol Cell*, 2014. 25(5): p. 658-68.
131. Gaillard, J., et al., Differential interactions of the formins INF2, mDia1, and mDia2 with microtubules. *Mol Biol Cell*, 2011. 22(23): p. 4575-87.
132. Feierbach, B., F. Verde, and F. Chang, Regulation of a formin complex by the microtubule plus end protein tea1p. *J Cell Biol*, 2004. 165(5): p. 697-707.
133. Wen, Y., et al., EB1 and APC bind to mDia to stabilize microtubules downstream of Rho and promote cell migration. *Nat Cell Biol*, 2004. 6(9): p. 820-30.
134. Cheng, L., et al., Aurora B regulates formin mDia3 in achieving metaphase chromosome alignment. *Dev Cell*, 2011. 20(3): p. 342-52.
135. Lewkowicz, E., et al., The microtubule-binding protein CLIP-170 coordinates mDia1 and actin reorganization during CR3-mediated phagocytosis. *J Cell Biol*, 2008. 183(7): p. 1287-98.
136. Habas, R., Y. Kato, and X. He, Wnt/Frizzled activation of Rho regulates vertebrate gastrulation and requires a novel Formin homology protein Daam1. *Cell*, 2001. 107(7): p. 843-54.
137. Kim, G.H. and J.K. Han, Essential role for beta-arrestin 2 in the regulation of *Xenopus* convergent extension movements. *EMBO J*, 2007. 26(10): p. 2513-26.
138. Liu, W., et al., Mechanism of activation of the Formin protein Daam1. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2008. 105(1): p. 210-5.
139. Kida, Y.S., et al., Daam1 regulates the endocytosis of EphB during the convergent extension of the zebrafish notochord. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2007. 104(16): p. 6708-13.
140. Sato, A., et al., Profilin is an effector for Daam1 in non-canonical Wnt signaling and is required for vertebrate gastrulation. *Development*, 2006. 133(21): p. 4219-31.
141. Higashi, T., et al., Biochemical characterization of the Rho GTPase-regulated actin assembly by diaphanous-related formins, mDia1 and Daam1, in platelets. *J Biol Chem*, 2008. 283(13): p. 8746-55.
142. Li, D., et al., Dishevelled-associated activator of morphogenesis 1 (Daam1) is required for heart morphogenesis. *Development*, 2011. 138(2): p. 303-15.

143. Nakaya, M.A., et al., Identification and comparative expression analyses of Daam genes in mouse and *Xenopus*. *Gene Expr Patterns*, 2004. 5(1): p. 97-105.
144. Lee, H.K. and B. Deneen, Daam2 is required for dorsal patterning via modulation of canonical Wnt signaling in the developing spinal cord. *Dev Cell*, 2012. 22(1): p. 183-96.
145. Wallingford, J.B. and R. Habas, The developmental biology of Dishevelled: an enigmatic protein governing cell fate and cell polarity. *Development*, 2005. 132(20): p. 4421-36.
146. Menon, K.P., R.A. Carrillo, and K. Zinn, Development and plasticity of the *Drosophila* larval neuromuscular junction. *Wiley Interdiscip Rev Dev Biol*, 2013. 2(5): p. 647-70.
147. Jan, L.Y. and Y.N. Jan, Properties of the larval neuromuscular junction in *Drosophila melanogaster*. *J Physiol*, 1976. 262(1): p. 189-214.
148. Jan, Y.N. and L.Y. Jan, Genetic dissection of short-term and long-term facilitation at the *Drosophila* neuromuscular junction. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1978. 75(1): p. 515-9.
149. Ganetzky, B. and C.F. Wu, Neurogenetic analysis of potassium currents in *Drosophila*: synergistic effects on neuromuscular transmission in double mutants. *J Neurogenet*, 1983. 1(1): p. 17-28.
150. Johansen, J., et al., Stereotypic morphology of glutamatergic synapses on identified muscle cells of *Drosophila* larvae. *J Neurosci*, 1989. 9(2): p. 710-25.
151. Budnik, V., Synapse maturation and structural plasticity at *Drosophila* neuromuscular junctions. *Curr Opin Neurobiol*, 1996. 6(6): p. 858-67.
152. Chiba, A. and H. Keshishian, Neuronal pathfinding and recognition: roles of cell adhesion molecules. *Dev Biol*, 1996. 180(2): p. 424-32.
153. Keshishian, H., et al., The *drosophila* neuromuscular junction: a model system for studying synaptic development and function. *Annu Rev Neurosci*, 1996. 19: p. 545-75.
154. Harris, K.P. and J.T. Littleton, Transmission, Development, and Plasticity of Synapses. *Genetics*, 2015. 201(2): p. 345-75.
155. Landgraf, M. and S. Thor, Development and structure of motoneurons. *Int Rev Neurobiol*, 2006. 75: p. 33-53.
156. Kohsaka, H., et al., Development of larval motor circuits in *Drosophila*. *Dev Growth Differ*, 2012. 54(3): p. 408-19.

157. Long, J.B. and D. Van Vactor, Embryonic and larval neural connectivity: progressive changes in synapse form and function at the neuromuscular junction mediated by cytoskeletal regulation. *Wiley Interdiscip Rev Dev Biol*, 2013. 2(6): p. 747-65.
158. Landgraf, M., et al., Embryonic origins of a motor system: motor dendrites form a myotopic map in *Drosophila*. *PLoS Biol*, 2003. 1(2): p. E41.
159. Banovic, D., et al., *Drosophila* neuroligin 1 promotes growth and postsynaptic differentiation at glutamatergic neuromuscular junctions. *Neuron*, 2010. 66(5): p. 724-38.
160. Landgraf, M., et al., even-skipped determines the dorsal growth of motor axons in *Drosophila*. *Neuron*, 1999. 22(1): p. 43-52.
161. Ritzenthaler, S., E. Suzuki, and A. Chiba, Postsynaptic filopodia in muscle cells interact with innervating motoneuron axons. *Nat Neurosci*, 2000. 3(10): p. 1012-7.
162. Kohsaka, H. and A. Nose, Target recognition at the tips of postsynaptic filopodia: accumulation and function of Capricious. *Development*, 2009. 136(7): p. 1127-35.
163. Li, J., et al., Crucial role of *Drosophila* neurexin in proper active zone apposition to postsynaptic densities, synaptic growth, and synaptic transmission. *Neuron*, 2007. 55(5): p. 741-55.
164. Broadie, K. and M. Bate, Innervation directs receptor synthesis and localization in *Drosophila* embryo synaptogenesis. *Nature*, 1993. 361(6410): p. 350-3.
165. Chen, K. and D.E. Featherstone, Discs-large (DLG) is clustered by presynaptic innervation and regulates postsynaptic glutamate receptor subunit composition in *Drosophila*. *BMC Biol*, 2005. 3: p. 1.
166. Atwood, H.L., C.K. Govind, and C.F. Wu, Differential ultrastructure of synaptic terminals on ventral longitudinal abdominal muscles in *Drosophila* larvae. *J Neurobiol*, 1993. 24(8): p. 1008-24.
167. Schuster, C.M., et al., Genetic dissection of structural and functional components of synaptic plasticity. I. Fasciclin II controls synaptic stabilization and growth. *Neuron*, 1996. 17(4): p. 641-54.
168. Liu, Z., et al., Distinct presynaptic and postsynaptic dismantling processes of *Drosophila* neuromuscular junctions during metamorphosis. *J Neurosci*, 2010. 30(35): p. 11624-34.
169. Zito, K., et al., Watching a synapse grow: noninvasive confocal imaging of synaptic growth in *Drosophila*. *Neuron*, 1999. 22(4): p. 719-29.

170. Ruiz-Canada, C. and V. Budnik, Introduction on the use of the *Drosophila* embryonic/larval neuromuscular junction as a model system to study synapse development and function, and a brief summary of pathfinding and target recognition. *Int Rev Neurobiol*, 2006. 75: p. 1-31.
171. Budnik, V., et al., Regulation of synapse structure and function by the *Drosophila* tumor suppressor gene *dlg*. *Neuron*, 1996. 17(4): p. 627-40.
172. Sigrist, S.J., et al., Postsynaptic translation affects the efficacy and morphology of neuromuscular junctions. *Nature*, 2000. 405(6790): p. 1062-5.
173. Featherstone, D.E., et al., *Drosophila* alpha- and beta-spectrin mutations disrupt presynaptic neurotransmitter release. *J Neurosci*, 2001. 21(12): p. 4215-24.
174. Pielage, J., R.D. Fetter, and G.W. Davis, Presynaptic spectrin is essential for synapse stabilization. *Curr Biol*, 2005. 15(10): p. 918-28.
175. Ruiz-Canada, C., et al., New synaptic bouton formation is disrupted by misregulation of microtubule stability in aPKC mutants. *Neuron*, 2004. 42(4): p. 567-80.
176. Goellner, B. and H. Aberle, The synaptic cytoskeleton in development and disease. *Dev Neurobiol*, 2012. 72(1): p. 111-25.
177. Sudhof, T.C., The presynaptic active zone. *Neuron*, 2012. 75(1): p. 11-25.
178. Oswald, D. and S.J. Sigrist, Assembling the presynaptic active zone. *Curr Opin Neurobiol*, 2009. 19(3): p. 311-8.
179. Wichmann, C. and S.J. Sigrist, The active zone T-bar--a plasticity module? *J Neurogenet*, 2010. 24(3): p. 133-45.
180. Sigrist, S.J. and D. Schmitz, Structural and functional plasticity of the cytoplasmic active zone. *Curr Opin Neurobiol*, 2011. 21(1): p. 144-50.
181. Ohtsuka, T., CAST: functional scaffold for the integrity of the presynaptic active zone. *Neurosci Res*, 2013. 76(1-2): p. 10-5.
182. Kittel, R.J., et al., Bruchpilot promotes active zone assembly, Ca²⁺ channel clustering, and vesicle release. *Science*, 2006. 312(5776): p. 1051-4.
183. Wagh, D.A., et al., Bruchpilot, a protein with homology to ELKS/CAST, is required for structural integrity and function of synaptic active zones in *Drosophila*. *Neuron*, 2006. 49(6): p. 833-44.
184. Fouquet, W., et al., Maturation of active zone assembly by *Drosophila* Bruchpilot. *J Cell Biol*, 2009. 186(1): p. 129-45.

185. Matkovic, T., et al., The Bruchpilot cytomatrix determines the size of the readily releasable pool of synaptic vesicles. *J Cell Biol*, 2013. 202(4): p. 667-83.
186. Kaufmann, N., et al., Drosophila liprin-alpha and the receptor phosphatase Dlar control synapse morphogenesis. *Neuron*, 2002. 34(1): p. 27-38.
187. Oswald, D., et al., A Syd-1 homologue regulates pre- and postsynaptic maturation in Drosophila. *J Cell Biol*, 2010. 188(4): p. 565-79.
188. Oswald, D., et al., Cooperation of Syd-1 with Neurexin synchronizes pre- with postsynaptic assembly. *Nat Neurosci*, 2012. 15(9): p. 1219-26.
189. Gallo, G., The cytoskeletal and signaling mechanisms of axon collateral branching. *Dev Neurobiol*, 2011. 71(3): p. 201-20.
190. Meyer, M.P. and S.J. Smith, Evidence from in vivo imaging that synaptogenesis guides the growth and branching of axonal arbors by two distinct mechanisms. *J Neurosci*, 2006. 26(13): p. 3604-14.
191. Manitt, C., et al., Netrin participates in the development of retinotectal synaptic connectivity by modulating axon arborization and synapse formation in the developing brain. *J Neurosci*, 2009. 29(36): p. 11065-77.
192. Zhang, W. and D.L. Benson, Stages of synapse development defined by dependence on F-actin. *J Neurosci*, 2001. 21(14): p. 5169-81.
193. Nelson, J.C., A.K. Stavoe, and D.A. Colon-Ramos, The actin cytoskeleton in presynaptic assembly. *Cell Adh Migr*, 2013. 7(4): p. 379-87.
194. Spillane, M., et al., Nerve growth factor-induced formation of axonal filopodia and collateral branches involves the intra-axonal synthesis of regulators of the actin-nucleating Arp2/3 complex. *J Neurosci*, 2012. 32(49): p. 17671-89.
195. Dharmalingam, E., et al., F-BAR proteins of the syndapin family shape the plasma membrane and are crucial for neuromorphogenesis. *J Neurosci*, 2009. 29(42): p. 13315-27.
196. Pawson, C., B.A. Eaton, and G.W. Davis, Formin-dependent synaptic growth: evidence that Dlar signals via Diaphanous to modulate synaptic actin and dynamic pioneer microtubules. *J Neurosci*, 2008. 28(44): p. 11111-23.
197. Koch, N., et al., Terminal axonal arborization and synaptic bouton formation critically rely on abp1 and the arp2/3 complex. *PLoS One*, 2014. 9(5): p. e97692.

198. Perkins, E.M., et al., Loss of beta-III spectrin leads to Purkinje cell dysfunction recapitulating the behavior and neuropathology of spinocerebellar ataxia type 5 in humans. *J Neurosci*, 2010. 30(14): p. 4857-67.
199. Stankewich, M.C., et al., Targeted deletion of betaIII spectrin impairs synaptogenesis and generates ataxic and seizure phenotypes. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2010. 107(13): p. 6022-7.
200. Gundelfinger, E.D. and A. Fejtova, Molecular organization and plasticity of the cytomatrix at the active zone. *Curr Opin Neurobiol*, 2012. 22(3): p. 423-30.
201. Sankaranarayanan, S., P.P. Atluri, and T.A. Ryan, Actin has a molecular scaffolding, not propulsive, role in presynaptic function. *Nat Neurosci*, 2003. 6(2): p. 127-35.
202. Chia, P.H., M.R. Patel, and K. Shen, NAB-1 instructs synapse assembly by linking adhesion molecules and F-actin to active zone proteins. *Nat Neurosci*, 2012. 15(2): p. 234-42.
203. Coyle, I.P., et al., Nervous wreck, an SH3 adaptor protein that interacts with Wsp, regulates synaptic growth in *Drosophila*. *Neuron*, 2004. 41(4): p. 521-34.
204. Waites, C.L., et al., Piccolo regulates the dynamic assembly of presynaptic F-actin. *J Neurosci*, 2011. 31(40): p. 14250-63.
205. Leal-Ortiz, S., et al., Piccolo modulation of Synapsin1a dynamics regulates synaptic vesicle exocytosis. *J Cell Biol*, 2008. 181(5): p. 831-46.
206. Wagh, D., et al., Piccolo Directs Activity Dependent F-Actin Assembly from Presynaptic Active Zones via Daam1. *PLoS One*, 2015. 10(4): p. e0120093.
207. Bellot, A., et al., The structure and function of actin cytoskeleton in mature glutamatergic dendritic spines. *Brain Res*, 2014. 1573: p. 1-16.
208. Spence, E.F. and S.H. Soderling, Actin Out: Regulation of the Synaptic Cytoskeleton. *J Biol Chem*, 2015. 290(48): p. 28613-22.
209. Kim, Y., et al., Phosphorylation of WAVE1 regulates actin polymerization and dendritic spine morphology. *Nature*, 2006. 442(7104): p. 814-7.
210. Soderling, S.H., et al., A WAVE-1 and WRP signaling complex regulates spine density, synaptic plasticity, and memory. *J Neurosci*, 2007. 27(2): p. 355-65.
211. Hotulainen, P., et al., Defining mechanisms of actin polymerization and depolymerization during dendritic spine morphogenesis. *J Cell Biol*, 2009. 185(2): p. 323-39.

212. Chazeau, A., et al., Nanoscale segregation of actin nucleation and elongation factors determines dendritic spine protrusion. *EMBO J*, 2014. 33(23): p. 2745-64.
213. Miki, H., S. Suetsugu, and T. Takenawa, WAVE, a novel WASP-family protein involved in actin reorganization induced by Rac. *EMBO J*, 1998. 17(23): p. 6932-41.
214. Lamprecht, R., et al., Fear conditioning drives profilin into amygdala dendritic spines. *Nat Neurosci*, 2006. 9(4): p. 481-3.
215. Kapitein, L.C. and C.C. Hoogenraad, Building the Neuronal Microtubule Cytoskeleton. *Neuron*, 2015. 87(3): p. 492-506.
216. Koch, I., et al., Drosophila ankyrin 2 is required for synaptic stability. *Neuron*, 2008. 58(2): p. 210-22.
217. Pielage, J., et al., A presynaptic giant ankyrin stabilizes the NMJ through regulation of presynaptic microtubules and transsynaptic cell adhesion. *Neuron*, 2008. 58(2): p. 195-209.
218. Stephan, R., et al., Hierarchical microtubule organization controls axon caliber and transport and determines synaptic structure and stability. *Dev Cell*, 2015. 33(1): p. 5-21.
219. Koles, K. and V. Budnik, Wnt signaling in neuromuscular junction development. *Cold Spring Harb Perspect Biol*, 2012. 4(6).
220. Budnik, V. and P.C. Salinas, Wnt signaling during synaptic development and plasticity. *Curr Opin Neurobiol*, 2011. 21(1): p. 151-9.
221. Gogel, S., et al., The Drosophila microtubule associated protein Futsch is phosphorylated by Shaggy/Zeste-white 3 at an homologous GSK3beta phosphorylation site in MAP1B. *Mol Cell Neurosci*, 2006. 33(2): p. 188-99.
222. Packard, M., et al., The Drosophila Wnt, wingless, provides an essential signal for pre- and postsynaptic differentiation. *Cell*, 2002. 111(3): p. 319-30.
223. Luchtenborg, A.M., et al., Heterotrimeric Go protein links Wnt-Frizzled signaling with ankyrins to regulate the neuronal microtubule cytoskeleton. *Development*, 2014. 141(17): p. 3399-409.
224. Kaech, S., et al., Cytoskeletal microdifferentiation: a mechanism for organizing morphological plasticity in dendrites. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2001. 98(13): p. 7086-92.
225. Gu, J., B.L. Firestein, and J.Q. Zheng, Microtubules in dendritic spine development. *J Neurosci*, 2008. 28(46): p. 12120-4.

- 226. Hu, X., et al., Activity-dependent dynamic microtubule invasion of dendritic spines. *J Neurosci*, 2008. 28(49): p. 13094-105.
- 227. Jaworski, J., et al., Dynamic microtubules regulate dendritic spine morphology and synaptic plasticity. *Neuron*, 2009. 61(1): p. 85-100.
- 228. Matusek, T., et al., The *Drosophila* formin DAAM regulates the tracheal cuticle pattern through organizing the actin cytoskeleton. *Development*, 2006. 133(5): p. 957-66.
- 229. Harris, E.S., et al., Mechanistic differences in actin bundling activity of two mammalian formins, FRL1 and mDia2. *J Biol Chem*, 2006. 281(20): p. 14383-92.
- 230. Lu, J., et al., Structure of the FH2 domain of Daam1: implications for formin regulation of actin assembly. *J Mol Biol*, 2007. 369(5): p. 1258-69.
- 231. Gombos, R., et al., The Formin DAAM Functions as Molecular Effector of the Planar Cell Polarity Pathway during Axonal Development in *Drosophila*. *J Neurosci*, 2015. 35(28): p. 10154-67.
- 232. Matusek, T., et al., Formin proteins of the DAAM subfamily play a role during axon growth. *J Neurosci*, 2008. 28(49): p. 13310-9.
- 233. Migh, E., et al., Microtubule organization in presynaptic boutons relies on the formin DAAM. *Development*, 2018. 145(6).
- 234. Lepicard, S., et al., A presynaptic role of microtubule-associated protein 1/Futsch in *Drosophila*: regulation of active zone number and neurotransmitter release. *J Neurosci*, 2014. 34(20): p. 6759-71.
- 235. Molnar, I., et al., DAAM is required for thin filament formation and Sarcomerogenesis during muscle development in *Drosophila*. *PLoS Genet*, 2014. 10(2): p. e1004166.
- 236. Gratz, S.J., et al., Genome engineering of *Drosophila* with the CRISPR RNA-guided Cas9 nuclease. *Genetics*, 2013. 194(4): p. 1029-35.