

József Attila Tudományegyetem

Elméleti Fizikai Tanszék

Kibernetikai Laboratórium

A TÖBBSZÓRÁSOS X_α -MÓDSZER ÉS ALKALMAZÁSA

NÉHÁNY EGYSZERŰ MOLEKULÁRA

Doktori disszertáció

Varga Zsuzsanna

Szeged

1977.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
BEVEZETÉS	3.
1. Az $X\alpha$ -MÓDSZER	8.
1.1. A Hartree-Fock egyenletek	8.
1.2. A kicserélődés statisztikus köze- litése.....	12.
2. A TÖBBSZÓRÁSOS MÓDSZER	16.
2.1. A KKR-módszer.....	16.
A többszórásos módszer klaszterra...	20.
2.2. Muffin-tin potenciálok.....	20.
2.3. Az egy-elektron egyenlet megoldása az atomközi térben.....	24.
2.4. A megoldások illesztése: a szekulá- ris egyenlet	28.
Összefoglalás	32.
2.5. A szekuláris egyenlet megoldása; szimmetria	34.
2.6. A módszer lehetőségei és korlátai...	38.
3. A MÓDSZER SZÁMITÓGÉPRE IRT PROGRAMJAI....	40.
3.1. A kiinduló adatokat előállító prog- ramok	40.
3.2. A nem-self-consistent-field program.	41.
3.3. A Self-consistent-field program.....	43.



4. A PROGRAMOK FUTTATÁSA: EREDMÉNYEK ÉS TAPASZ-	
TALATOK	46.
4.1. Alkalmazás a JATE R-40 /ESZ-1040/	
számítógépére	46.
4.2. Eredmények	47.
a/ H_2O molekula	47.
b/ CH_4 molekula	49.
c/ SF_6 molekula	50.
5. A TÖBBSZÓRÁSOS $X\alpha$ MÓDSZER ALKALMAZÁSAI	
/CIKKBIBLIOGRÁFIA/	55.
a/ A módszer továbbfejlesztése, módo-	
sitás	56.
b/ Szabad atomok és molekulák	57.
c/ Gyökök, fémkomplexek	59.
d/ Szilárdtestfizikai alkalmazások	60.
e/ Szerves molekulák	61.
FÜGGELÉK	63.
1. §. Szférikus Bessel-függvények	63.
2. §. A Gaunt-integrálok	65.
3. §. A totális energia és a muffin-tin	
potenciál kiszámítása a muffin-tin töl-	
tessűrűségekből	66.
4. §. A Green-függvények kifejtési tételei.....	71.
IRODALOM	74.
SZÁMITÓGÉPI LISTÁK	

BEVEZETÉS

Jelenleg is a legérdekesebb kutatási területek egyike a nagy molekulák és komplex szilárd testek kötésének kvantitatív leírása. Olyan anyagokra gondolunk, mint amilyenek a sokatomos molekulák gázfázisban, kristályos környezetben vagy éppen oldatban; "molekula"-kristályok, ahol több atom van elemi cellánként; szennyezések és hibák egyébként tökéletes kristályban; rendezetlen vagy amorf anyagok; a biológiában jelentős makromolekulák, polimerek, stb. Ha a kvantumkémiaát hatásosan akarjuk alkalmazni ilyen rendszerekre, akkor, szem előtt tartva a mai nagy számítógépek adta lehetőségeket, új és pontos számítási módszereket kell kidolgozni.

A hagyományos *ab initio* Hartree-Fock self-consistent-field módszerek, melyek az atomi pályák lineáris kombinációján, mint molekulapályán alapulnak /SCF-LCAO módszerek/, nehezek, és sokatomos rendszerre való alkalmazásuk költséges is, mert az aránylag nagy bázis használata és a nagyszámu többcentrumu integrál ill. ekvivalens Hartree-Fock mátrixelem kiszámítása sok gépidőt vesz igénybe.

Az egyszerűbb közelítő és félempirikus módszerek, olyanok, mint amelyek a CNDO /Complete Neglect of Differential Overlap/ módszeren [1] alapulnak, a többcentrumu in-

tégrálok különféle közelítésétől vagy a mátrix elemek paramétereitől függnnek. Ezek a módszerek jól használhatóak akár kicsi, akár nagy molekulák szemikvantitatív leírására, de csak akkor, ha a molekula alacsony rendszámú atomokat tartalmaz. Azonban a magasabb rendszámú atomokat /pl. átmeneti vagy ritka földfémeket/ tartalmazó molekulák vagy kristályok kezelésére nem alkalmas.

A hagyományos sávelméletet hasonlóképpen nehéz alkalmazni olyan kristályokra, amelyekben több mint egy atom van elemi cellánként, ezenkívül ez a módszer függ a rácsperiodicitási feltételtől is.

Az elektron-állapotok "mély nivó"-inak hagyományos elméletei, melyek a kristályok bizonyos típusú szennyezéseivel állnak kapcsolatban /például átmeneti-fém szennyezések félvezetőkben/, elvileg megkívánják, hogy ismerjük a különben tökéletes rács egy-elektron hullámfüggvényeinek teljes rendszerét [2].

J. C. Slater [3] javaslatát követően K. H. Johnson [4-9] kidolgozott egy új elméleti közelítést, elsősorban a sokatomos molekulák és szilárdtestek elektronállapotainak számítására. Ez a technika sok olyan nehézséget elkerül, amelyek a kvantumkémia és a kristályok sávelméletének hagyományosabb módszereiben előfordulnak. A módszerrel a nagyobb sztereokémiai komplexitású molekulák és szilárd testek kémiai kötése pontosan leírható különösebb számítási nehézség és gépidő felhasználás nélkül.

A módszer alapvetően a vizsgált rendszernek sokatomos klaszter /cluster/-komponensekbe való fölosztására épül. Minden klasztert, amely lehet véges sokatomos molekula, makromolekula része, vagy sokatomos komplex egy rendezett vagy rendezetlen szilárd testből, geometriailag folytonos atomi, atomközi és molekulán kívüli térre osztunk. Az egy-elektron Schrödinger-egyenletet numerikusan integráljuk minden tartományban a szférikus és térfogati átlagolt potenciálokra, melyek a kicserélődésre az $X\alpha$ statisztikus közelítést tartalmazzák. A hullámfüggvények és első deriváltjaik folytonosan kapcsolódnak össze a klaszter különböző tartományain keresztül, éppugy mint a többszórásos elméletben, amelyet eredetileg Korringa fejlesztett ki [10, 11]. Egy partikuláris környezet hatása a klaszterra határfeltételekkel írható le, például egy szimmetrikus sokatomos molekula esetében a molekulán kívüli tartományban a Schrödinger-egyenlet megoldását illeszteni kell az egész molekulát körülvevő mesterséges gömbhathoz. Az eljárás gyorsan konvergáló szekuláris egyenletrendszerhez vezet, amelyek numerikus megoldásával a molekula-pálya energiák és függvények adódnak. Ezen egyenletek mátrix elemeit, összehasonlítva az ab initio LCAO módszerekre jellemzőkkel, egyszerű számítani. Nagy előnyük, hogy nem tartalmaznak többcentrumú integrálokat. Az egész numerikus eljárást addig kell ismételni, minden iterációban a kapott függvényből töltéssűrűséget és új potenciált generálva, amíg a self-consistent-field feltételt elérjük.



Az SCF többszórásos technika csak kis töredékét használja annak a gépidőnek, ami egy ab initio Hartree-Fock LCAO módszerhez kell. Ezenkívül az alkalmazások azt mutatják /pl. [7],[9] /, hogy ez a módszer a kísérletekkel kvantitativan igen jól egyező eredményekre vezet. Például az optikai gerjesztések "átmeneti állapot" elméletét használva, a többszórásos modell a molekula és kristály optikai tulajdonságainak pontos leírását adja, amely még a pályarelagációk hatását is magában foglalja [6,7]. A módszer ezenkívül olyan kristályokra és molekulákra is lehet alkalmazni, ahol az ab initio LCAO módszerekkel a számítási nehézségek és gépidő-költség miatt nem érhető el eredmény. Továbbá, kiindulásul az $X\alpha$ statisztikus totális energiát használva, meghatározható a totális energia, mint a sztereo-kémiai geometria függvénye.

Az elméleti formalizmust ki lehet terjeszteni a komplex kristályok elektronstruktúrájának leírására, vagy olyan problémákra, mint a szennyezések és hibák kristálybeli kötésének, továbbá rendezetlen vagy amorf anyagok struktúrája vizsgálatára. [5. fejezet].

A disszertáció célja a módszer, és a módszer alapján készített programok részletes leírása, a program futtatásához szükséges tudnivalók ismertetése, valamint a program futásai közben szerzett tapasztalatok bemutatása.

Az 1. és 2. fejezet a módszer elméleti alapjait tárja föl, a használt egy-elektron közelítő módszert ($X\alpha$)

és az egy-elektron egyenletek megoldásának módját /többszórásos módszer/.

A 3. fejezet ismerteti a módszer alapján írt programokat. A szükséges numerikus részleteket a Függelék tartalmazza.

A 4. fejezet a programok az R-40-es számítógépre történt átirását, valamint a futások közben szerzett tapasztalatainkat tartalmazza. Ebben a fejezetben találhatók a viz, a metán és a kénhexafluorid molekulára kapott eredményeink is, összehasonlítva az irodalmi értékekkel.

Az 5. fejezet bő áttekintést nyújt a módszer eddigi alkalmazásairól. A cikkbibliográfia 1977. áprilisáig bezáróan tartalmazza az alkalmazás jellemző adatait. /Milyen anyagon, mit számoltak, a szerző/k/ nevét, a megjelenés helyét és idejét/.

A Függelék, a már említett numerikus eljárások leírásán kívül, a futtatások eredeti, számítógépes listáit is magában foglalja.

A disszertáció végén kapott helyet az első négy fejezethez és a Függelékhez tartozó irodalmi hivatkozások jegyzéke.

1. AZ $X\alpha$ - MÓDSZER

1.1. A Hartree-Fock egyenletek

Induljunk ki egy n elektront és N magot tartalmazó molekula Schrödinger-egyenletéből

$$\begin{aligned}
 H(\vec{r}, \vec{R}) \Psi(\vec{r}, \vec{R}) = & \\
 = \left\{ \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta_i \right) + \sum_{i < j} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} - \sum_{i, \alpha} \frac{Z_\alpha e^2}{|\vec{r}_i - \vec{R}_\alpha|} + \right. & \\
 \left. + \sum_{\alpha=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2M_\alpha} \Delta_\alpha \right) + \sum_{\alpha < \beta} \frac{Z_\alpha Z_\beta e^2}{|\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta|} \right\} \Psi = E \Psi & \quad (1.1)
 \end{aligned}$$

ahol a $\Psi(\vec{r}, \vec{R}) = \Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, \vec{R}_1, \dots, \vec{R}_N)$ molekula-függvény az összes elektron és összes mag koordinátájától függ.

Mivel a magok az elektronoknál jóval lassabban mozognak, az elektronállapotok kiszámításánál a magok jó közelítéssel nyugvónak tekinthetők. /Adiabatikus közelítés [1] /.

Vezessünk be atomi egységeket, azaz legyen $e=1$, $\hbar=1$, $m_e=1$. Ekkor a hosszúság egysége lesz a bohr /jele

$$a_0 / : \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} =$$

$$= 0.529177 \cdot 10^{-8} \text{ cm}; \text{ az energia egysége a Rydberg}$$

$$/Ry / : \quad 1Ry = \frac{e^2}{2a_0} =$$

$$= 2.1799 \cdot 10^{-11} \text{ erg} = 13.606 \text{ eV. Ezentúl mindig atomi}$$

egységeket használunk.

A Schrödinger-egyenletet átírva atomi egységekre, az elektronok stacionárius állapotait leíró $\varphi(1, \dots, n)$ antiszimmetrikus függvényt a

$$\left[\sum_i (-\Delta_i - \sum_{\alpha} \frac{2Z_{\alpha}}{|\vec{r}_i - \vec{R}_{\alpha}|}) + \sum_{i < j} \frac{2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \right] \varphi(1, \dots, n) =$$

$$= \left(\sum_i f_i + \sum_{i < j} g_{ij} \right) \varphi(1, \dots, n) = E \varphi(1, \dots, n) \quad (1.2)$$

egyenletből határozhatjuk meg, ahol a φ argumentumában szereplő $1, \dots, n$ számok az elektronok hely- és spin-koordinátáit jelölik, továbbá az egy-elektron operátort röviden f_i -vel, a két-elektron operátorokat g_{ij} -vel jelöltük. /A magkoordinátákat paraméterként kezeljük; az egyszerűség kedvéért nem írjuk ki/.

Ha ismerjük az $\{u_k(1)\}_{k=1}^{\infty}$ egy-elektron spinpályák teljes rendszerét, akkor az elektronok sajátfüggvénye fölírható, mint

$$\varphi(1, \dots, n) = \sum_k C_k \Delta_k(n) \quad \text{összeállítás} \quad (1.3)$$

ahol

$$\Delta_k(n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} u_1(1) & \dots & u_1(n) \\ \vdots & & \vdots \\ u_n(1) & \dots & u_n(n) \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} \text{n db elektron felbontása} \\ \text{n állapot} \end{matrix}$$

a $K=(k_1, \dots, k_n), (k_1 < \dots < k_n)$ rendezett konfigurációhoz tartozó Slater-determináns. Első közelítésként olyan $\{u\}$ rendszert keressünk, hogy a

$$\varphi_0(1, \dots, n) = \Delta_0(n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} u_1(1) & \dots & u_1(n) \\ \vdots & & \vdots \\ u_n(1) & \dots & u_n(n) \end{vmatrix}$$

egyetlen Slater-determinánssal a lehető legjobb energiát kapjuk. Másszóval úgy válasszuk meg az u_i függvényeket, hogy a rendszer

$$\langle EHF \rangle = \langle \Delta_0(n) | H | \Delta_0(n) \rangle \quad (1.4)$$

totális energiája minimális legyen. Részletesen kiírva

$$\begin{aligned} \langle EHF \rangle = & \sum_i n_i \int u_i^*(1) f_1 u_i(1) dv_1 + \\ & + \sum_{i < j} n_i n_j \int u_i^*(1) u_j^*(2) [u_i(1) u_j(2) - \\ & - \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} u_j(1) u_i(2)] g_{12} dv_1 dv_2 \end{aligned} \quad (1.5)$$

lesz a rendszer totális energiája, ahol n_i az i -dik spinpálya betöltési száma /0 vagy 1/, az integrál pedig a spinre való összegzést is jelenti. Az $i < j$ kikötés elhagyható, az utolsó tagot pedig a spin szerint szétválasztva kapjuk, hogy

$\rho(1)$ és $\rho(2)$ nem definiáltak

$$\begin{aligned} \langle E_{HF} \rangle = & \sum_i n_i \int u_i^*(1) f_1 u_i(1) dv_1 + \\ & + \frac{1}{2} \int \rho(1) \rho(2) g_{12} dv_1 dv_2 + \\ & + \frac{1}{2} \int [\rho_{\uparrow}(1) U_{XHF\uparrow}(1) + \rho_{\downarrow}(1) U_{XHF\downarrow}(1)] dv_1 \end{aligned} \quad (1.6)$$

Itt $\rho_{\uparrow}(1) = \sum_{i\uparrow} n_i u_i^*(1) u_i(1)$ a $\uparrow$ spinű elektronok sűrűsége az $\vec{r}_1$ helyen és

$$U_{XHF\uparrow}(1) \equiv - \sum_{i\uparrow j\uparrow} n_i n_j \frac{\int u_i^*(1) u_j^*(2) u_j(1) u_i(2) g_{12} dv_2}{\sum_{k\uparrow} n_k u_k^*(1) u_k(1)} \quad 1.7$$

Látható, hogy a totális energia (1.6) kifejezésében az első tag a kinetikus energia és az elektronoknak a magok terében vett energiájának összege. A második tag a Coulomb-kölcsönhatási energia, amely magába foglalja az elektron saját-kölcsönhatását is. Az utolsó tag a kicserélődési energia, ami viszont az előbbi saját-kölcsönhatást éppen megsemmisíti.

A totális energia minimumát az u_i spinpályák variálásával kell megkeresni, miközben figyelembe vesszük, hogy a spinpályák ortonormáltak [12]. Ebből adódik az u_i spinpályák meghatározására szolgáló

$$\begin{aligned} [f_1 + \sum_j n_j \int u_j^*(2) u_j(2) g_{12} dv_2 + V_{XHF,i}(1)] u_i(1) = \\ = \epsilon_{i, HF} u_i(1) \end{aligned} \quad (1.8)$$

Hartree-Fock egyenlet, ahol

$$V_{XHF_i}(1) \equiv - \frac{\sum_j n_j \int u_i^*(1) u_j^*(2) u_j(1) u_i(2) g_{12} dv_2}{u_i^*(1) u_i(1)} \quad (1.9)$$

a kicserélődés potenciálja. Az egyenletben szereplő ϵ_{iHF} (1.8) és (1.5) alapján felírható, mint

$$\langle EHF(n_i=1) \rangle - \langle EHF(n_i=0) \rangle, \quad (1.10)$$

azaz a molekula totális energiája, ha az i -edik spinpálya be van töltve, mínusz a molekula totális energiája, ha az i -edik spinpálya üres. Ez megfelel a Koopmans-tételnek [13], amely szerint a Hartree-Fock-egyenlet sajátértékének mínusz egyszerese az ionizációs energia.

1.2. A kicserélődés statisztikus közelítése

Az (1.8) egy-elektron egyenlet megoldásában az egyik nehézséget a kicserélődés számítása jelenti. Slater az (1.9) kicserélődési potenciált egy súlyozott átlaggal helyettesítette [14], majd az átlagot szabad elektrongázra kiszámolta [12]. Így a kicserélődésre a

$$V_{XS\uparrow} = -6 \left[\frac{3}{4\pi} g_{\uparrow}(1) \right]^{1/3}$$

közelítő formulát kapta /ahol $g_{\uparrow}$ már a $\sum_{i\uparrow} n_i u_i^*(1) u_i(1)$ aktuális töltéssűrűséget jelenti/. Ha még bevezetünk egy α paramétert ($\alpha(\text{Slater}) = 1$), megkapjuk az $X\alpha$ kicserélődést:

lineárisan vezetjük le?

$$V_{x\alpha\uparrow}(1) = -6\alpha \left[\frac{3}{4\pi} g_{\uparrow}(1) \right]^{1/3} \quad (1.11)$$

Igy az egy-elektron egyenlet:

$$\left[-\nabla_1^2 + V_c(1) + V_{x\alpha\uparrow}(1) \right] u_{i\uparrow}(1) = \varepsilon_i u_{i\uparrow}(1) \quad (1.12)$$

Gáspár R. [15], W. Kohn és L. J. Sham [16] megfordította az eljárás lépéseinek - a variálás és a kicserélődés statisztikus közelítése - sorrendjét. Ők a totális energia kicserélődési tagját helyettesítették statisztikus átlaggal és ezután variáltak az u_i spinpálya szerint. A kapott egy-elektron egyenlet (1.12)-nek felel meg, ha $\alpha = \frac{2}{3}$ értéket veszünk.

A totális energia az

$$\begin{aligned} \langle EX_{\alpha} \rangle = & \sum_i n_i \int u_i^*(1) \hat{t}_1 u_i(1) d\sigma_1 + \frac{1}{2} \iint g(1) g(2) g_{12} d\sigma_1 d\sigma_2 + \\ & + \frac{1}{2} \int (-g_{\alpha}) \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/3} \left[g_{\uparrow}(1)^{4/3} + g_{\downarrow}(1)^{4/3} \right] d\sigma_1 \end{aligned} \quad (1.13)$$

alakban írható, és könnyen belátható [14], hogy a sajátértékek most az

$$\varepsilon_{iX_{\alpha}} = \frac{\partial \langle EX_{\alpha} \rangle}{\partial n_i} \quad (1.14)$$

*n_i eddig diszkrét
változó volt (n_i = 0, 1)
most e²*

összefüggést elégítik ki az (1.10)-beli véges differencia helyett. Az $\varepsilon_{iX_{\alpha}}$ sajátértékek ennél fogva nem azonosak az ε_{iHF} Hartree-Fock sajátértékekkel.

Hátra van még az a kérdés, hogyan válasszuk meg az α szorzó értékét. A totális energia α -val lineárisan változik, tehát minimalizálási eljárás nem jöhet szóba. Kézenfekvő megoldás α -t úgy választani, hogy az (1.13) $X\alpha$ -totális energia egzaktul megegyezzen az (1.6) Hartree-Fock energiával. Ezzel a föltétellel K. Schwarz [17] kiszámította a könnyű atomokra ($Z=1, \dots, 41$) az α értékeket. Ilyen α -kkal végrehajtva egy self-consistent-field számolást, azt találták [18], hogy az $X\alpha$ spinpályák jól egyeznek a Hartree-Fock atomi pályákkal.

Egy másik eljárás α -t úgy választja meg, hogy az (1.8)-beli u_i spinpályákkal számolt Hartree-Fock energia a lehető legkisebb legyen. Az így választott α -kat Lindgren [19] javaslata alapján E. Kmetko [20] számolta ki az egész periódusos rendszerre.

Bizonyítható [14], hogy az u_i $X\alpha$ -spinpályákkal egzaktul teljesül a viriál-tétel bármilyen α -ra. Eszerint egy szabad atomra a kinetikus energia pontosan egyenlő a totális energia (-1) -szeresével. De a Hartree-Fock megoldás is egzaktul teljesíti a viriál-tételt. Így abból a föltételből, hogy az $X\alpha$ -totális-energia legyen egyenlő a Hartree-Fock energiával, az következik, hogy a két módszer kinetikus energiái is egzaktul egyenlők. Ez igen érzékeny tesztje a pályák egyezésének. Továbbá, a potenciális energiák is meg fognak egyezni. Ha a két módszerrel számított spinpályák közel vannak, a Coulomb-energiák közel egyenlőek lesznek, mert azonos formula szolgáltatja őket. Ennél-

fogva az $X\alpha$ - módszer kicserélődési energiája közel egyenlő lesz a Hartree-Fock kicserélődési energiával. Ne felejtünk el azonban, hogy az $\epsilon_{iX\alpha}$ sajátértékek jelentősen különböznek a Hartree-Fock spinpálya energiáktól.

2. A TÖBBSZÓRÁSOS MÓDSZER

Az előző fejezetben kapott

$$[-\nabla^2 + V(\vec{r})]\psi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\vec{r}) \quad (2.1)$$

egy-elektron egyenletet többféleképpen lehet megoldani. Például Roothaan módszerével [21], a megoldás úgy adódik, hogy a ψ_i függvényeket az atomi spinpályák szerint kifejtik és a kifejtési együtthatókra kapott egyenletrendszer megoldják. Eközben elkerülhetetlen a többcentrumu integrálok számítása, ami nehéz és időigényes feladat. Ezt a nehézséget kerüli el a többszórásos módszer, melyet J. C. Slater [3] javaslatára először K. H. Johnson dolgozott ki [4-6]. Ez a módszer nem más, mint a szilárdtestfizikában használt KKR /azaz Korringa [10]-Kohn-Rostocker [11]-módszer /Green-függvényes módszernek is nevezik// alkalmazása molekulára illetve klaszterre.

2.1. A KKR-módszer

A (2.1) egyenlet megoldása bármilyen $V(\vec{r})$ potenciál mellett a

$$\psi(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} V(\vec{r}') \psi(\vec{r}') d\vec{r}' \quad (2.2)$$

integrálegyenlet formájában írható, ahol $\kappa^2 = \varepsilon$ és κ valós vagy imaginárius aszerint, hogy $\varepsilon > 0$ vagy $\varepsilon < 0$. Ha már elértük a self-consistent field-et, akkor a (2.2) egyenlet szerint azt mondhatjuk: A függvény a potenciálon önmagába szóródott, másszóval az összes különböző $\vec{r}'$ pontból jövő $V(\vec{r}') \psi(\vec{r}')$ erősségű "hullámocskák" egyesülése adja a $\psi(\vec{r})$ hullámfüggvényt.

Tekintsünk egy egyféle atomból álló kristályt. Használjunk muffin-tin potenciálokat: az atomok körül a potenciál szférikus, a közti térben konstans /például 0/:

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{l}} V_a(\vec{r} - \vec{l}) \quad (2.3)$$

ahol $\vec{l}$ a transzlációs vektor. Behelyettesítve (2.2) -be kapjuk:

$$\psi(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \sum_{\vec{l}} \int \frac{e^{i\kappa|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} V_a(\vec{r}' - \vec{l}) \psi(\vec{r}') d\vec{r}', \quad (2.4)$$

ahol az integrálás csak az $\vec{l}$ körüli cellára vonatkozik, mivel $V_a(\vec{r}' - \vec{l})$ különben eltűnik. Legyen $\vec{r}'' = \vec{r}' - \vec{l}$ és használjuk föl, hogy (2.1) megoldása kristályban Bloch-függvény:

$$\psi(\vec{r}') = e^{i\vec{k}\vec{l}} \psi(\vec{r}' - \vec{l}),$$


ahol $\vec{k}$ a hullámvektor, így

$$\begin{aligned}\psi_k(\bar{r}) &= -\frac{1}{4\pi} \sum_{\bar{\ell}} \int \frac{e^{i\kappa|\bar{r}-\bar{r}'|}}{\bar{r}-\bar{r}'} V_a(\bar{r}'-\bar{\ell}) e^{i\bar{k}\bar{\ell}} \psi_k(\bar{r}'-\bar{\ell}) d\bar{r}' \\ &= -\frac{1}{4\pi} \int \{G(\kappa, \bar{k}; \bar{r}-\bar{r}'')\} V_a(\bar{r}'') \psi_k(\bar{r}'') d\bar{r}''\end{aligned}\quad (2.5)$$

Szemléletesen azt lehet mondani, hogy $\bar{r}$ -nél a hullámfüggvény az összes cellától szóródó "hullámocskák" összege [22]. Mivel minden cella azonos, be lehet vezetni a struktúra-Green-függvényt:

$$G(\kappa, \bar{k}, \bar{r}-\bar{r}'') \equiv \sum_{\bar{\ell}} \frac{e^{i\kappa|\bar{r}-\bar{r}''+\bar{\ell}|}}{|\bar{r}-\bar{r}''+\bar{\ell}|} e^{i\bar{k}\bar{\ell}}, \quad (2.6)$$

amely $\bar{r}$ -nél az $\bar{r}$ -től és az összes többi cella ekvivalens pontjától szóródó hullám hatását adja. /2.1. ábra/



2.1. ábra

A struktúra Green-függvény, mely egyesíti a rácsbeli összes ekvivalens pontból jövő hullámot [22].

Igy elegendő lesz egyetlen elemi cellára integrálni, hogy az egész hullámfüggvényt kapjuk. Az eljárás következő lépése megalkotni egy olyan funkcionált, melynek variálása a (2.5) integrálegyenletet adja. Könnyen belátha-

tó, hogy ez

$$\Lambda = N \int \psi_k^*(\vec{r}) V_a(\vec{r}) \psi_k(\vec{r}) d\vec{r} + \\ + \frac{1}{4\pi} \iint \psi_k^*(\vec{r}) V_a(\vec{r}) G(\kappa, \vec{k}, \vec{r} - \vec{r}') V_a(\vec{r}') \psi_k(\vec{r}') \times \quad (2.7) \\ \times d\vec{r} d\vec{r}'$$

lesz. Az integrálás csak egy elemi cellára vonatkozik, és mivel a potenciál az atomi gömbön kívül eltűnik, fönnáll, hogy $r, r' < R_s$. R_s az atomi gömb sugara/

Valamely atomi gömb belsejében viszont a hullámfüggvény a gömbfüggvények szerint sorba fejthető:

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{lm} C_{lm} R_l(r) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (2.8)$$

Behelyettesítve (2.7)-be, Λ a C_{lm} együtthatók kvadratikus függvénye lesz

$$\Lambda = \sum_{lm, l'm'} \Lambda_{lm, l'm'} C_{lm} C_{l'm'}^* \quad (2.9)$$

A variációs feltétel homogén lineáris egyenletrendszerhez vezet /szekuláris egyenletek/, amelynek $|\Lambda_{lm, l'm'}|$ determinánsa el kell, hogy tűnjön. A determináns a $\vec{k}$ hullámvektor és az $\varepsilon = \kappa^2$ energia függvénye, így a determináns gyökei az $\varepsilon(\vec{k})$ összefüggést adják. A determináns elemei

$$\Lambda_{lm;l'm'} = A_{lm;l'm'} + \kappa \delta_{ll'} \delta_{mm'} \frac{n_{e'} - n_e L_e}{j_{e'} - j_e L_e} \quad (2.10)$$


alakúak, ahol n_e, j_e szférikus Bessel-függvény és L_e az R_e radiális függvény logaritmikus deriváltja. Az $A_{lm;l'm'}$ együtthatók struktúra-konstansoknak tekinthetők, mert k és κ -n kívül csak a rácsstrukturától függenek. A pontos formulák Clebsch-Gordan együtthatókat és szférikus Bessel-függvényeket tartalmaznak, amelyek a Green-függvény $\bar{r}$ és $\bar{r}'$ irányu gömbfüggvényekbe való kifejtése következtében adódnak. Az atomi potenciál az R_e radiális függvénynek a gömbhatárnál vett logaritmikus deriváltján keresztül jelenik meg a determinánsban.

A többszórásos módszer klaszterra

A többszórásos módszer klaszterra elvileg azonos a KKR módszerrel, csak a megoldásfüggvények a kristályokban előírt periódicitás helyett exponenciálisan csökkennek a klasztertől távol /kötött állapot/. A szekuláris egyenlet levezetésében variálás helyett a hullámfüggvényeknek a különböző gömbhatároknál való egyidejű illeszkedéséből indulunk ki.

2.2 Muffin-tin potenciálok

A SCF többszórásos formalizmust legegyszerűbben egy atomokból álló szimmetrikus klaszteren szemléltethetjük. A 2.2 ábrán látható egy ilyen négyatomos "molekula" kétdimenziós képe.



2.2. ábra

Négy atomból álló szimmetrikus klaszter kétdimenziós képe.

A klaszter terét geometriailag három alaptartományra osztjuk. Először is minden atomot nem-átfedő gömbbel veszünk körül, melyeken belül legyen a potenciál szférikus. A p -edik gömbben:

$$\bar{V}_p(\bar{r}_p) = \frac{1}{4\pi} \iint V(\bar{r}) \sin \Theta_p d\Theta_p d\Phi_p$$

$$\bar{r}_p, \bar{\sigma} \quad (2.11)$$

ahol $\bar{r}_p = \bar{r} - \bar{R}_p$, $0 \leq r_p \leq b_p$, ha b_p a p -edik gömb sugara, $\bar{R}_p$ a p -edik gömb középpontjának az origótól való távolsága. Megjegyezzük, hogy az I. tartománybeli (2.11) potenciál nemcsak az ide lokalizált atomtól származik, hanem az összes többi atomi potenciálnak az erre a tartományra vett, szférikusan átlagolt járuléka is. Így az átfedő potenciálok hatása első rendben figyelembe van véve. Ugyanez érvényes a II. és III. tartományra is. Mint azt az alkalmazások szemléltetik [7-9], ez a módszer a (2.2) ábrához hasonló szimmetrikus sokatomos molekulák és szimmetri-

kus kristálykörnyezetben levő sokatomok klaszterek esetében pontos molekulapálya energiákhoz és függvényekhez vezet, anélkül, hogy a potenciálban nem-szférikus tagokat figyelembe kellene venni. Kisebb szimmetriájú komplex sokatomos molekulákra a pontosságot a nem-szférikus tagok perturbációként való figyelembevételével lehet növelni. [23]

Az atomi gömbökön belül a megoldás a gömbfüggvények szerint sorba fejthető:

$$\psi^p(\vec{r}_p) = \sum_L C_L^p R_L^p(\varepsilon, r_p) Y_L(\hat{r}_p), \quad (2.12)$$

ahol $\sum_L \equiv \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell}$, és R_{ℓ}^p a megfelelő

$$\left[-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \bar{V}_p(r) - \varepsilon \right] R_{\ell}^p(\varepsilon, r) = 0 \quad (2.13)$$

radiális egyenlet megoldása valamilyen ε energiaértékre és ℓ kvantumszámra. A radiális függvényeknek az atomok középpontjában végesnek kell lennie, így R_{ℓ}^p (2.13)-ból numerikus kifelé /outward/ integrálással határozható meg.

Az atomi gömbök közti tartományban a potenciál konstans, általában az összes potenciál térfogati átlaga:

$$V_{II} = \frac{1}{V_{\text{inter}}} \int_{V_{\text{inter}}} V(\vec{r}) d\vec{r}, \quad 2.14.$$

ahol $U_{in} = \frac{4\pi}{3} (l_o^3 - \sum_p l_p^3)$ az atomközi tartomány térfogata. Célszerű az atomi gömböket úgy választani, hogy az atomok közti tér a lehető legkisebb legyen és a gömbök érintsék egymást, bár még más fizikai paraméterek, mint például az empirikus atomi- vagy ion-rádiuszok is befolyással vannak a gömbök méretére.

Az egész molekulát körül szokás venni egy nagy gömbbel, amelyen kívül /III. tartomány/ a potenciál ismét szférikus:

$$V_o(\bar{r}_o) = \frac{1}{4\pi} \iint V(\bar{r}) \sin \Theta_o d\Theta_o d\phi_o, \quad (2.15)$$

ahol $\bar{r}_o = \bar{r} - \bar{R}_o$, $b_o < r_o < \infty$, ha b_o a külső gömb sugara. Az előzőekhez hasonlóan a megoldás itt is sorbfejthető:

$$\psi^o(\bar{r}_o) = \sum_L D_L^o R_L^o(\varepsilon, r_o) Y_L(\hat{r}_o), \quad (2.16)$$

ahol R_L^o a (2.13) -mal analóg radiális egyenlet megoldása. Lokalizált elektronállapotok esetén a függvénynek a molekulától nagy távolságban exponenciálisan kell csökkenie, ezért a megoldás adott ε és l paraméterek mellett numerikus befelé /inward/ integrálással adódik az egyenletből.

Mivel a potenciálok a kicserélődést az X_α statisztikus kicserélődéssel közelítik, gondoskodni kell az α

α - jól hogyan függ az eredmény?

- 24 -

paraméter különböző tartománybeli értékeinek megfelelő megválasztásáról. Szokásos választás: az atomi gömbökben az atomhoz tartozó /Schwarz-féle/ érték, a közti tartományban pedig az atomi értékek súlyozott átlaga. A molekulán kívül az említettek közül valamelyik.

2.3. Az egy-elektron egyenlet megoldása az atomközi térben

A konstans potenciálu atomközi térben a Schrödinger-egyenlet a közönséges sajátértékegyenletre redukálódik:

$$(\nabla^2 + \varepsilon - V_{\text{II}}) \psi_{\text{II}}(\vec{r}) = 0. \quad (2.17)$$

A Green fgv. nem a Sch. egyenlet megoldása!

Ennek megoldása Green-függvény:

$$[\nabla^2 + \varepsilon - V_{\text{II}}] G(\vec{r}, \vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}') \quad (2.18)$$

/A Green-függvénynek a további számoláshoz szükséges kifejtéseit a Függelék 4.§-a tartalmazza/


Szorozzuk be (2.17)-et $G(\vec{r}, \vec{r}')$ -rel, (2.18)-at $\psi_{\text{II}}(\vec{r}')$ vel, a két egyenletet vonjuk ki egymásból és integráljuk az atomközi tartományra:

$$\psi_{\text{II}}(\vec{r}) = \int_{V_{\text{in}}} [G(\vec{r}, \vec{r}') \nabla'^2 \psi_{\text{II}}(\vec{r}') - \psi_{\text{II}}(\vec{r}') \nabla'^2 G(\vec{r}, \vec{r}')] d\vec{r}' \quad (2.19)$$

A jobb oldalon alkalmazva a Green-tételt, fontos kiinduló egyenlethez jutunk [4]:

$$\psi_{\text{II}}(\bar{r}) = \int_{\mathcal{F}} [\psi_{\text{II}}(\bar{r}') \frac{\partial}{\partial \tau'} G(\bar{r}, \bar{r}') - G(\bar{r}, \bar{r}') \frac{\partial}{\partial \tau'} \psi_{\text{II}}(\bar{r}')] d\Omega' \quad (2.20)$$

Integrálni az atomközi tartomány felületére kell, ami a külső gömb és atomi gömbök felületeiből áll, megfelelő irányítással. /2.3. ábra/.



2.3. ábra

A (2.21) egyenlet integrálási felületei

Ennek alapján (2.20) így írható:

$$\begin{aligned} \psi_{\text{II}}(\bar{r}) = & \sum_P \int_{\mathcal{F}_P} [G(\bar{r}_P, \bar{r}_P') \frac{\partial}{\partial \tau_P'} \psi_{\text{II}}(\bar{r}') - \\ & - \psi_{\text{II}}(\bar{r}') \frac{\partial}{\partial \tau_P'} G(\bar{r}_P, \bar{r}_P')] d\Omega_P' - \\ & - \int_{\mathcal{F}_0} [G(\bar{r}_0, \bar{r}_0') \frac{\partial}{\partial \tau_0'} \psi_{\text{II}}(\bar{r}') - \psi_{\text{II}}(\bar{r}') \frac{\partial}{\partial \tau_0'} G(\bar{r}_0, \bar{r}_0')] d\Omega_0' \end{aligned} \quad (2.21)$$

Vezessünk még be polárkoordinátákat, akkor (2.21) ilyen alakú lesz:

$$\begin{aligned} \psi_{\text{II}}(\bar{r}) = & \sum_P b_P^2 \int_{\Omega_P} [G(\bar{r}_P, \bar{r}_P') \frac{\partial \psi_{\text{II}}(\bar{r}')}{\partial \tau_P'} - \\ & - \psi_{\text{II}}(\bar{r}') \frac{\partial G}{\partial \tau_P'}] d\Omega_P' - b_0^2 \int_{\Omega_0} [G \frac{\partial \psi_{\text{II}}}{\partial \tau_0'} - \psi_{\text{II}} \frac{\partial G}{\partial \tau_0'}] d\Omega_0, \end{aligned} \quad (2.22)$$

ahol $d\Omega = \sin\Theta d\Theta d\Phi$.

Megkivánjuk, hogy a hullámfüggvény és első deriváltjai folytonosan menjenek át a gömbök határán. Így (2.22) jobb oldalán ψ_{Π} helyébe ψ^p , illetve ψ^o írható. Használjuk még föl a Green-függvény (F4.1) és (F4.3) kifejtéseit, akkor (2.22) -ben a p-edik gömbön vett integrál így írható:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_p} \left[\kappa \sum_L (-1)^{l+1} i_l(\kappa b_p) k_l^{(1)}(\kappa \tau_p) Y_L(\hat{\tau}_p) Y_L^*(\hat{\tau}_p') \times \right. \\ & \times \sum_{L'} C_{L'}^p \frac{d}{d\tau_p'} R_{L'}^p(\varepsilon, \tau_p') \Big|_{b_p} Y_{L'}(\hat{\tau}_p') - \\ & - \sum_{L'} C_{L'}^p R_{L'}^p(\varepsilon, b_p) Y_{L'}(\hat{\tau}_p') \kappa \sum_L (-1)^{l+1} \frac{\partial}{\partial \tau_p'} i_l(\kappa \tau_p') \Big|_{b_p} \times \\ & \left. \times k_l^{(1)}(\kappa \tau_p) Y_L(\hat{\tau}_p) Y_L^*(\hat{\tau}_p') \right] d\Omega_p', \end{aligned}$$

ahol az $i_l, k_l^{(1)}$ Bessel-függvényeket a Függelék 1.§-a tartalmazza. A kifejtést arra az esetre írtuk föl, amikor $\varepsilon < V_{\Pi}$, és $r_p > r_p' = b_p$. Ha $\varepsilon > V_{\Pi}$ vagy $r_p' > r_p$, akkor a Green-függvény (F4.2) és (F4.4) kifejtéseit kell használni (F4.1) és (F4.3) helyett.

Vezessük még be az

$$[i_l, R_l] \equiv i_l \frac{\partial R_l}{\partial \tau} - R_l \frac{\partial i_l}{\partial \tau} \quad (2.23)$$

jelölést és használjuk ki, hogy $\int_{\Omega} Y_L^*(\hat{r}') Y_L(\hat{r}') d\Omega' = \delta_{LL'}$,

akkor ψ_{II} többcentrumu kifejtését kapjuk:

$$\psi_{II}(\vec{r}) = \sum_p \kappa b_p^2 \sum_L (-1)^{l+1} [i_l(\kappa r), R_l^p]_{l_p} C_L^p k_l^{(1)}(\kappa r_p) Y_L(\hat{r}_p) -$$

$$- \kappa b_0^2 \sum_L [k_l^{(1)}(\kappa r), R_l^0]_{l_0} D_L^0 (-1)^{l+1} i_l(\kappa r_0) Y_L(\hat{r}_0)$$

Legyen

$$A_L^p \equiv \kappa b_p^2 (-1)^{l+1} [i_l(\kappa r), R_l^p]_{l_p} C_L^p,$$

$$\text{és } B_L^0 \equiv -\kappa b_0^2 [k_l^{(1)}(\kappa r), R_l^0]_{l_0} D_L^0 \quad (2.25)$$

igy ha $\varepsilon < V_{II}$, akkor

$$\psi_{II}(\vec{r}) = \sum_L \sum_p A_L^p k_l^{(1)}(\kappa r_p) Y_L(\hat{r}_p) +$$

$$+ \sum_L B_L^0 (-1)^{l+1} i_l(\kappa r_0) Y_L(\hat{r}_0) \quad (2.26)$$

illetve ha $\varepsilon > V_{II}$, akkor

$$\psi_{II}(\vec{r}) = \sum_L \sum_p A_L^p n_l(\kappa r_p) Y_L(\hat{r}_p) +$$

$$+ \sum_L B_L^0 j_l(\kappa r_0) Y_L(\hat{r}_0) \quad 2.27$$

Az együtthatókra vonatkozó (2.25) formulában, ha $\varepsilon > V_{II}$, akkor $(-1)^{l+1} i_l$ helyett j_l , $k_l^{(1)}$ helyett pedig n_l írandó.

2.4. A megoldások illesztése: a szekuláris egyenlet

Az atomi gömbökön belüli, illetve a külső tartománybeli megoldásnak egyidejűleg kell illeszkednie a közti tartomány megoldásához. Ez a feltétel szolgáltatja a szekuláris egyenletet. Ehhez úgy jutunk, hogy a (2.21) kiinduló egyenletben a Green-függvényt az egyes atomi centrumokra kifejtjük.

Legyen a q -adik atomi gömb centruma az, amire kifejtjük a Green-függvényt. Két eset lehetséges: q vagy egybeesik a p centrummal és akkor $(-1)^{l+1} i_e \rightarrow i_e$

$$G(\bar{r}, \bar{r}') = G(\bar{r}_q, \bar{r}'_q) = \kappa \sum_L i_e(\kappa r'_q) k_e^{(1)}(\kappa r_q) Y_L(\hat{r}_q) Y_L^*(\hat{r}'_q) \quad (2.28)$$

vagy nem, és akkor

$$\begin{aligned} G(\bar{r}, \bar{r}') &= G(\bar{r}_p, \bar{r}'_p) = G(\bar{r}_q - \bar{R}_{qp}, \bar{r}'_p) = \\ &= \kappa \sum_L i_e(\kappa r'_p) k_e^{(1)}(\kappa |\bar{r}_q - \bar{R}_{qp}|) Y_L(\bar{r}_q - \bar{R}_{qp}) \times \\ &\quad \times Y_L^*(\bar{r}'_p) \end{aligned} \quad (2.29)$$

Az összes kifejtést $\varepsilon < V_{II}$ esetre végezzük el. R_{qp} a p -edik és q -adik centrum távolsága és föltettük, hogy $r_p > r'_p$ $R_{qp} > r_q$. (2.29) tovább alakítható, ha fölhasználjuk az

(F4.7 - F4.12) kifejtési összefüggéseket. A felírt esetben (F4.7)-et felhasználva:

$$\begin{aligned} k_{\ell}^{(1)}(\kappa|\hat{\tau}_q - \hat{R}_{qp}|) Y_L(\hat{\tau}_q - \hat{R}_{qp}) = \\ = 4\pi \sum_{L'} (-1)^{\ell+\ell'} \sum_{L''} I_{L''}(L, L') k_{\ell''}^{(1)}(\kappa R_{qp}) Y_{L''}(\hat{R}_{qp}) i_{\ell'}(\kappa \tau_q) Y_{L'}(\hat{\tau}_q) \end{aligned} \quad (2.30)$$

Az itt előforduló

$$I_{L''}(L, L') = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta Y_{L''}(\theta, \phi) Y_L(\theta, \phi) Y_{L'}(\theta, \phi)$$

mennyiség a Gaunt-integrál, három valós gömbfüggvény szorzatának integrálja. Ez csak akkor nem zérus, ha teljesül, hogy

$$|\ell - \ell'| \leq \ell'' \leq \ell + \ell' \quad \text{és} \quad \ell'' + \ell + \ell' = \text{páros szám.}$$

A Gaunt integrálok kiszámítása a Függelék 2.§-ában található.

Vezessük be a

$$\begin{aligned} G_{L'L}^{qp}(\varepsilon) \equiv (1 - \delta_{qp}) 4\pi (-1)^{\ell+\ell'} \times \\ \times \sum_{L''} I_{L''}(L', L) k_{\ell''}^{(1)}(\kappa R_{qp}) Y_{L''}(\hat{R}_{qp}) \end{aligned} \quad (2.31)$$

jelölést /G-mátrix/, ezzel (2.29) a következő alakban írható:

$$\begin{aligned} G(\hat{\tau}_q - \hat{R}_{qp}, \hat{\tau}_p') = \kappa \sum_L \sum_{L'} G_{L'L}^{qp}(\varepsilon) i_{\ell'}(\kappa \tau_p') \times \\ \times Y_L^*(\hat{\tau}_p') i_{\ell}(\kappa \tau_q) Y_{L'}(\hat{\tau}_q) . \end{aligned} \quad (2.32)$$

Teljesen hasonló kifejtést kell végrehajtani a (2.21) egyenlet második felére /ahol a külső gömbre kell integrálni/. Itt az

$$S_{L'L}^{q_0}(\varepsilon) \equiv 4\pi(-1)^{l'+l} \sum_{L''} I_{L''}(L', L) \times \\ \times i_{l''}(\kappa R_{q_0}) Y_{L''}(R_{q_0}^{\wedge}) \quad (2.33)$$

jelölést vezetjük be, és így

$$G(\bar{\tau}_q - \bar{R}_{q_0}, \bar{\tau}_0^{\wedge}) = \kappa \sum_L \sum_{L'} S_{L'L}^{q_0}(\varepsilon) \times \\ \times k_{l'}^{(1)}(\kappa \tau_0^{\wedge}) Y_{L'}^*(\hat{\tau}_0^{\wedge}) i_{l'}(\kappa \tau_q) Y_{L'}(\hat{\tau}_q) \quad (2.34)$$

Ha a q -dik centrum egybeesik a külső gömb centrumával, a kifejtés (2.28)-hoz hasonló, vagy ami ugyanaz, (2.34)-ben $S_{L'L}^{q_0} = \delta_{L'L}$ -t kell írni.

Irjuk be ezen sorfejtéseket a (2.21) kiinduló egyenletbe és a baloldalon is tartassuk $\bar{r}$ -t r_q -hoz. Ekkor $\psi_{II}(\bar{r} \rightarrow \bar{\tau}_q) = \psi^q(\bar{\tau}_q)$ és a q -adik atomi gömbön belüli sorfejtést be lehet írni. Fölhasználva még a

$$[i_l(\kappa b), k_l^{(1)}(\kappa b)] = \frac{1}{\kappa b^2}, \quad (2.35) \\ [j_l(\kappa b), n_l(\kappa b)] = \frac{1}{\kappa b^2}$$

Wronsky-relációkat, valamint a (2.25) együtthatók közti

összefüggést, a szekuláris egyenlet egyik felét kapjuk:

$$\sum_P \sum_{L'} \left\{ \delta_{Pq} \delta_{Ll} \frac{[R_{e'}, k_{e'}^{(u)}]_{l_p}}{[i_{e'}, R_{e'}^P]_{l_p}} - G_{L'L}^{qP} \right\} A_{L'}^P - \sum_{L'} S_{L'L}^{qo} B_{L'}^o = 0. \quad (2.36)$$

Szokás még bevezetni a

$$t_e^P = \frac{[i_e, R_e^P]_{l_p}}{[R_e^P, k_e^{(u)}]_{l_p}} \quad (2.37)$$

menyiséget, melyet t-matrixnak neveznek.

A szekuláris egyenlet másik felét úgy kapjuk, hogy a Green-függvényeket a 0-adik /külső gömb/ centrumára fejtjük ki. A (2.21) kiinduló egyenlet baloldala most $\psi^o(\vec{r}_o)$ -hoz tart, és a megfelelő sorfejtést beírva adódik, hogy

$$\sum_P \sum_{L'} S_{L'L}^{oP} A_{L'}^P - \frac{[i_e, R_e^o]_{l_o}}{[k_e^{(u)}, R_e^o]_{l_o}} B_L^o = 0 \quad (2.38)$$

ahol az S-mátrix (2.33)-mal van definiálva. Legyen

$$q_e^o(\epsilon) \equiv \frac{[k_e^{(u)}, R_e^o]_{l_o}}{[i_e, R_e]_{l_o}} \quad (2.39)$$

akkor eredményeinket így foglalhatjuk össze:

Összefoglalás:

A II. tartományban a hullámfüggvény kifejtési együtthatóira a

$$\left. \begin{aligned} \sum_P \sum_{L'} [T^{-1}(\epsilon)]_{LL'}^{qP} A_{L'}^P - \sum_{L'} S_{LL'}^{q0} B_{L'}^0 &= 0 \\ \sum_P \sum_{L'} S_{LL'}^{0P} A_{L'}^P - \sum_{L'} \delta_{LL'} [g_{\ell'}^0(\epsilon)]^{-1} B_{L'}^0 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2.40)$$

szekuláris egyenlet áll fenn, ahol, ha $\epsilon < V_{\pi}$,

$$[T^{-1}(\epsilon)]_{LL'}^{qP} \equiv \delta_{Pq} \delta_{LL'} [t_{\ell}^P]^{-1} - G_{LL'}^{qP}(\epsilon), \quad (2.41)$$

$$t_{\ell}^P \equiv \frac{[j_{\ell}, R_{\ell}^P]_{\ell_P}}{[k_{\ell}''', R_{\ell}^P]_{\ell_P}}, \quad g_{\ell}^0 \equiv \frac{[k_{\ell}''', R_{\ell}^0]_{\ell_0}}{[j_{\ell}, R_{\ell}^0]_{\ell_0}},$$

$$G_{LL'}^{qP}(\epsilon) \equiv (1 - \delta_{qP}) 4\pi (-1)^{\ell'+\ell} \sum_{L''} I_{L''}(L, L') k_{\ell''}'''(\kappa R_{qP}) Y_{L''}(\hat{R}_{qP}),$$

$$S_{LL'}^{q0} \equiv 4\pi (-1)^{\ell'+\ell} \sum_{L''} I_{L''}(L, L') i_{\ell''}(\kappa R_{q0}) Y_{L''}(\hat{R}_{q0}).$$

A molekula pálya energiákat a

$$\begin{bmatrix} [T^{-1}(\epsilon)]_{LL'}^{qP} & -S_{LL'}^{q0}(\epsilon) \\ S_{LL'}^{0P}(\epsilon) & -\delta_{LL'} [g_{\ell}^0(\epsilon)]^{-1} \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

determináns zérushelyei adják. Mivel mindenütt valós gömbfüggvényeket használunk, ezért a mátrixok valós, ön-

adjungált /tehát szimmetrikus/ mátrixok:

$$\begin{aligned} G_{LL'}^{pq} &= G_{LL'}^{pq} = G_{LL'}^{pq*}, \\ S_{LL'}^{qo} &= S_{LL'}^{oq} = S_{LL'}^{oq*}. \end{aligned} \quad (2.43)$$

A szekuláris mátrix nem-diagonális elemeit a $G_{LL'}^{pq}$ mátrix elemek adják. A G -mátrixot "struktura-konstans"-nak lehet tekinteni, mivel az energián kívül csak a molekula geometriai adataitól függ. A szekuláris mátrix diagonális elemeit a t -mátrix adja, amely a radiális függvényen keresztül a potenciáltól is függ. Előfordulhat, hogy a t -mátrix inverze szinguláris, azaz

$$[i_\ell, R_\ell^p]_{\ell_p} = 0 \quad (2.44)$$

Ha ez így van, akkor (2.25) szerint az A_L^p együtthatók zérusok, a C_L^p -k határozatlanok lesznek. Továbbá (2.44)-ből egyszerű átrendezéssel adódik, hogy a radiális függvény és a szférikus Bessel-függvény logaritmikus deriváltja folytonosan megy át a gömbhatáron. Ugyanez a jelenség figyelhető meg elektronok atomon való szóródásakor /Ramsauer-effektus [4,24]/.

Bár a mátrix elemek bonyolultnak tűnhetnek, kiszámításuk viszonylag nem nehéz. Ez annak köszönhető, hogy csak a radiális függvényektől /pl. $R_\ell^p(\varepsilon, \ell_p)$ és $k_\ell^{(n)}(k\ell_p)$ / és első deriváltjaiktól, illetve a "struktura-faktorok"-tól

/pl. $k_c^{(n)}(k R_{pq}) Y_L(R_{pq})$ / függnek. Az ε -tól és ℓ -től függő radiális Schrödinger-egyenlet megoldására a Numerov-módszert [25,26] jól lehet használni. A rekurziós formulák alapján /Függelék 1. §/ nem nehéz számítógép-programot írni az összes előforduló szférikus Bessel-függvény és gömbfüggvény kiszámítására. Itt nem szerepelnek az LCAO-MO módszerre jellemző többcentrumu integrálok. A Gaunt-integrálok is könnyen kiszámíthatók, akár közvetlenül, akár mint Clebsch-Gordon együtthatók szorzatkifejezései /Függelék 2. §/.

Az energia paraméterként minden mátrix elemben szerepel, ezért a sajátértékeket interpolációval kell megkeresni: A matrix elemeket kiszámítjuk egy energiatartomány /ahol a sajátértékeket sejtjük/ több pontjában, amíg a determináns zérushelyét kellő pontossággal meg nem közelítettük.

2.5. A szekuláris egyenlet megoldása; szimmetria

A szekuláris egyenlet megoldását olyan próbafüggvénnyel kezdhetjük, melyek egy vagy két parciális hullámból állnak. Általában azt tapasztalták [4,27], hogy atomonként /ha alacsony rendszámú/ két vagy három parciális hullám / $\ell=0,1,2$ / elegendő a legtöbb sokatomos molekulára, hogy a sajátértékeket ± 0.001 Ry-es hibával ériék el.

A megoldandó determináns méretét jelentősen csökkenteni lehet, ha figyelembe vesszük a molekula szimmetriatulajdonságait.



Bizonyítható, hogy valamely sajátértékhez tartozó sajátfüggvények az adott szimmetriacsoport egy irreducibilis előállításának bázisát alkotják. Ilyen függvényekkel az eredeti mátrix blokkos formába rendezhető át [27]. Olyan próbafüggvényeket kell tehát fölvenni, melyek az egyes irreducibilis előállítások bázisfüggvényei is egyúttal. A csoportelmélet módszereivel az adott irreducibilishez tartozó függvényeket meg lehet keresni [1,21]. Az új függvények a régiek lineáris kombinációi lesznek:

$$K_{\alpha k \ell}^{(j) P} = \sum_{m P'} C_{\alpha k \ell}^{(j) P' P'} \varphi_L^{P'} \quad (2.45)$$

ahol $K_{\alpha k \ell}^{(j) P}$ a (j) irreducibilis α -dik előfordulásából a k -dik függvény, mindig egyetlen ℓ -hez és valamely p atomtípushoz tartozik. Itt $\varphi_L^P = R_\ell^P Y_{\ell m}^P$ azaz $\psi^P = \sum_L C_L^P \varphi_L^P$, ahogy az (2.12)-ben szerepel. Fejtsük sorba ψ^P -t az új bázisfüggvények szerint:

$$\psi^P = \sum_\ell \sum_{\alpha k} \sum_{(j)} X_{\alpha k \ell}^{(j)} K_{\alpha k \ell}^{(j) P} \quad (2.46)$$

Beírva ide a K -függvények (2.45) sorfejtését az új /szimmetrizált/ és a régi sorfejtési együtthatók közti összefüggést kapjuk:

$$C_L^P = \sum_{\alpha k (j)} X_{\alpha k \ell}^{(j)} C_{\alpha k \ell}^{(j) P} \quad (2.47)$$

Mivel a szekuláris egyenlet C_L^P -re vonatkozik, (2.47)

felhasználásával megkaphatjuk a szekuláris egyenlet szimmetrizált alakját:

$$\sum_{\alpha'k' (j)'} M_{\alpha k \alpha'k'}^{(j) (j)'} X_{\alpha'k'}^{(j)'} = 0, \quad (2.48)$$

ahol $M_{\alpha k \alpha'k'}^{(j) (j)'}$, a szimmetrizált mátrix elem a régeből a (2.45)-ben szereplő kifejtési együtthatókkal való szorzással állítható elő:

$$M_{\alpha k \alpha'k'}^{(j) (j)'} = \sum_{LL' PP'} C_{\alpha k L}^{(j) P} M_{L L'}^{PP'} C_{\alpha'k' L'}^{(j)' P'} \quad (2.49)$$

A mátrixelemek közül csak az nem zérus, amelyik azonos irreducibilis egyes előfordulásainak azonos sorához tartozik [28]. Valamely két előfordulás közti mátrix elem viszont azonos, akármelyik sorral is számoltuk. Ez a mátrix nagyságának további csökkentését teszi lehetővé.

A (2.11) szuperponált-atomi potenciálokkal generált betöltött molekula-pálya energiák és függvények a kiinduló mennyiségei egy teljes self-consistent-field számolásnak. A kezdő függvényekből képzett töltéssűrűség lesz az alapja az új potenciál generálásának. Ez a potenciál szférikusan átlagolt a különböző atomi gömbökben és a molekulán kívüli tartományban. Térfogati átlagolt potenciált használunk a gömbök közti térben. /A potenciálok kiszámi-

tása: Függelék 3. §/. Ennek és a kezdő potenciálnak egy alkalmas átlaga szolgál a következő iteráció számára potenciálként. Ezzel új sorozat pályae energiát és függvényt kapunk, és az eljárást addig kell ismételni, amíg a potenciál és töltéssűrűség self-consistent field-jét elérjük.

A többszórásos X_α módszer sokatomos molekulákra és kristályokra való alkalmazásánál azt találták, hogy a legmélyebb "törzs" pályák töltéssűrűségét fixen lehet tartani /befagyasztás/ és a végső "kémiaailag eltolódott" törzs pályae energiákat újra számolják a megmaradó valencia elektronok self consistent field-jével, anélkül, hogy felbecsülhető hibát okoznának. Különb en is mivel az SCF- X_α eljárás nagyon gyors /néhány perc IBM 360/65-ön, 10 perc az R40-en/ az összes törzs elektron hozzávétele már nem volna gazdaságos.

Az SCF számolás könnyen elvégezhető spin-függő formában is /azaz különböző spinhez különböző pályák tartoznak/ ha a kicserélődés X_α közelítésének (1.11)-beli spin-függő formáját használjuk:

$$V_{x\alpha\uparrow}(\tau) = -6\alpha \left(\frac{3}{4\pi} \varrho_{\uparrow}(\tau) \right)^{1/3},$$

illetve

$$V_{x\alpha\downarrow}(\tau) = -6\alpha \left(\frac{3}{4\pi} \varrho_{\downarrow}(\tau) \right)^{1/3}.$$

Ezekben a kifejezésekben $\varrho_{\uparrow}$ és $\varrho_{\downarrow}$ a "spin-up" és "spin-down" elektronok töltéssűrűségét jelenti, külön-külön.

Az SCF többszórásos $X\alpha$ módszer spinfüggő változata különösen értékes az olyan "nyitott-héju" molekulák és kristályok elektronszerkezetének és a hozzá kapcsolódó jelenségeinek megértésében, mint például az átmeneti-fém-komplexek. [5. fejezet.]

2.6. A módszer lehetőségei és korlátai

Jól ismert, hogy az ab initio LCAO módszerek alkalmazásának komplex molekulákra és szilárd testekre a bázis mérete és a többcentrumú integrálok vagy az ekvivalens Hartree-Fock mátrixelemek száma szab határt. Az SCF többszórásos $X\alpha$ modellben nincsen bázisprobléma, mert egyszerűen numerikusan integráljuk a Schrödinger-egyenletet egy $X\alpha$ potenciálra. Nincsenek benne többcentrumú integrálok és a módszer különösen jó, mind spin-független, mint spin-függő formában a jelentős sztereokémiai bonyolultsággal rendelkező sokatomos rendszerekre. A módszer kiterjedt alkalmazását a komplex molekulákra és szilárd testekre az 5. fejezet ismerteti.

A módszerrel elsősorban az egy-elektron-energiák és függvények határozhatók meg. Bár egy SCF többszórásos $X\alpha$ egy-elektron analízis sok kémiai és fizikai tulajdonság pontos leírásához vezet /például töltéssűrűségek, mágneses és optikai tulajdonságok/, az is nagyon fontos, hogy ismerjük a teljes sok-elektron energiát. Az alapállapotú

Az ϵ -érték mi a hőse az egyelektron energiához?
Nem lehet a módszer megadása a sűrűségfüggvények a
elméletből indulva

totális energia, mint a sztereokémiai geometria függvénye, lényeges a molekuláris és kristályos kohéziós tulajdonságok /pl. kötési energia, erőkonstans/ kvantitatív megértéséhez. A többszórásos $X\alpha$ módszerrel ki lehet számítani a totális energiát [29] alapján. /Függelék 3. §/. Megemlítjük még, hogy mind a viriál mind a Hellmann-Feynman-tétel nagy pontossággal teljesül az SCF többszórásos $X\alpha$ formalizmusban [14]. Továbbá, ellentétben a Hartree-Fock-módszerrel ez a technika helyes szeparált atom limithez vezet, ha a magok közötti távolság a végtelenbe tart.

Mivel a jelen módszer a pálya függvények gyors konvergenciájú numerikus reprezentációját adja, az elméleti modell pontosságát perturbáció számítással lehet növelni, ha szükséges. Vannak esetek, amikor a muffin-tin potenciál használata nem ad kielégítő eredményt. /például alacsony szimmetriájú klaszterek, erősen irányfüggő jelenségek esetében /5. fejezet a/ pont./. Ilyen esetben a nem-muffin-tin tagokat perturbációként figyelembe véve használható lesz a módszer. Egy másik korrekciós lehetőség az átfedő szférikus potenciálok használata /5. fejezet a/ Rösch/.

*különböző atomok esetében
hogyan valósul meg
a program?*

3. A MÓDSZER SZÁMITÓGÉPRE IRT PROGRAMJAI

A többszórásos $X\alpha$ módszer alkalmazásához három, FORTRAN IV nyelven megírt program tartozik. Valamennyi program a JATE Kibernetikai Laboratórium R-40 /ESz-1040/ számítógépén működik is.

A vizsgálandó molekula vagy klaszter legfeljebb 18 atomból állhat /beleértve a külső gömböt is/, amelyek három különböző fajtaéhoz tartozhatnak. A szekuláris determináns maximálisan 11×11 -es méretű lehet. A radiális függvények sorfejtésében $l=6$ -ig lehet elmenni. A program a számításokat spin-függő és spin-független formában egyaránt el tudja végezni.

3.1. A kiinduló adatokat előállító programok

Az első program, az un. Herman-Skillman program független a másik kettőtől és másfajta számolásokra is alkalmas. A Herman-Skillman program szférikus közelítésben megoldja az atom Schrödinger-egyenletét, és eredményül a sajátértékeket, a radiális függvényeket és a self-consistent atomipotenciálokat szolgáltatja [30]. Az atomi potenciálok az $X\alpha$ kicserélődést is tartalmazzák.


Ezeket az atomi potenciálokat használja a többszórásos $X\alpha$ módszer kezdő potenciálnak. A második program, a MOLPOT, végzi el a potenciál és a töltéssűrűség szférikus és térfogati átlagolását a molekula geometriájának megfelelően [31].

Részletesen csak a harmadik programmal foglalkozunk, ez jelenti a többszórásos X_α módszert. Az eredeti, K. H. Johnson és F. C. Smith Jr. által írt változatot használjuk, D. Liberman és P. Batra módosításaiból csak az elengedhetetlenül szükségeseket vettük át.

3.2. A nem-self-consistent-field program

Ha csak a sajátértékekre van szükség, akkor a nem self-consistent field változatot célszerű használni. A programhoz szükséges potenciálok származhatnak a MOLPOT-ból. Nagy előnye, hogy a sajátértékeket nem kell előzetesen megbecsülni, hanem a program egy energiatartományban megkeresi az összes sajátértéket. Ezt a programot lehet használni SCF potenciállal a radiális függvények előállítására is.

A 3.1. ábrán lévő folyamatábrán jól látszik a program szerkezete. Az egyes szubrutinok részletes leírása a 3.2. ábrán található.




3.1. ábra. A nem-SCF program folyamatábrája


3.3. A self consistent field program

Az SCF program a szekuláris egyenlet mindenkor megoldása mellett a self consistent iterációt tartalmazza. Működése és az egyes szubrutinok szerepe további magyarázat helyett a 3.2. ábrából leolvasható.


NSTS az állapotok számát, NITER az iterációk számát, TOL a self consistent field kritériumot jelenti.



3.2. ábra



3.2. ábra /folytatás/



3.2. ábra

A többszórásos $X\alpha$ SCF program folyamat-
ábrája

4. A PROGRAMOK FUTTATÁSA: EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK

4.1. Alkalmazás a JATE R-40 /ESZ-1040/ számítógépére

A Herman-Skillman és a MOLPOT program futtatása nem jelentett különösebb nehézséget.

A többszórásos X_α módszer programjánál a fő gond a nagy méret volt. Míg a Herman-Skillman program kb. 76 K, a MOLPOT program 100 K, a SCF program a többfázisu szer- *ez mi?*
kesztés ellenére is 150 K helyet foglal el a memóriában (1 K=1024 byte). A felhasználható memóriaterület kb. 180 K, de ez járom *!* partícióba van osztva, így a program futtatása csak a partícióhatárok *!* ujrakijelölésével lehetséges. Nagyobb memóriájú gépen természetesen nincs ilyen probléma.

A futtatáshoz még egy mágnesszalag szükséges, amely *öskor*
a három program közti adatátvitelt biztosítja. Kényelmesebb és megbízhatóbb, mint kártyára lyukasztani az eredményeket.

A Herman-Skillman és a MOLPOT program körülbelül 3-3 percet kíván, míg egy SCF futás ideje 10 perc körül van. Általában azonban az eljárás nem lesz rögtön self consistent. A program nagyon érzékeny bizonyos numerikus paraméterek értékeire, ezek kicsiny változtatásával kell az eljárást konvergenssé tenni. Ilyen paraméter az új és régi potenciál, vagy töltéssűrűség aránya a következő iteráció potenciáljában vagy töltéssűrűségében. Fontos a kezdő sajátértékek minél pontosabb becslése, mert a szeku-

lárís egyenlet megoldása igen sok időt követel.


4.2. Eredmények

A programot a víz, a metán és a kénhexafluorid molekulára próbáltuk ki. Az alábbi eredmények mindegyike az eredeti futási listákon is megtekinthető.

a/ H_2O molekula

For geometria?

A 3.3. ábra szerinti elrendezésben a molekula az



3.3. ábra

A H_2O molekula atomi gömbjei

y-z-síkon helyezkedik el. A koordinátarendszer origója az oxigén gömb középpontja.

A bemenő paraméterek a következők voltak: kötéstávolság

$r_{OH} = 1.84$ a.e., az atomi gömbök sugarának aránya $\frac{r_O}{r_H} = 3.4$ a.e.,

ebből adódóan a H gömb sugara

$r_H = 0.4181818$ a.e., az O gömb sugara $r_O = 1.4218182$ a.e..

A külső gömböt a lehető legkisebbre véve /mindhárom atomi gömböt kívülről érinti/ $r_{out} = 1.9800774$ a.e., és középpontjának távolsága az O gömb középpontjától 0.5582592 a.e.

A H-O-H kötési szög 104.5° .

Az α paraméter értékei:

H	O	atomközi tér	külső tart.
0.97804	0.74367	0.86086	0.86086

A vízmolekula a C_{2v} szimmetriacsoportba tartozik. Kiinduló függvényekül a hidrogénatomnál $\ell=0$, az oxigénatomnál és a külső gömbnél az $\ell=0,1$ függvényeket vettük figyelembe. Kiredukálás után három egydimenziós irreducibilis előállítást kaptunk, melyek rendre 5-ször (A_1), 2-szer (B_1) és 3-szor (B_2) fordulnak elő. Így a legnagyobb megoldandó determináns 5×5 -ös.

A megkivánt self-consistent-field-hez /0.001 pontosság/ 8 iteráció szükséges, a gépidő 6 perc. A kapott sajátértékeket az I. táblázat tartalmazza. Befagyasztott állapot nincs.

Állapot	sajátérték /Ry/	Irodalom ⁺
b_1	- 0.7145	- 0.683
a_1	- 0.7671	- 0.737
b_2	- 0.8026	- 0.778
a_1	- 1.7957	- 1.776
a_1	-37.502	-37.498

Erdőhárszék 2. n

I. táblázat

MS-X α sajátértékek H₂O-ra

A molekula totális energiája -152.231 Ry

⁺ U.Mitzdorf, Theor. Chim.Acta 37, 129 /1975/

(Mitzdorf: - 152.230 Ry), a kinetikus energia 152.39 Ry
(Mitzdorf: 152.223 Ry), így a viriáltétel 0.001 pontossággal teljesül.

Látható, hogy mind a sajátértékek, mind a totális energia az irodalomban közölttel jól egyezik.

b/ Metán molekula

A tetraéderes T_d csoport/ szimmetriájú metán molekulában a hidrogénre $l=0$, a szénre és külső tartományra az $l=0,1$ gömbfüggvényeket vettük figyelembe. A kiredukálás után egy egydimenziós A_1 és egy háromdimenziós T_1 irreducibilis előállítást kaptunk, melyek mindegyike háromszor fordult elő.

A többszórásos $X\alpha$ paraméterek a következők voltak:

a C gömb sugara 1.485 a.e., a H gömb sugara 0.626 a.e., a külső gömb sugara 2.737 a.e., a C-H kötési távolság 2.109 a.e..

Az $X\alpha$ kicserélődési paraméter értékei:

C	H	atomközi	külső tart
0.7547	0.97804	0.93413	0.97804

A self consistent field-et 3 perc alatt 6 iterációban érte el /0.001 pontosság/, három alapállapot van, a megfelelő sajátértékek:

állapot	sajátérték /Ry/
t_1	- 0.7692
a_1	- 1.36
a_1	-19.95

II. táblázat

A CH_4 molekula MS-X α sajátértékei

A totális energia -79.999 Ry, ugyanilyen paraméterekkel kapott irodalmi érték -80.24 Ry ⁺⁺, az egyezés igen jó. A kinetikus energia 80.33 Ry, a viriál tétel 4 ezred pontosságra teljesül.

c/ SF_6 molekula

Ezzel a molekulával volt a legtöbb nehézség. Nézzük először a paramétereket.

Az SF_6 molekula oktaéderes (O_h) szimmetriájú. A fluor atomokra $\ell=0,1$ a kén atomra és a külső gömbre $\ell=0,1,2$ gömbfüggvényeket vettünk figyelembe. A kiredukálás a következő irreducibilis előállításokat adta: négyszer fordul elő az egydimenziós A_1 , ugyancsak négyszer a kétdimenziós E_g ,

⁺⁺ J. B. Danese, Int. J. Quantum Chem. 65, 209 /1972/

a háromdimenziósokból egyszer fordul elő az T_{1g} és T_{2u} , háromszor a T_{2g} , és ötször a T_{1u} . A legnagyobb szekuláris determináns így 5x5-ös.

A többszórásos X_α paraméterek:

A fluor gömb sugara 1.224 a.e, a kén gömb sugara 1.762 a.e, a külső gömb sugara 4.211 a.e, a fluor kén kötési távolság 2.987 a.e. Az X_α kicserélődési paraméterek:

S	F	atomközi tér	külső tart.
0.72426	0.73651	0.73476	0.73476

A valenciaelektronoknak alapállapotban tíz betöltött nivója van. Ha a törzselektronokat /fluor 1s, kén 1s, 2s, 2p elektronok/ az atomi értékeken befagyasztva tartjuk, a III. táblázat első oszlopa szerinti eredményeket kapjuk az alapállapotok sajátértékeire. Itt a potenciál 8 iteráció alatt teljesíti a self consistent field feltételt. /Gépidő kb. 12 perc/. A kénre és külső gömbre $l=4$ -ig mentünk el a parciális hullámokban, de ez az eredményt nem befolyásolta. Látható, hogy a totális energiára nagyon rossz értéket kapunk.

Ha az iterációs eljárásban a potenciál átlaga helyett a régi és új töltéssűrűségek átlagát vesszük, akkor már 4 iterációban self consistent field-et érünk el, az eredmény pedig láthatóan nagyon hasonló az előzőekhez /2. oszlop/.

Ha egyetlen állapotot sem fagyasztunk be, akkor a totális energia már sokkal jobb, a sajátértékek nem sokat változnak /3. oszlop/, a törzsállapotok energiái kismértékben eltolódnak. Ekkor viszont az eljárás nem lett konvergens, hanem oszcillált. A 3. oszlopbeli sajátértékek a 3. iteráció végeredményei, ahol a potenciál eltérése 0.26, de a következő iterációban sokkal nagyobb lesz.

A következő lépés volna, a törzselektronokat nem az atomi, hanem immár ezen eltolt értékeknél befagyasztani és a self consistent eljárást így elkezdni.

állapot	sajátérték (Ry)			
	1.	2.	a) 3.	4.
t_{1g}	- 0.96	- 1.01	- 0.977	- 0.890
t_{1u}	- 1.02	- 1.04	- 1.00	- 0.958
t_{2u}	- 1.03	- 1.075	- 1.04	- 0.962
e_g	- 1.08	- 1.09	- 1.044	- 1.012
t_{1g}	- 1.17	- 1.17	- 1.15	- 1.106
t_{1u}	- 1.37	- 1.37	- 1.32	- 1.330
a_{1g}	- 1.71	- 1.70	- 1.61	- 1.688
e_g	- 2.41	- 2.42	- 2.37	- 2.336
t_{1u}	- 2.47	- 2.48	- 2.43	- 2.41
a_{1g}	- 2.66	- 2.66	- 2.59	- 2.61
S 2p	-11.573 ^{b)}		-11.82	
S 2s	-15.469		-15.52	
F 1s	-48.68		-48.95	
S 1s	-176.177		-178.49	
totális energia	-1974.8	-1975.0	-1987.09	-1987.92 ^{c)}
kinetikus energia	2016.0	2016.0	2005.0	————

III. táblázat

Az SF₆ molekulára kapott eredmények

Az oszlopok jelentése:

1. Ha a törzselektronokat atomi értéken tartjuk, kénre, külső gömbre $l=4$ -ig vett gömbfüggvények.
2. Törzselektronok az atomi értéken, az iterációban töltéssűrűség átlagolást használva.
3. Nincs befagyasztott állapot.
4. J. W. D. Connolly, K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett. 10, 616 /1971/ eredményei.

Megjegyzések:

- a/ Nem self-consistent eredmény
- b/ Herman-Skillman atomi értékek.
- c/ Ez a Hartree-Fock határ a szeparált atomokra, a molekula energiájának ennél kisebbnek /abszolút értékben nagyobbak/. A Connolly-Johnson cikkben említett számításoknál a totális energia mindenütt nagyobb a H-F határnál. Hogy a többszórásos $X\alpha$ számolásnál a szerzők mekkora totális energiát kaptak, a cikkből sajnos nem derül ki.

A III. táblázatból látszik, hogy az eredmények igen jók, már ami a sajátértékeket illeti. Szerencsétlenségünkre a program tesztjének választott cikkből lényeges körülmények nem derülnek ki, pl. az, hogy a totális energiára a szerzők mit kaptak, és hogyan fagyasztották be a törzs-elektronokat.

Az SF_6 molekulára való alkalmazás kimutatta, hogy a program numerikus eljárásai, és konvergenciája mennyire bi-

zonytalan. Bár ha egyszer már konvergenssé vált, akkor az eredmények reprodukálhatók /a táblázat első és második oszlopa./ ⁺

A programmal spin függő számolásokat is lehet végezni, bár ezt még nem próbáltuk ki.

További lehetőségeket adna az, ha a számítható klaszter méretét 18 atomnál meg lehetne növelni. Ez egyedül a számítógép memória nagyságának függvénye.

Végeredményben a kitűzött célt teljesítettük. A többszórásos X_α módszer hozzáférhető és működőképes a további kutatómunkák számára.

⁺ A víz és metán esetén ilyen gondok nem jöttek elő, de ezek a molekulák voltaképpen nagyon egyszerűek, kevés és alacsony rendszámú atomot tartalmaznak.

5. A TÖBBSZÓRÁSOS $X\alpha$ MÓDSZER ALKALMAZÁSAI /CIKKBIBLIOGRÁFIA/

A cikkeket témájuk szerint az alábbi csoportokba osztottuk:

- a/ Elméleti tárgyú cikkek: a többszórásos $X\alpha$ módszer továbbfejlesztésével, kiegészítésével foglalkoznak.
- b/ Szabad atomokra és molekulákra való alkalmazás.
- c/ Nagyobb molekulák, főleg fémkomplexek részeire, gyökökre való alkalmazása.
- d/ Szilárd testekre /kristályos anyagok klaszterjei/ való alkalmazás: szennyezések, felületi jelenségek vizsgálata.
- e/ Szerves molekulák, biológiai makromolekulák részeinek vizsgálatai.

Az egyes csoportokon belül az első szerző szerinti abc sorrendben következnek a cikkek. A szerző neve utáni utalás a csoporton belüli azon cikkekre vonatkozik, ahol a szerző neve előfordul.

A csoportban egy cím tartalmazza a szerzők nevét, a megjelenés helyét és idejét, és nagyon röviden utal a cikk tárgyára.

Ha egy cikk több csoportba sorolható témájú, akkor a megfelelő helyeken mindenütt föl van sorolva.

A bibliográfia a többszórásos módszer első alkalmazásaitól /1971/ 1977. áprilisáig foglalja magába a tárgyról szóló irodalmat.



a/ A módszer továbbfejlesztése, módosítás

- Andersen, O. K., R. G. Woolley, Mol. Phys. 26, 905 /1973/;
SW $X\alpha$ és L.C.MTO kapcsolat
- Averill, F. W., T. E. H. Walker, J. T. Waber, J. Chem. Phys. 60, 2907 /1974/; molekula Rydberg-állapotok.
- Bagus, P. S., B. I. Bennett, Int. J. Quantum Chem. 9, 143 /1975/; szinglett-triplett fölhasadás
- Cartling, B. G., J. Phys. C 8, 3171 /1975/; kovalens félvezető, valenciásárá struktúra
- _____, D. M. Whitmore, Chem. Phys. Lett. 35, 51 /1975/; relativisztikus
- _____, D. M. Whitmore, Int. J. Quantum Chem. 7S 279 /1973/; non-muffin-tin korrekciók
- _____, Chem. Phys. Lett. 45, 150 /1977/; non-muffin-tin korrekciók
- Danese, J. B., J. W. Connolly, Int. J. Quantum Chem. 7S 279 /1973/, non-muffin-tin korrekciók
- _____, J. W. Connolly, J. Chem. Phys. 61, 3063 /1974/; totális energia funkcionál
- Dehmer, J. L., D. Dill, Phys. Rev. Lett., 35, 213 /1975/; shape rezonances
- De Siqueira, M. L., S. Larsson, J. W. D. Connolly, J. Phys. and Chem. Solids, 36, 1419 /1975/; Mössbauer-izomer eltolódás
- Diamond, J. B., Chem. Phys. Lett. 20, 63 /1973/; szimmetria
- Grant, I. P., M. A. Whitehead, Mol. Phys. /GB/, 32, 1181 /1976/; muffin-tin közelítésről
- Gyémánt, I. K., M. G. Benedict, Gy. Papp, B. Vasvári, Acta Phys. et. Chem. Szeged, 22, 1 /1976/; szórt állapotok
- Herman, F., A. R. Williams, K. H. Johnson, J. Chem. Phys. 61, 3508 /1974/; átfedő gömbök
- Johnson, K. H., Int. J. Quantum Chem. 7S, 347 /1973/; új alkalmazási lehetőségek
- _____, R. P. Messner, J. Vac. Sci. and Technol. 11, 236 /1974/; kemiszorpció, katalízis
- _____, lásd még F. Herman, N. Rösch, C. Y. Yang
- Kaufman, J. J., Int. J. Quantum Chem. 7S, 369 /1973/; gömbsugar választása
- Keller, J., Int. J. Quantum Chem. 9, 583 /1975/; cellular MS $X\alpha$
- Kjellander, R., Chem. Phys. Lett. 29, 270 /1974/; egyszerűsített modell.
- _____, Chem. Phys. 12, 469 /1976/; egyszerűsített modell.
- Konowalow, D.D., M. E. Rosenkrantz, Chem. Phys. Lett. 44, 321 /1976/; félempirikus α választás
- Larsson S., Chem. Phys. Lett. 32, 401 /1975/; satellite excitations
- _____, lásd még: M. L. De Siqueira

- Machado, W. V.M., L. G. Ferreira, Chem. Phys. Lett. 37, 51 /1976/; relativisztikus
- Marshall, R. F., R. J. Blint, A. B. Kunz, Phys. Rev. B 13, 3333 /1976/; H-F módszer $X\alpha$ -val
- Neto, A. A., L. G. Ferreira, Phys. Rev. B 14, 4390 /1976/; relativisztikus
- Noodleman, L. J. Chem. Phys. 64, 2343 /1976/; abszorpciós intenzitás
- Norman, J. G., J. Chem. Phys. 61, 4630 /1974/; átfedő gömb
- Quinn, C. M., N. V. Richardson, J. Phys. C 8, L 236 /1975/; adszorpció
- Rösch, N, W. G. Klemperer, K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett. 23, 149 /1973/; átfedő gömbök
- Rosicky F., P. Weinberger, F. Mark, J. Phys. B. 9, 2971 /1976/; relativisztikus
- Scheire L., P. Phariseau, Int. J. Quantum Chem. 85, 109 /1974/; általános molekulapotenciál
- , P. Phariseau, Int. J. Quantum Chem. 95, 887 /1975/; tetszőleges formájú molekula
- Schwarz, K., P. Weinberger, Chem. Phys. Lett. 27, 415 /1974/; totális energia- α kapcsolat
- Slater, J.C., Int. J. Quantum Chem. 96, 7 /1975/; összehasonlítás a Thomas-Fermi-Dirac modellel
- Tomasek, M., V. Mikolas, Czech. J. Phys. B 24, 878 /1974/; Green-függvényes tárgyalás
- , V. Mikolas, Physica, 75, 185 /1974/; MS-X származtatása más úton
- Weinstein H., Int. J. Quantum Chem. 85, 123 /1974/; analitikus potenciál
- Yang C. Y., K. H. Johnson, Int. J. Quantum Chem. 106, 159 /1976/; átfedő gömbök levágással
- , S. Rabi, Phys. Rev. A 12, 365 /1975/; relativisztikus

b/ Szabad atomok és molekulák

- Antoci S., L. Michich, G. F. Nardelli, J. Chem. Phys. 61, 1245 /1974/; H₂O egyensúlyi geometria
- Averill, F. W., T. H. Walker, J. T. Waber, J. Chem. Phys. 60, 2907 /1974/; Z $\leq$ 36 atomok, BF₃, HF molekula Rydberg állapotok
- , lásd még Waber, J. T.
- Boring M., J. H. Wood, J. W. Moskowitz, J. W. D. Connolly, J. Chem. Phys. 58, 5163 /1973/; H₂O Rydberg állapotai.
- , J. W. Moskowitz, Chem. Phys. Lett. 38, 185 /1976/; UF₆
- Case D. A., M. Karplus, Chem. Phys. Lett. 39, 33 /1976/; NO₂ hiperfinom kölcs.hat.
- Connolly, J. W. D., Int. J. Quant.Chem. 65, 201 /1972/; N₂, CO, NO, CF₄
- , K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett. 10, 616 /1971/; SF₆

- _____, J. R. Sabin, J. Chem. Phys. 56, 5529 /1972/; H_2O totális energia
- _____, H. Siegbahn, U. Gelius, C. Nordling, J. Chem. Phys. 58, 4265 /1973/ C- és N-oxidok, CF_4 , NH_3 .
- _____, lásd még Boring M., Danese J. B., Johnson K. H., Konowalow D. D., Phillips E. W., Preston H. J. T.
- Danese, J. B., Int. J. Quantum Chem. 65, 209 /1972/; CH_4
- _____, J. Chem. Phys. 61, 3071 /1974/; C_2 , N_2 potenciál
- _____, Chem. Phys. Lett. 45, 150 /1977/; H_2 , C_2 , N_2 , CO NMT korrekciók
- _____, J. W. D. Connolly, Int. J. Quantum Chem. 75, 279 /1973/; C_2 , N_2 , CH_4 NMT-korrekciók.
- _____, lásd még Preston, H. J. T.
- Edelstein N., D. Karraker, J. Chem. Phys. 63, 2269 /1975/; kommentár UF -hoz.
- Johnson K. H., Solid State Commun., 12, 313 /1973/; NiO
- _____, lásd még Connolly J. W. D., Rösch N., Tossell J. A.
- Keller J., Int. J. Quantum Chem. 95, 583 /1975/; SF_6 , H_2 , H_2 cellular MS-X α
- Konowalow D. D., M. E. Rosenkrantz, Chem. Phys. Lett. 44, 321 /1976/; Li_2 félempirikus α
- _____, P. Weinberger, J. L. Calais, J. W. D. Connolly, Chem. Phys. Lett., 16, 81 /1972/ Ne_2
- _____, P. Weinberger, Int. J. Quantum Chem. 75, 353 /1973/; N_2 , O_2 , F_2
- Maylotte D. H., R. L. St. Peters, R. P. Messmer, Chem. Phys. Lett. 38, 181 /1976/; UF_6 , UF_5
- Messner R. P., D. R. Salahub, J. Chem. Phys. 65, 779 /1976/; O_3 gerjesztett állapotok
- _____, lásd még Maylotte D. H., Salahub, D. R.,
- Mitzdorf U., Theor. Chim. Acta 37, 129 /1975/; H_2O
- Norman J. G., J. Chem. Phys. 61, 4630 /1974/; PH_3
- Phillips E. W., J. W. Connolly, S. B. Trickey, Chem. Phys. Lett. 17, 203 /1972/; XeF_6
- Preston H. J. T., J. J. Kaufman, J. Keller, J. B. Danese, J. W. D. Connolly, Chem. Phys. Lett. 37, 55 /1976/; bórhaloidok
- Richardson N. V., P. Weinberger, J. Electron Spectr. and Relat. Phenom. 6, 109 /1975/; S_8
- Rösch N., K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett 24, 179 /1974/; ferrocéne.
- _____, V. H. Smith Jr, M. H. Whangbo, J. Am. Chem. Soc. 96, 5984 /1974/; SF_6 , TaF_6 , SeF_6
- Salahub D. R., R. P. Messmer, Phys. Rev. B 14, 2592 /1976/; $(SN)_x$
- _____, R. P. Messmer, J. Chem. Phys. 64, 2039 /1976/; $(SN)_x$, NO, NO_2
- _____, lásd még Messmer R. P.

- Schwarz K., P. Weinberger, Chem. Phys. Lett. 27, 415 /1974/; Cl₂ képzési energia
- Sommer, C., R. De Groot, D. Kaplan, A. Zylbersztejn, J. Phys. Lett. 36, L 157 /1975/; VO₂ d-elektron állapotok
- Tossell J. A., J. Electron Spectr. and Relat. Phenom. 8, 1 /1976/; átmeneti- és föld-fém oxidok
- _____, D. J. Vaughan, K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett. 20, 329 /1973/; SiO₂, SiO₄⁻⁴
- Waber J. T., F. W. Averill, J. Chem. Phys. 60, 4466 /1974/; PtF₆, E 110 F₆
- _____, lásd még Averill F. W.
- Wahlgren, U., Chem. Phys. Lett. 20, 246 /1973/; H₂O₂
- Weber J., Chem. Phys. Lett. 45, 261 /1977/; OsO₄
- _____, H. Berthon, C. K. Jorgensen, Chem. Phys. Lett. 45, 1 /1977/; lantán-trifluoridok
- Woodruff S. B., M. Wolfsberg, J. Chem. Phys. 65, 3687 /1976/; LiH dipol.kvadrupol-momentum.

c/ Gyökök, fémkomplexek

- Boring M., J. H. Wood, J. W. Moskowitz, J. Chem. Phys. 63, 638 /1975/; UO₂²⁺
- Boudreaux I., T. S. La France, J. Phys. Chem. Solids 35, 897 /1974/; VO₃³⁻, CrO₄²⁻
- Cotton, F. A., R. M. Hedges, J. B. Harman, J. Am. Chem. Soc. 98, 1417 /1976/; S₂⁻, S₃⁻
- Ellis D. E., F. W. Averill, J. Chem. Phys. 60, 2856 /1974/; (FeCl₄)⁻¹
- Gubanov V. A., J. Weber, J. W. D. Connolly, J. Chem. Phys. 63, 1455 /1975/; VO₄³⁻, CrO₄³⁻
- Interrante L. V., R. P. Messmer, Chem. Phys. Lett. 26, 225 /1974/; Pt(CN)₄²⁻
- Jasinski J. P., S. I. Holt, J. Chem. Soc. Faraday Trans. II. 72, 1304 /1976/; MnO₄²⁻, MnO₃³⁻
- Johnson K. H., F. C. Smith Jr, Chem. Phys. Lett. 7, 541 /1970/; SO₄²⁻, ClO₄⁻
- _____, F. C. Smith Jr, Int. J. Quantum Chem. 5S, 249 /1971/; SO₄²⁻
- _____, F. C. Smith Jr, Chem. Phys. Lett. 10, 219 /1971/; MnO₄⁻
- _____, F. C. Smith Jr, Phys. Rev. B 5, 831 /1972/; MnO₄⁻
- _____, U. Wahlgren, Int. J. Quantum Chem. 65, 243 /1972/; MnO₄⁻, Ni(CO)₄, CnCl₄⁻
- Larsson S., J. W. D. Connolly, Chem. Phys. Lett. 20, 323 /1973/; átmeneti-fém-fluoridok
- Larsson S. E. K. Viinikka, M. L. De Siqueira, J. W. Connolly, Int. J. Quantum Chem. 85, 145 /1974/; átmeneti-fém-haloidok
- _____, J. W. D. Connolly, J. Chem. Phys. 60, 1514 /1974/; átmeneti-fém-haloidok

- Messmer R. P., Int. J. Quantum Chem. 7S, 371 /1973/;
 PtCl_4^{2-}
 _____, Chem. Phys. Lett. 18, 7 /1973/, PtCl_4^{2-}
 _____, D. R. Salahub, Int. J. Quantum Chem. 10S,
 183 /1976/; $(\text{SN})_x$, O_3
 _____, lásd még Interrante L. V.,
 Mortola A. P., J. W. Moskowitz, N. Rösch, Int. J. Quantum
 Chem. 85, 161 /1974/, ReCl_5^{2-}
 _____, J. W. Moskowitz, N. Rösch, C. D. Cowman, H.
 B. Gray, Chem. Phys. Lett. 32, 283 /1975/;
 ReCl_5^{2-}
 Norman J. G., J. Am. Chem. Soc. 96, 3327 /1974/; $\text{Pt}(\text{PH}_3)_2(\text{O}_2)$
 _____, H. J. Kolari, J. Am. Chem. Soc. 97, 33
 /1975/; $\text{MO}_2(\text{Cl})^{4-}$
 Onopko K. E., S. A. Titov, Sov. Phys. Solid State, 18,
 817 /1976/ vagy Fiz. Tverdogo Tela 18, 1413,
 /1976/; NiF_6^{4-}
 Preston H. J. T., J. J. Kaufman, W. S. Koski, Int. J.
 Quantum Chem. 95, 137 /1975/; bór-vegyü-
 letek
 Sink M. L., G. E. Juras, Chem. Phys. Lett. 20, 474 /1973/;
 Si , Ge hidridek
 Tossell J. A., J. Phys. and Chem. Solids 36, 1273 /1975/;
 Mg , Al , Si oxidok
 _____, Chem. Phys. 25, 303 /1976/; Cu , Zn oxidok
 _____, J. Phys. and Chem. Solids 37, 1043 /1976/;
 C , Si , Ge oxidok
 Weber, J., Chem. Phys. Lett. 40, 275 /1976/; PO_4^{2-}

d/ Szilárdtestfizikai alkalmazások

- Albuquerque E. L., B. Maffeo, H. S. Branchi, M. L. De
 Siqueira, Solid State Commun. 18, 1381
 /1976/; CoF_6^{3-} klaszter LiF -ben
 Batra I. P., C. R. Brundle, Surf. Sci. 57, 12 /1976/;
 Ni -n adszorbeált NO .
 _____, S. Ciraci, B. Ortenburger, Solid State Comm.
18, 563 /1976/; H chemisorpciója $\text{Si}(100)$
 felületen
 Brunn W., L. Fritsche, K. Hermann, Int. J. Quantum Chem.
85, 483 /1974/, H adszorpciója Cr és Mo
 felületen
 Cartling B. G., J. Phys. C. 8, 3171 /1975/; kovalens fél-
 vezető
 _____, B. Roos, U. Wahlgren, Chem. Phys. Lett. 21,
 380 /1973/; Si kristály S és Fe szennye-
 zéssel
 De Hasson, J. Th. M., Phys. Status Solidi B 78, 791 /1976/;
 Mo klaszter
 De Siqueira M. J., S. Larsson, Chem. Phys. Lett. 32, 359
 /1975/; ZnS , CdS -ban Cu , Ni , Co , Fe szenny-
 nyezések.
 _____, lásd még Albuquerque E. L., Hsi-Ling Yu,
 Oliveira L. E.

- Gubanov V. A., J. W. D. Connolly, Chem. Phys. Lett. 44, 139 /1976/; TiC_6^{20-}
- Hamera M., Phys. Status Solidi B 69, K 45 /1975/; Mn^{2+} ion ZnSe-ben
- Harris J., G. S. Pointer, Phys. Rev. Lett. 36, 151 /1976/; O kemisorpciója Al felületen
- Hemstreet L. A., Jr, Phys. Rev. B 11, 2260 /1975/; vakancia PbS kristályban
- Hsi-Ling Yu, M. J. De Siqueira, J. W. D. Connolly, Phys. Rev. B 14, 772 /1976/; szincentrumok KCl-ben
- Johnson, K. H., A. I. P. Conf. Prec. /USA/, 34, 97 /1976/; átmeneti és nemesfém klaszterek
- _____, lásd még Messmer R. P.
- Jones R. O., P. J. Jennings, G. S. Pointer, Surf. Sci. 53, 409 /1975/; Fe, Ni, C felület
- _____, lásd még Pointer G. S.
- Messmer R. P., C. W. Tucker Jr, K. H. Johnson, Surf. Sci. 42, 341 /1974/; O kemisorpciója Ni felületen.
- _____, S. K. Knudson, K. H. Johnson, J. B. Diamond, C. Y. Yang, Phys. Rev. B 13, 1396 /1976/; átmeneti-és nemesfém- klaszterek
- _____, lásd még G. D. Watkins
- Moskowitz J. M., M. Boring, J. H. Wood, J. Chem. Phys. 62, 2254 /1975/; vizben oldott elektron
- Niemczyk S. J., J. Vac. Sci. and Technol. 12, 246 /1975/; kalcogének kemisorpciója Ni felületen
- Oliveira L. E., B. Maffeo, H. S. Brandi, M. L. De Siqueira, Phys. Rev. B 13, 2848 /1976/; H alkáli-földfém fluoridokban
- Pointer G. S., P. J. Jennings, R. O. Jones, J. Phys. C 8, L199 /1975/; átmeneti fém felületek
- _____, lásd még Jones R. O.
- Paulson R. H., T. N. Rhodin, Surf. Sci. 55, 61 /1976/; halogének adszorpciója Ni felületen
- Rösch N., T. N. Rhodin, Phys. Rev. Lett. 32, 1189 /1974/; etilén kemisorpciója Ni felületen.
- _____, lásd még Schwarz K.,
- Schwarz K., N. Rösch, J. Phys. C 9, 1433 /1976/; C vakancia NbC kristályban.
- Watkins G. D., R. P. Messmer, Phys. Rev. Lett. 32, 1244 /1974/; vakancia gyémántban
- Wood R. F., T. M. Wilson, Solid State Commun. 16, 545 /1975/; F-centrum CaO- és MgO-ban

e/ Szerves molekulák

- Batra I. P., O. Robaux: Chem. Phys. Lett. 28, 259 /1974/; formaldehid
- _____, B. I. Bennett, F. Herman, Phys. Rev. B 11, 4927 /1975/; TTF, TCNQ
- _____, lásd még Herman F., Liberman D. A.

- Bennett B. I., F. Herman, Chem. Phys. Lett. 32, 334
/1975/; TTF
_____, lásd még Batra, I. P., Herman F.
Boudreaux, D. S., Mol. Phys. 32, 145 /1976/; C_2H_2 , C_4H_2 ,
 C_2H_4 , C_4H_4
Herman F., I. P. Batra, Nuovo Cimento 23B, 282 /1974/; TCNQ
_____, I. P. Batra, Phys. Rev. Lett. 33, 94 /1974/;
TCNQ
_____, W. E. Rudge, I. P. Batra, B. I. Bennett,
Int. J. Quantum Chem. 10S, 167 /1976/;
TCNQ, TTF
_____, A. R. Williams, K. H. Johnson, J. Chem. Phys.
61, 3508 /1974/; TCNQ
_____, lásd még Batra I. P., Bennett B. I., Salahub
D. R.
Johnson K. H., R. P. Messmer, Int. J. Quantum Chem. 10S,
147 /1976/; biokatalizis
_____, lásd még Herman F., Rösch N., Wahlgren U.,
Koester N. J., J. W. D. Connolly, 28th Symp. on Mol. Struct.
and Spectrosc., Columbus, Ohio, USA /1973/
p.114; piridin, benzol.
Lieberman D. A., Batra I. P., J. Chem. Phys. 59, 3723 /1973/;
karbazol, fluorenol
Rösch N., W. G. Klemperer, K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett.
23, 149 /1973/; etilén, benzol
Salahub D. R., R. P. Messmer, F. Herman, Phys. Rev. B 13,
4252 /1976/; TTF
Tang Kai A. H., J. L. Calais, Theor. Chim. Acta, 40, 231
/1975/; Etilén
Wahlgren U., K. H. Johnson, J. Chem. Phys. 56, 3715 /1972/;
 C_2H_6
Weber J., J. W. D. Connolly, Int. J. Quantum Chem. 9S, 129
/1975/; etilén, gerjesztett állapot is.

FÜGGELÉK

1. §. Szférikus Bessel-függvények

Az
$$x^2 w'' + 2xw' + [x^2 - \ell(\ell+1)]w = 0$$

differentiálegyenlet lineárisan független megoldásai

a $j_\ell(x)$ elsőfajú szférikus Bessel-függvény és az $n_\ell(x)$ másodfajú szférikus Bessel-függvény /vagy szférikus Neumann-függvény/ ill. a $h_\ell^{(1)}(x)$ és $h_\ell^{(2)}(x)$ harmadfajú szférikus Bessel-függvények /vagy első és másodfajú szférikus Hankel-függvények/.

Előállítási formulák [32]:

$$j_\ell(x) = \frac{x^\ell}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2\ell+1)} \left\{ 1 - \frac{\frac{1}{2}x^2}{1!(2\ell+3)} + \frac{(\frac{1}{2}x^2)^2}{2!(2\ell+3)(2\ell+5)} - \dots \right\}$$

$$n_\ell(x) = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2\ell-1)}{x^{\ell+1}} \left\{ 1 - \frac{\frac{1}{2}x^2}{1!(1-2\ell)} + \frac{(\frac{1}{2}x^2)^2}{2!(1-2\ell)(3-2\ell)} - \dots \right\}$$

$$h_\ell^{(1)}(x) = j_\ell(x) + i n_\ell(x)$$

$$h_\ell^{(2)}(x) = j_\ell(x) - i n_\ell(x)$$

Ha $f_\ell(x)$ valamelyik szférikus Bessel-függvény, akkor érvényes a

$$f_{\ell-1}(x) + f_{\ell+1}(x) = \frac{2\ell+1}{x} f_\ell(x)$$

rekurziós formula.

Algebrai alakjuk:

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x} ,$$

$$j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x} ,$$

$$n_0(x) = -j_{-1}(x) = -\frac{\cos x}{x} ,$$

$$n_1(x) = -j_{-2}(x) = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x} .$$

Aszimptotikus formulák:

$$\lim_{x \rightarrow 0} j_\ell(x) = \frac{x^\ell}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2\ell+1)} ,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} n_\ell(x) = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2\ell+1)}{x^{\ell+1}} ,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} j_\ell(x) = \frac{1}{x} \cos\left(x - \frac{\ell+1}{2}\pi\right) ,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} n_\ell(x) = \frac{1}{x} \sin\left(x - \frac{\ell+1}{2}\pi\right) , \quad \lim_{x \rightarrow \infty} h_\ell^{(1)}(x) = \frac{e^{-x}}{x} .$$

Az

$$x^2 w'' + 2x w' - [x^2 + \ell(\ell+1)] w = 0$$

differentiálegyenlet lineárisan független megoldásai az alábbi függvények, melyeket $\ell=0, 1$ -re algebrai alakjukban adunk meg:

Módosított szférikus Bessel-függvény:

$$i_0(x) = \frac{\sinh x}{x} ,$$

$$i_1(x) = -\frac{\sinh x}{x^2} + \frac{\cosh x}{x} ,$$

$$i^\ell i_\ell(x) = j_\ell(ix) , \quad (i = \sqrt{-1}) .$$

Módosított szférikus Neumann-függvény:

$$m_0(x) = \frac{\operatorname{ch} x}{x},$$

$$m_1(x) = \frac{\operatorname{sh} x}{x} - \frac{\operatorname{ch} x}{x^2}.$$

Módosított szférikus Hankel-függvény:

$$h_0^{(1)}(x) = \frac{e^{-x}}{x}$$

$$h_1^{(1)}(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{e^{-x}}{x}$$

A rekurziós formula azonos az előzővel.

2. §. A Gaunt-integrálok

Három gömbfüggvény szorzatintegrálja, az

$$I(l_1, l_2, l_3, m_1, m_2, m_3) \equiv \int d\Omega Y_{l_3 m_3}^* Y_{l_2 m_2} Y_{l_1 m_1}$$

Gaunt-integrál kifejezhető a Clebsch-Gordan együtthatókkal [26]:

$$I(l_1, l_2, l_3, m_1, m_2, m_3) = \left[\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l_3+1)} \right]^{1/2} C(l_1, l_2, l_3; m_1, m_2, m_3) C(l_1, l_2, l_3; 0, 0, 0).$$

A Gaunt-integrál csak akkor nem nulla, ha

$$l_1 + l_2 + l_3 = \text{páros szám és } |l_1 + l_2| \geq l_3 \geq |l_1 - l_2|.$$

A Clebsch-Gordan együtthatók előállítására jól használható a Wigner-formula [33]:

$$C(l_1, l_2, l_3; m_1, m_2, m_3) = \delta_{m_3, m_1+m_2} \left[(2l_3+1) \frac{(l_3+l_1-l_2)!(l_3-l_1+l_2)!(l_1+l_2-l_3)!(l_3+m_3)!(l_3-m_3)!}{(l_1+l_2+l_3+1)!(l_1-m_1)!(l_1+m_1)!(l_2-m_2)!(l_2+m_2)!} \right]^{1/2} \times \sum_{\nu} \frac{(-1)^{\nu+l_2+m_2}}{\nu!} \frac{(l_2+l_3+m_1-\nu)!(l_1-m_1+\nu)!}{(l_3-l_1+l_2-\nu)!(l_3+m_3-\nu)!(\nu+l_1-l_2-m_3)!},$$

ahol olyan ν egész számokra kell összegezni, hogy a nevező pozitív legyen.

Ezek a formulák a komplex gömbfüggvények szorzatára vonatkoznak. Ha valós gömbfüggvényeket használunk, akkor

$$\begin{aligned} Y(\ell_1, \ell_2, \ell_3; m_1, m_2, m_3) &= \int d\Omega Y_{\ell_3 m_3} Y_{\ell_2 m_2} Y_{\ell_1 m_1} = \\ &= \chi(m_1, m_2, m_3) I(\ell_1, \ell_2, \ell_3; |m_1|, |m_2|, |m_3|) \end{aligned}$$

ahol χ az alábbi értékeket veszi fel :

m_1	0	μ	μ	μ	$-\mu$	μ
m_2	0	$-\mu$	0	ν	$-\nu$	$-\nu$
χ	1	2	2	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\mu > 0, \nu > 0, |m_3| = |m_1| + |m_2|.$$

3. §. A totális energia és a muffin-tin potenciál kiszámítása a muffin-tin töltéssűrűségekből [29]:

A rendszer totális energiája

$$\langle E_{TOT} \rangle = \int g(1) f_1 d\tau_1 + \iint \frac{g(1)g(2)}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2 + \quad (F 3.1)$$

$$+ \frac{3}{4} \int g(1) V_{xx}(1) d\tau_1$$

ahol

$$f_1 = -\nabla_1^2 - \sum_{\alpha} \frac{2Z_{\alpha}}{|r - R_{\alpha}|}.$$

Az utolsó tag a kicserélődési energia

$$\begin{aligned} E_{\text{exch}} &= \frac{1}{2} \int (-g_\alpha) \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/3} g_\alpha^{4/3} d\tau = \\ &= \frac{3}{4} \int g(1) V_{\alpha\alpha}(1) d\tau_1, \end{aligned} \quad (\text{F } 3.2)$$

ahol

$$V_{\alpha\alpha}(1) = -6\alpha \left[\frac{3}{8\pi} g \right]^{1/3} \quad \text{a kicserélődési potenciál.} \quad (\text{F } 3.3)$$

A második tag az elektron-elektron coulomb energia

$$E_{d-d} = \iint \frac{g(1)g(2)}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2 = \frac{1}{2} \int g(1) V_c(1) d\tau_1, \quad (\text{F } 3.4)$$

ahol

$$V_c(1) = 2 \int \frac{g(2)}{r_{12}} d\tau_2 \quad \text{az elektron coulomb-potenciál.} \quad (\text{F } 3.5)$$

Az első tagban a kinetikus energia mellett van a mag-elektron energia is:

$$E_{d-n} = \int g(1) V_{en}(1) d\tau_1, \quad (\text{F } 3.6)$$

ahol

$$V_{en}(1) = - \sum_{\alpha} \frac{2Z_{\alpha}}{|\vec{r} - \vec{R}_{\alpha}|} \quad (\text{F } 3.7)$$

a mag-elektron potenciál.

Hozzá kell még adni az eddig figyelmen kívül hagyott mag-mag energiát:

$$E_{nn} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \frac{Z_{\alpha} Z_{\beta}}{|\vec{R}_{\alpha} - \vec{R}_{\beta}|} . \quad (\text{F } 3.8)$$

Maradt még a kinetikus energia:

$$T = - \sum_i \int u_i^*(1) \nabla_1^2 u_i(1) d\sigma_1 .$$

Az egy-elektron egyenletből kiindulva

$$T = \sum_i \varepsilon_i - \int g(1) V(1) d\sigma_1 \quad (\text{F } 3.9)$$


ahol $V(1)$ az összes potenciál.

Mivel a potenciál muffin-tin, (3.3), (3.5) és (3.7) mindig szétbontható a

$$V(\tau) = \sum_{\alpha} V^{\alpha}(\tau) + V^{\text{in}}(\tau) + V^{\circ}(\tau) \quad (\text{F } 3.10)$$

formában, ahol V^{α} , V° szférikus, V^{in} konstans potenciál. A számításhoz föl kell tételezni, hogy a töltéssűrűség is muffin-tin.

Ennek alapján elvégezve a szférikus és térfogati átlagolásokat, az alábbi eredmények adódnak az F 3.1. ábra jelölései szerint ($G(\tau) \equiv 4\pi\tau^2 g(\tau)$, az α index az α -dik centrumból mért mennyiségre vonatkozik, b_{α} az α -dik gömb sugara, q_{α} az α -dik gömbben lévő töltés.)



F 3.1. ábra

A potenciál kifejezések
jelöléseinek magyarázata

Elektron-elektron potenciál:

$$V_c^\alpha(r_\alpha) = \frac{2}{r_\alpha} \int_0^{r_\alpha} \bar{\sigma}_\alpha(r'_\alpha) dr'_\alpha + 2 \int_{r_\alpha}^{l_\alpha} \frac{\bar{\sigma}_\alpha(r'_\alpha)}{r'_\alpha} dr'_\alpha +$$

$$+ 2 \int_{l_0}^{\infty} \frac{\bar{\sigma}_0(r'_0)}{r'_0} dr'_0 + \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{2q_\beta}{R_{\alpha\beta}} + 4\pi g_{in} (l_0^2 - l_\alpha^2 - \frac{R_{\alpha 0}^2}{3} - \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{2}{3} \frac{l_\beta^3}{R_{\alpha\beta}}),$$

$$V_c^{in}(r) = \frac{8\pi}{N_{in}} \sum_\alpha q_\alpha \left[\frac{l_0^2}{2} - \frac{R_{\alpha 0}^2}{6} - \frac{l_\alpha^2}{2} - \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{l_\beta^3}{3R_{\alpha\beta}} \right] + 2 \int_{l_0}^{\infty} \frac{\bar{\sigma}_0(r')}{r'} dr' +$$

$$+ 4\pi g_{in} \left\{ l_0^2 - \frac{4\pi}{3N_{in}} \left[\frac{1}{5} l_0^5 - \sum_\alpha l_\alpha^3 \left(\frac{l_\alpha^2}{5} + \frac{1}{3} R_{\alpha 0}^2 \right) \right] - \right.$$

$$\left. - \frac{8\pi}{3N_{in}} \sum_\alpha l_\alpha^3 \left[\frac{l_0^2}{2} - \frac{R_{\alpha 0}^2}{6} - \frac{l_\alpha^2}{2} - \frac{1}{3} \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{l_\beta^3}{R_{\alpha\beta}} \right] \right\},$$

$$V_c^o(r) = 2 \sum_\alpha \frac{q_\alpha}{r} + \frac{2g_{in} N_{in}}{r} + \frac{2}{r} \int_{l_0}^r \bar{\sigma}_0(r') dr' + 2 \int_r^{\infty} \frac{\bar{\sigma}_0(r')}{r'} dr'.$$

A mag-elektron potenciál:

$$V_{en}^{\alpha}(\tau) = -\frac{Z_{\alpha}}{\tau_{\alpha}} - \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{Z_{\beta}}{R_{\alpha\beta}},$$

$$V_{en}^{in}(\tau) = -\sum_{\alpha} Z_{\alpha} \left[\frac{8\pi}{V_{in}} \left(\frac{b_0^2}{2} - \frac{R_{\alpha 0}^2}{6} - \frac{b_{\alpha}^2}{2} - \frac{1}{3} \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{b_{\beta}^3}{R_{\alpha\beta}} \right) \right],$$

$$V_{en}^o(\tau) = -\sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{\tau}.$$

A kicserélődési potenciál:

$$V_{exch} = \sum_{\alpha} (-6\alpha_{\alpha}) \left[\frac{3}{8\pi} \rho_{\alpha} \right]^{1/3} - 6\alpha_{in} \left[\frac{3}{8\pi} \rho_{in} \right]^{1/3} - \\ - 6\alpha_0 \left[\frac{3}{8\pi} \rho_0 \right]^{1/3}.$$

A potenciálokat szorozva a töltéssűrűséggel és integrálva az energiákat kapjuk:

Az elektron-elektron energia:

$$E_{e-e} = \frac{1}{2} \int_{b_0}^{\infty} \bar{\rho}_0(\tau') V_{00} d\tau' + \sum_{\alpha} q_{\alpha} \int_{b_0}^{\infty} \frac{\bar{\rho}_0(\tau')}{\tau'} d\tau' + \\ + q_{in} \int_{b_0}^{\infty} \frac{\bar{\rho}_0(\tau')}{\tau'} d\tau' + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \left\{ \int_0^{b_{\alpha}} \bar{\rho}_{\alpha} V_{\alpha\alpha} d\tau' + \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{2q_{\beta}q_{\alpha}}{R_{\alpha\beta}} + \right. \\ \left. + q_{\alpha} 4\pi g_{in} \left(b_0^2 - b_{\alpha}^2 - \frac{R_{\alpha 0}^2}{3} - \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{2}{3} \frac{b_{\beta}^3}{R_{\alpha\beta}} \right) \right\} + \frac{1}{2} q_{in} V_c^{in},$$

ahol

$$V_{00}(r) = \frac{2}{r} \int_{b_0}^r \delta_0(r') dr' + 2 \int_r^{\infty} \frac{\delta_0(r')}{r'} dr',$$

$$V_{\alpha\alpha}(r_\alpha) = \frac{2}{r_\alpha} \int_0^{r_\alpha} \delta_\alpha(r'_\alpha) dr'_\alpha + 2 \int_{r_\alpha}^{b_\alpha} \frac{\delta_\alpha(r'_\alpha)}{r'_\alpha} dr'_\alpha + 2 \int_{b_\alpha}^{\infty} \frac{\delta_\alpha(r)}{r} dr,$$

V_c^{in} a 3.12 -beli kifejezés.

A mag-elektron energia

$$E_{\text{en}} = -\sum_{\alpha} 2Z_{\alpha} \left\{ \int_{b_0}^{\infty} \frac{\delta_0(r)}{r} dr + \int_0^{b_\alpha} \frac{\delta_\alpha(r)}{r} dr + \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{q_{\alpha\beta}}{R_{\alpha\beta}} + \right. \\ \left. + 4\pi g_{\text{in}} \left(\frac{b_0^2}{2} - \frac{R_{\alpha 0}^2}{6} - \frac{b_\alpha^2}{2} - \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{b_\beta^3}{3R_{\alpha\beta}} \right) \right\}.$$

Ezek a kifejezések már csak egyváltozós integrálokat tartalmaznak, így kiszámításuk nem nehéz.

4. §. A Green-függvények kifejtési tételei

Valós gömbfüggvényeket használunk /Függ.2.§/

Ha κ valós:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{e^{i\kappa|\tilde{r}_2 - \tilde{r}_1|}}{|\tilde{r}_2 - \tilde{r}_1|} = \quad (\text{F 4.1})$$

$$= i\kappa \sum_L h_L^{(1)}(\kappa r_1) j_L(\kappa r_2) Y_L(\hat{r}_1) Y_L(\hat{r}_2), \quad r_1 > r_2$$

$$= i\kappa \sum_L j_L(\kappa r_1) h_L^{(1)}(\kappa r_2) Y_L(\hat{r}_1) Y_L(\hat{r}_2), \quad r_1 < r_2.$$

Ha κ imaginárius $\kappa \rightarrow i\kappa$ helyettesítést végezve (F4.1)-ben

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \frac{e^{-\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1|}}{|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1|} &= -\kappa \sum_L h_L^{(1)}(i\kappa\tau_1) j_L(i\kappa\tau_2) Y_L(\hat{\tau}_1) Y_L(\hat{\tau}_2) \\ &= \sum_L h_L^{(1)}(\kappa\tau_1) i_L(\kappa\tau_2) Y_L(\hat{\tau}_1) Y_L(\hat{\tau}_2) \quad , \quad \tau_1 > \tau_2 \\ &= \sum_L i_L(\kappa\tau_1) h_L^{(1)}(\kappa\tau_2) Y_L(\hat{\tau}_1) Y_L(\hat{\tau}_2) \quad , \quad \tau_1 < \tau_2 \end{aligned} \quad (\text{F 4.2})$$

(F4.1)-et fölhasználva adódik, hogy

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \frac{\cos \kappa|\bar{\tau}_1 - \bar{\tau}_2|}{|\bar{\tau}_1 - \bar{\tau}_2|} &= -\kappa \sum_L n_L(\kappa\tau_1) j_L(\kappa\tau_2) Y_L(\hat{\tau}_1) Y_L(\hat{\tau}_2) \quad , \quad (\text{F 4.3}) \\ &\quad \tau_1 > \tau_2 \\ &= -\kappa \sum_L j_L(\kappa\tau_1) n_L(\kappa\tau_2) Y_L(\hat{\tau}_1) Y_L(\hat{\tau}_2) \quad , \quad \tau_1 < \tau_2 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{4\pi} \frac{\sin \kappa|\bar{\tau}_1 - \bar{\tau}_2|}{|\bar{\tau}_1 - \bar{\tau}_2|} = \kappa \sum_L j_L(\kappa\tau_1) j_L(\kappa\tau_2) Y_L(\hat{\tau}_1) Y_L(\hat{\tau}_2) \quad . \quad (\text{F 4.4})$$

Az

$$e^{i\bar{\mathbf{K}}\bar{\mathbf{R}}} = \sum_L i^L j_L(\bar{\mathbf{K}}\bar{\mathbf{R}}) Y_L(\bar{\mathbf{K}}) Y_L(\bar{\mathbf{R}}) \quad (\text{F 4.5})$$

síkhullám kifejtési tétel; a

$$\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}(\vartheta, \varphi) Y_{\ell m}(\vartheta', \varphi') = \frac{2\ell+1}{4\pi} P_{\ell}(\cos \Theta) \quad (\text{F 4.6})$$

addíciós tétel, /ahol Θ a (ϑ, φ) és (ϑ', φ') irányok által bezárt szög/, valamint az (F4.1 - F4.4) kifejtési formulák segítségével igazolhatók [17] az alábbi formulák:

$$k_{\ell}^{(1)}(\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1)Y_L(\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1) = 4\pi \sum_{L'} (-1)^{\ell+\ell'} \sum_{L''} I_{L''}(L; L') \times \\ \times k_{\ell''}^{(1)}(\kappa\tau_1)Y_{L''}(\hat{\tau}_1) i_{\ell'}(\kappa\tau_2)Y_{L'}(\hat{\tau}_2), \quad \tau_1 > \tau_2; \quad (\text{F 4.7})$$

$$k_{\ell}^{(1)}(\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1)Y_L(\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1) = 4\pi \sum_{L'} (-1)^{\ell+\ell'} \sum_{L''} I_{L''}(L; L') \times \\ \times i_{\ell''}(\kappa\tau_1)Y_{L''}(\hat{\tau}_1) k_{\ell'}^{(1)}(\kappa\tau_2)Y_{L'}(\hat{\tau}_2), \quad \tau_1 < \tau_2; \quad (\text{F 4.8})$$

$$i_{\ell}(\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1)Y_L(\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1) = 4\pi \sum_{L'} (-1)^{\ell+\ell'} \sum_{L''} I_{L''}(L; L') \times \\ \times i_{\ell''}(\kappa\tau_1)Y_{L''}(\hat{\tau}_1) i_{\ell'}(\kappa\tau_2)Y_{L'}(\hat{\tau}_2); \quad (\text{F 4.9})$$

$$n_{\ell}(\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1)Y_L(\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1) = 4\pi \sum_{L'} i^{\ell'-\ell} \sum_{L''} i^{-\ell''} I_{L''}(L; L') \times \\ \times n_{\ell''}(\kappa\tau_1)Y_{L''}(\hat{\tau}_1) j_{\ell'}(\kappa\tau_2)Y_{L'}(\hat{\tau}_2), \quad \tau_1 > \tau_2; \quad (\text{F 4.10})$$

$$n_{\ell}(\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1)Y_L(\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1) = 4\pi \sum_{L'} i^{\ell'-\ell} \sum_{L''} i^{-\ell''} I_{L''}(L; L') \times \\ \times j_{\ell''}(\kappa\tau_1)Y_{L''}(\hat{\tau}_1) n_{\ell'}(\kappa\tau_2)Y_{L'}(\hat{\tau}_2), \quad \tau_1 < \tau_2; \quad (\text{F 4.11})$$

$$j_{\ell}(\kappa|\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1)Y_L(\bar{\tau}_2 - \bar{\tau}_1) = 4\pi \sum_{L'} i^{\ell'-\ell} \sum_{L''} i^{-\ell''} I_{L''}(L; L') \times \\ \times j_{\ell''}(\kappa\tau_1)Y_{L''}(\hat{\tau}_1) j_{\ell'}(\kappa\tau_2)Y_{L'}(\hat{\tau}_2). \quad (\text{F 4.12})$$

IRODALOM

- [1] Kapuy E., Török F., Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akad. Kiadó, Budapest, 1975.
- [2] G. F. Koster, J. C. Slater, Phys. Rev. 94, 1167 /1954/
- [3] J. C. Slater, J. Chem. Phys. 43, S228 /1965/
- [4] K. H. Johnson, J. Chem. Phys. 45, 3085 /1966/
- [5] K. H. Johnson, Adv. Quantum Chem. 7, 143 /1973/
- [6] K. H. Johnson, F. C. Smith Jr, "Computational Methods in Band Theory". p 377. Plenum, New York, 1971.
- [7] J. C. Slater, K. H. Johnson, Phys. Rev. B 5, 844 /1972/
- [8] J. W. D. Connolly, K. H. Johnson, Chem. Phys. Lett. 10, 616 /1971/
- [9] K. H. Johnson, F. C. Smith Jr, Phys. Rev. B 5, 831 /1972/
- [10] J. Korrington, Physica, 13, 392 /1947/
- [11] W. Kohn, N. Rostocker, Phys. Rev. 94, 1111 /1954/
- [12] J. C. Slater, Quantum Theory of Atomic Structures, vol. II. McGraw-Hill, New York, 1960.
- [13] T. A. Koopmans, Physica, 1, 104 /1933/
- [14] J. C. Slater, Quantum Theory of Molecules and Solids, vol IV. Mc Graw-Hill, New York, 1974.
- [15] Gáspár R, Acta Phys. Acad. Sci. Hung., 3, 263 /1954/
- [16] W. Kohn, L. J. Sham, Phys. Rev., 140, A 1133 /1965/
- [17] K. Schwarz, Phys. Rev. B. 5, 2466 /1972/
- [18] K. Schwarz, J. W. D. Connolly, J. Chem. Phys., 55, 4710 /1971/
- [19] I. Lindgren, Ark. Fys. 31, 59 /1966/
- [20] E. A. Kmetko, Phys. Rev. A1, 37 /1970/

- [21] J. C. Slater, Quantum Theory of Molecules and Solids, Vol.I. Mc Graw-Hill, New York, 1963.
- [22] J. M. Ziman, Principles of the Theory of Solids, Cambridge University Press, 1969.
- [23] J. B. Danese, J. W. D. Connolly, Int. J. of Quantum Chem. 7S, 279 /1973/
- [24] P. M. Morse, H. Feshbach, Methods of Theoretical Physics, Vol. II. p. 1685
Mc Graw-Hill, New York, 1953.
- [25] G. W. Pratt, Phys. Rev. 88, 1217 /1952/
- [26] D. R. Hartree, The Calculation of Atomic Structures
J. Wiley & Sons, New York, 1957
- [27] F. A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory,
J. Wiley & Sons, New York, 1964.
- [28] M. J. Petraschen, E. D. Trifonov, Anwendung der Gruppentheorie in der Quantenmechanik,
Kap.V. Akademie-Verlag, Berlin, 1969.
- [29] J. W. D. Connolly, J. R. Sabin, J. Chem. Phys. 56,
5529 /1972/
- [30] F. Herman, S. Skillman, Atomic Structure Calculations
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1963.
- [31] D. Liberman, J. P. Batra, Multiple Scattering Program
Descriptions, IBM Thomas Watson Research
Center, San José California, 1973.
- [32] Handbook of Mathematical Functions, ed. M. Abramowitz,
J. A. Stegun, Dover Publications, New York,
1972.
- [33] M. E. Rose, Elementary Theory of Angular Momentum,
J. Wiley & Sons, New York, 1957.

Ezúton mondok köszönetet Dr. Gilde Ferenc docensnek, az Elméleti Fizikai Tanszék vezetőjének, hogy a disszertáció elkészítését lehetővé tette és munkámat figyelemmel kísérte.

Köszönettel tartozom Dr. Gyémánt Iván aspiránsnak, amiért a disszertáció készítése közben mindvégig hasznos tanácsokkal látott el.

Köszönetet mondok Dr. Székely Sándor tudományos főmunkatársnak, a Kibernetikai Laboratórium vezetőjének, amiért az R-40-en akadálytalanul dolgozhattam, és köszönöm Scherer Ferenc tudományos munkatársnak a programok géprevitele közben nyújtott segítségét.

SZÁMITÓGÉPI LISTÁK

Jelmagyarázat:

A bemenő adatok:

A molekula geometriai adatai után az állapotok felsorolása következik és az állapothoz tartozó irreducibilis reprezentáció.

A kimenő adatok:

EPS: Az elért self-consistent field.

E: A sajátérték /Ry/ az illető iterációban

Q(I): Az I. centrum töltése

H: A radiális beosztás /R/ léptéke

CHANGE POINTS: A radiális beosztásban a blokkhatárok
indexe.

V: A self consistent field potenciál.

NUMBER OF CENTERS= 4 OUTER SPHERE AT CENTER 1

	ATOM	NO.	POSITION	RADIUS	EQ
1	OUTR	1	0.0	0.5583	1.9801
2	OXY	8	0.0	0.0	1.4218
3	HYD1	1	-1.4549	1.1265	0.4182
4	HYD2	1	1.4549	1.1265	0.4182

5 15 3 0 0 0 0 3 1 0 0.50000
1 2.00 -39.00000 2.00000 1 1 50 0

DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 5 DEGENERACY= 2

BASIS FUNCTION NO. 1 L= 0 NO. OF TERMS= 1
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 2 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 3 L= 0 NO. OF TERMS= 1
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 4 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 5 L= 0 NO. OF TERMS= 2
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.7071067691
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= 0.7071067691

A₁

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 4 MAX.SUBSCRIPT= 3

2 2.00 -1.90000 0.20000 1 1 50 0
3 2.00 -0.90000 0.10000 1 1 50 0
4 2.00 -0.75000 0.10000 4 1 50 0

DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 2 DEGENERACY= 2

BASIS FUNCTION NO. 1 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 1 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 2 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 1 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000

B₁

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 2

NO. OF COEFFICIENTS= 7 MAX.SUBSCRIPT= 7

5 2.00 -0.85000 0.10000 5 1 50 0

DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 3 DEGENERACY= 2

BASIS FUNCTION NO. 1 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 1 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 2 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 1 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000

BASIS FUNCTION NO. 3 L= 0 NO. OF TERMS= 2
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.7071067691
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= -0.7071067691

B₂

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 8 MAX.SUBSCRIPT= 7



ITERATION 8 EPS= 6.7232884E-03

INTERSPHERE CHARGE= 1.5643902E 00

Q(1)= 1.4525290E 00 Q(2)= 6.8882074E 00 Q(3)= 4.7435448E-02 Q(4)= 4.7435448E-02 Q(

STATE 1 OCUP= 2.00 E= -3.7502472E 01 NEXT E= -3.7474777E 01 SPIN= 1 SYMMETRY 1
Q(1)= 3.0305184E-08 Q(2)= 1.0000000E 00 Q(3)= 1.1209720E-09 Q(4)= 1.1209720E-09 Q(5)=
INTERSPHERE CHARGE= 0.0

STATE 2 OCUP= 2.00 E= -1.7957802E 00 NEXT E= -1.7859449E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1
Q(1)= 1.1522818E-01 Q(2)= 6.8457663E-01 Q(3)= 5.5277757E-03 Q(4)= 5.5277757E-03 Q(5)=
INTERSPHERE CHARGE= 1.8914032E-01

STATE 3 OCUP= 2.00 E= -7.6712418E-01 NEXT E= -7.5799507E-01 SPIN= 1 SYMMETRY 1
Q(1)= 2.0632839E-01 Q(2)= 5.8919507E-01 Q(3)= 6.4000674E-03 Q(4)= 6.4000674E-03 Q(5)=
INTERSPHERE CHARGE= 1.9167805E-01

STATE 4 OCUP= 2.00 E= -7.1450502E-01 NEXT E= -7.0511776E-01 SPIN= 1 SYMMETRY 4
Q(1)= 1.9703311E-01 Q(2)= 6.0844225E-01 Q(3)= 0.0 Q(4)= 0.0 Q(5)=
INTERSPHERE CHARGE= 1.9452572E-01

STATE 5 OCUP= 2.00 E= -8.0268586E-01 NEXT E= -7.9388928E-01 SPIN= 1 SYMMETRY 5
Q(1)= 2.0767748E-01 Q(2)= 5.6169263E-01 Q(3)= 1.1789858E-02 Q(4)= 1.1789858E-02 Q(5)=
INTERSPHERE CHARGE= 2.0685101E-01

XALPHA STATISTICAL TOTAL ENERGY= -1.5223155E 02 TOTAL KINETIC ENERGY= 1.5239369E 02

CONSTANT POTENTIAL= -0.1570927E 01

OUT

1 H= 0.0708 CHANGE POINTS 15 35 55 75 95 115

	R		V		R		V	
1	0.1752944E	01	=0.1631629E	01	0.1823770E	01	=0.1483820E	01
5	0.2036246E	01	=0.1137192E	01	0.2107072E	01	=0.1046556E	01
9	0.2319549E	01	=0.8274741E	00	0.2390374E	01	=0.7683722E	00
13	0.2602851E	01	=0.6216542E	00	0.2673676E	01	=0.5810173E	00
17	0.3027808E	01	=0.4217627E	00	0.3169461E	01	=0.3735015E	00
21	0.3594420E	01	=0.2635754E	00	0.3736073E	01	=0.2356319E	00
25	0.4161033E	01	=0.1698588E	00	0.4302686E	01	=0.1526693E	00
29	0.4727645E	01	=0.1114627E	00	0.4869298E	01	=0.1005234E	00
33	0.5294257E	01	=0.7402289E	01	0.5435910E	01	=0.6692022E	01
37	0.6144179E	01	=0.4069766E	01	0.6427487E	01	=0.3345241E	01
41	0.7277411E	01	=0.1872731E	01	0.7560719E	01	=0.1547067E	01
45	0.8410644E	01	=0.8777976E	02	0.8693952E	01	=0.7278942E	02
49	0.9543876E	01	=0.4172206E	02	0.9827184E	01	=0.3470988E	02
53	0.1067711E	02	=0.2005822E	02	0.1096042E	02	=0.1672819E	02
57	0.1237696E	02	=0.8770892E	03	0.1294358E	02	=0.4761270E	03
61	0.1464343E	02	=0.1665765E	03	0.1521005E	02	=0.1165312E	03
65	0.1690985E	02	=0.4194526E	04	0.1747644E	02	=0.3043030E	04
69	0.1917621E	02	=0.1142556E	04	0.1974280E	02	=0.8947066E	05
73	0.2144257E	02	=0.3795758E	05	0.2200916E	02	=0.3464034E	05
77	0.2484216E	02	=0.8485354E	06	0.2597537E	02	=0.5976212E	06
81	0.2937500E	02	=0.4791080E	06	0.3050821E	02	=0.4206467E	06
85	0.3390784E	02	=0.3225454E	06	0.3504105E	02	=0.3328301E	06
89	0.3844067E	02	=0.3325249E	06	0.3957388E	02	=0.3039099E	06
93	0.4297351E	02	=0.3093375E	06	0.4410672E	02	=0.2571895E	06
97	0.4977283E	02	=0.2594598E	06	0.5203923E	02	=0.2813686E	06
101	0.5883862E	02	=0.2588444E	06	0.6110507E	02	=0.1722939E	06
105	0.6790442E	02	=0.1150804E	06	0.7017087E	02	=0.2173123E	06
109	0.7697021E	02	=0.2010853E	06	0.7923666E	02	=0.1796702E	06
113	0.8603601E	02	=0.1846718E	06	0.8830246E	02	=0.1643843E	06
117	0.9963477E	02	=0.1417399E	06	0.1041677E	03	=0.1192835E	06
121	0.1177665E	03	=0.1418140E	06	0.1222994E	03	=0.1142523E	06
125	0.1358982E	03	=0.1140094E	06	0.1404311E	03	=0.1185911E	06
129	0.1540299E	03	=0.1411991E	06	0.1585623E	03	=0.8199498E	07
133	0.1721616E	03	=0.6039130E	07	0.1766945E	03	=0.4450146E	07

135 155 175 195 KPLACE= 4

R	V	R	V
0.1894595E 01	=0.1353818E 01	0.1965421E 01	=0.1239004E 01
0.2177897E 01	=0.9655561E 00	0.2248723E 01	=0.8928941E 00
0.2461200E 01	=0.7148002E 00	0.2532025E 01	=0.6660851E 00
0.2744502E 01	=0.5437485E 00	0.2886155E 01	=0.4779102E 00
0.3311114E 01	=0.3317371E 00	0.3452767E 01	=0.2953813E 00
0.3877727E 01	=0.2109908E 00	0.4019380E 01	=0.1891929E 00
0.4444339E 01	=0.1373524E 00	0.4585992E 01	=0.1236829E 00
0.5010951E 01	=0.9072047E=01	0.5152604E 01	=0.8192348E=01
0.5577563E 01	=0.6052974E=01	0.5860871E 01	=0.4959025E=01
0.6710795E 01	=0.2753524E=01	0.6994103E 01	=0.2269481E=01
0.7844028E 01	=0.1279583E=01	0.8127336E 01	=0.1059258E=01
0.8977260E 01	=0.6042887E=02	0.9260568E 01	=0.5019575E=02
0.1011049E 02	=0.2889240E=02	0.1039380E 02	=0.2406695E=02
0.1124372E 02	=0.1394697E=02	0.1181034E 02	=0.9724586E=03
0.1351020E 02	=0.3341215E=03	0.1407681E 02	=0.2350496E=03
0.1577667E 02	=0.8265236E=04	0.1634326E 02	=0.5868221E=04
0.1804303E 02	=0.2163545E=04	0.1860962E 02	=0.1594509E=04
0.2030939E 02	=0.6460285E=05	0.2087598E 02	=0.4850254E=05
0.2257574E 02	=0.2872279E=05	0.2370895E 02	=0.1740166E=05
0.2710858E 02	=0.5180566E=06	0.2824179E 02	=0.4896649E=06
0.3164142E 02	=0.4379158E=06	0.3277463E 02	=0.4121436E=06
0.3617426E 02	=0.2787460E=06	0.3730746E 02	=0.3083165E=06
0.4070709E 02	=0.2573967E=06	0.4184030E 02	=0.2218307E=06
0.4523993E 02	=0.2680196E=06	0.4750638E 02	=0.2593229E=06
0.5430573E 02	=0.2005177E=06	0.5657217E 02	=0.2157289E=06
0.6337152E 02	=0.1997678E=06	0.6563797E 02	=0.1848234E=06
0.7243732E 02	=0.2048998E=06	0.7470377E 02	=0.1591913E=06
0.8150311E 02	=0.1007153E=06	0.8376956E 02	=0.1283851E=06
0.9056891E 02	=0.1711834E=06	0.9510184E 02	=0.1418497E=06
0.1087006E 03	=0.1140613E=06	0.1132336E 03	=0.1735704E=06
0.1268323E 03	=0.1141681E=06	0.1313653E 03	=0.0705545E=07
0.1449641E 03	=0.8173157E=07	0.1494970E 03	=0.6676066E=07
0.1630958E 03	=0.6051152E=07	0.1676287E 03	=0.4461799E=07
0.1812275E 03	=0.9033829E=07	0.0	0.0

0

2 H= 0.0022 CHANGE POINTS 20 40 60 80 200 200

	R	V		R	V
1	0.2213353E=02	=0.7198758E 04	0.4426707E=02	=0.3584188E 04	
5	0.1106676E=01	=0.1415151E 04	0.1328011E=01	=0.1174085E 04	
9	0.1992017E=01	=0.7722356E 03	0.2213352E=01	=0.6913525E 03	
13	0.2377357E=01	=0.5243984E 03	0.3098692E=01	=0.4851509E 03	
17	0.3762698E=01	=0.3939883E 03	0.3984033E=01	=0.3703635E 03	
21	0.4869374E=01	=0.2973977E 03	0.5312044E=01	=0.2700723E 03	
25	0.6640047E=01	=0.2100986E 03	0.7082707E=01	=0.1951537E 03	
29	0.8410686E=01	=0.1598889E 03	0.8853346E=01	=0.1505272E 03	
33	0.1018133E 00	=0.1274372E 03	0.1062399E 00	=0.1210581E 03	
37	0.1195197E 00	=0.1048459E 03	0.1239462E 00	=0.1002418E 03	
41	0.1416528E 00	=0.8481746E 02	0.1505061E 00	=0.7852702E 02	
45	0.1770660E 00	=0.6361349E 02	0.1859193E 00	=0.5964171E 02	
49	0.2124793E 00	=0.4983151E 02	0.2213326E 00	=0.4711937E 02	
53	0.2478926E 00	=0.4022804E 02	0.2567459E 00	=0.3827264E 02	
57	0.2833058E 00	=0.3320268E 02	0.2921591E 00	=0.3173715E 02	
61	0.3275725E 00	=0.2675098E 02	0.3452793E 00	=0.2468768E 02	
65	0.3983995E 00	=0.1974780E 02	0.4161063E 00	=0.1842519E 02	
69	0.4692265E 00	=0.1515431E 02	0.4869333E 00	=0.1424990E 02	
73	0.5400535E 00	=0.1195317E 02	0.5577603E 00	=0.1130216E 02	
77	0.6108806E 00	=0.9617043E 01	0.6285873E 00	=0.9131184E 01	
81	0.6994144E 00	=0.7486100E 01	0.7348281E 00	=0.6811078E 01	
85	0.8410689E 00	=0.5221608E 01	0.8764825E 00	=0.4806381E 01	
89	0.9827234E 00	=0.3812760E 01	0.1018136E 01	=0.3549719E 01	
93	0.1124372E 01	=0.2914451E 01	0.1159783E 01	=0.2745784E 01	
97	0.1266019E 01	=0.2336170E 01	0.1301431E 01	=0.2226831E 01	
101	0.1407667E 01	=0.1962386E 01	0.1443080E 01	=0.1892036E 01	

H

3 H= 0.0044 CHANGE POINTS 20 40 200 200 200 200

	R	V		R	V
1	0.4426707E=02	=0.4521782E 03	0.8853409E=02	=0.2262720E 03	
5	0.2213352E=01	=0.9071469E 02	0.2656022E=01	=0.7564925E 02	
9	0.3984033E=01	=0.5053346E 02	0.4426703E=01	=0.4550835E 02	
13	0.5754714E=01	=0.3506720E 02	0.6197384E=01	=0.3257988E 02	
17	0.7525367E=01	=0.2687073E 02	0.7968026E=01	=0.2538962E 02	
21	0.9738678E=01	=0.2080786E 02	0.1062401E 00	=0.1908772E 02	
25	0.1328000E 00	=0.1529758E 02	0.1416534E 00	=0.1434832E 02	
29	0.1682133E 00	=0.1209606E 02	0.1770666E 00	=0.1149427E 02	
33	0.2036266E 00	=0.1000004E 02	0.2124799E 00	=0.9584124E 01	
37	0.2390398E 00	=0.8519170E 01	0.2478932E 00	=0.8214275E 01	
41	0.2833065E 00	=0.7182835E 01	0.3010133E 00	=0.6756884E 01	
45	0.3541335E 00	=0.5731089E 01	0.3718403E 00	=0.5453339E 01	
49	0.4249606E 00	=0.4757010E 01	0.4426673E 00	=0.4561524E 01	

MESH AND POTENTIAL FOR 4 SAME AS 3

200 200 200 200 KPLACE= 101

R	V	R	V
0.6640058E=02	=0.2379240E 04	0.8853409E=02	=0.1776709E 04
0.1549346E=01	=0.1001877E 04	0.1770682E=01	=0.8727083E 03
0.2434687E=01	=0.6260823E 03	0.2656022E=01	=0.5712737E 03
0.3320028E=01	=0.4507065E 03	0.3541363E=01	=0.4205723E 03
0.4205368E=01	=0.3492317E 03	0.4426703E=01	=0.3302188E 03
0.5754714E=01	=0.2469771E 03	0.6197384E=01	=0.2272069E 03
0.7525367E=01	=0.1819912E 03	0.7968026E=01	=0.1703143E 03
0.9296006E=01	=0.1420774E 03	0.9738666E=01	=0.1344150E 03
0.1106665E 00	=0.1152057E 03	0.1150931E 00	=0.1098190E 03
0.1283728E 00	=0.9596815E 02	0.1327994E 00	=0.9199167E 02
0.1593594E 00	=0.7297090E 02	0.1682127E 00	=0.6803117E 02
0.1947727E 00	=0.5605353E 02	0.2036260E 00	=0.5279767E 02
0.2301859E 00	=0.4463113E 02	0.2390392E 00	=0.4234131E 02
0.2655992E 00	=0.3645898E 02	0.2744525E 00	=0.3477309E 02
0.3010125E 00	=0.3036708E 02	0.3098658E 00	=0.2908414E 02
0.3629860E 00	=0.2285385E 02	0.3806928E 00	=0.2121635E 02
0.4338130E 00	=0.1722920E 02	0.4515198E 00	=0.1614349E 02
0.5046400E 00	=0.1342035E 02	0.5223468E 00	=0.1265717E 02
0.5754671E 00	=0.1069876E 02	0.5931738E 00	=0.1013840E 02
0.6462941E 00	=0.8677757E 01	0.6640008E 00	=0.8253981E 01
0.7702417E 00	=0.6215619E 01	0.8056553E 00	=0.5688819E 01
0.9118962E 00	=0.4436704E 01	0.9473098E 00	=0.4107060E 01
0.1053548E 01	=0.3314393E 01	0.1088960E 01	=0.3103700E 01
0.1195195E 01	=0.2594121E 01	0.1230607E 01	=0.2458120E 01
0.1336843E 01	=0.2128826E 01	0.1372254E 01	=0.2041014E 01
0.1478493E 01	=0.1829152E 01	0.1513906E 01	=0.1773005E 01

200 200 200 200 KPLACE= 49

R	V	R	V
0.1328011E=01	=0.1509659E 03	0.1770682E=01	=0.1133102E 03
0.3098692E=01	=0.6488678E 02	0.3541363E=01	=0.5681367E 02
0.4869374E=01	=0.4139603E 02	0.5312044E=01	=0.3796828E 02
0.6640047E=01	=0.3042368E 02	0.7082707E=01	=0.2853644E 02
0.8410686E=01	=0.2406396E 02	0.8853346E=01	=0.2287047E 02
0.1150934E 00	=0.1763106E 02	0.1239467E 00	=0.1638147E 02
0.1505067E 00	=0.1350997E 02	0.1593600E 00	=0.1276408E 02
0.1859199E 00	=0.1094926E 02	0.1947733E 00	=0.1045331E 02
0.2213332E 00	=0.9201101E 01	0.2301865E 00	=0.8847190E 01
0.2567465E 00	=0.7930131E 01	0.2655998E 00	=0.7664670E 01
0.3187200E 00	=0.6377569E 01	0.3364268E 00	=0.6037586E 01
0.3895470E 00	=0.5200457E 01	0.4072538E 00	=0.4969239E 01
0.4603741E 00	=0.4380875E 01	0.4780808E 00	=0.4213440E 01

/ CH₄ molekula

NUMBER OF CENTERS= 6			OUTER SPHERE AT CENTER 1				
	ATOM	NO.	POSITION			RADIUS	EQ
1	OUTR	1	0.0	0.0	0.0	2.7370	0
2	CAR3	6	0.0	0.0	0.0	1.4890	0
3	HYD1	1	1.0545	1.0545	1.4913	0.6260	0
4	HYD2	1	1.0545	-1.0545	-1.4913	0.6260	3
5	HYD3	1	-1.0545	1.0545	-1.4913	0.6260	3
6	HYD4	1	-1.0545	-1.0545	1.4913	0.6260	3

15 3 0 0 0 3 1 0 0.50000
2.00 -20.00000 1.00000 1 1 50 0

DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 3 DEGENERACY= 2
BASIS FUNCTION NO. 1 L= 0 NO. OF TERMS= 1
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000
BASIS FUNCTION NO. 2 L= 0 NO. OF TERMS= 1
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000
BASIS FUNCTION NO. 3 L= 0 NO. OF TERMS= 4
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= 0.5000000000
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= 0.5000000000
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= 0.5000000000

A₁

a₁

NO. OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 1 MAX. SUBSCRIPT= 1

2 2.00 -1.00000 0.10000 1 1 50 0
3 6.00 -1.00000 0.10000 3 1 50 0

DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 3 DEGENERACY= 0
BASIS FUNCTION NO. 1 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 1 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000
BASIS FUNCTION NO. 2 L= 1 NO. OF TERMS= 1
M= 1 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000
BASIS FUNCTION NO. 3 L= 0 NO. OF TERMS= 4
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= 0.5000000000
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= 0.5000000000
M= 0 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= 0.5000000000

T₁

t₂

NO. OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 5 MAX. SUBSCRIPT= 7

ITERATION 6 EPS= 7.2138123E-03

INTERSPHERE CHARGE= 3.4309292E 00
QC (1)= 1.2229586E 00 QC (2)= 4.0703657E 00 QC (3)= 1.6693610E-01 QC (4)= 1.6693610E-01 QC (5)= 1.6693610E-01
QC (6)= 1.6693610E-01

STATE 1 OCUP= 2.00 E= -1.9959534E 01 NEXT E= -1.9957855E 01 SPIN= 1 SYMMETRY 1
QC (1)= 0.9981265E-10 QC (2)= 9.9993476E-01 QC (3)= 1.0042993E-07 QC (4)= 1.0042993E-07 QC (5)= 1.0042993E-07
INTERSPHERE CHARGE= 1.5258789E-05 QC (6)= 1.0042993E-07

STATE 2 OCUP= 2.00 E= -1.3662682E 00 NEXT E= -1.3642502E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1
QC (1)= 9.8277926E-02 QC (2)= 3.7640685E-01 QC (3)= 1.7952647E-02 QC (4)= 1.7952647E-02 QC (5)= 1.7952647E-02
INTERSPHERE CHARGE= 4.3344496E-01 QC (6)= 1.7952647E-02

STATE 3 OCUP= 6.00 E= -7.6728693E-01 NEXT E= -7.6730883E-01 SPIN= 1 SYMMETRY 3
QC (1)= 1.7106694E-01 QC (2)= 3.1424431E-01 QC (3)= 2.1838453E-02 QC (4)= 2.1838453E-02 QC (5)= 4.1838453E-02
INTERSPHERE CHARGE= 4.2733479E-01 QC (6)= 2.1838453E-02

XALPHA STATISTICAL TOTAL ENERGY= -7.9991013E 01 TOTAL KINETIC ENERGY= 6.0339859E 01

CONSTANT POTENTIAL= -0.1362854E 01

OUT

I H# 0.1-17 CHANGE POINTS 24 44 64 84 104 124

	R	V	R	V
1	0.2319549E 01	-0.1406633E 01	0.2461200E 01	-0.1216020E 01
5	0.2886155E 01	-0.8133027E 00	0.3027808E 01	-0.7186015E 00
9	0.3452707E 01	-0.5047196E 00	0.3594420E 01	-0.4508812E 00
13	0.4019360E 01	-0.3247229E 00	0.4161033E 01	-0.2918302E 00
17	0.4585972E 01	-0.2129039E 00	0.4727645E 01	-0.1920596E 00
21	0.5152604E 01	-0.1412892E 00	0.5294257E 01	-0.1276776E 00
25	0.5860871E 01	-0.8549577E-01	0.6144177E 01	-0.7012177E-01
29	0.6994103E 01	-0.3599827E-01	0.7277411E 01	-0.3214934E-01
33	0.8127336E 01	-0.1813143E-01	0.8410644E 01	-0.1501169E-01
37	0.9260568E 01	-0.8565817E-02	0.9543876E 01	-0.7118382E-02
41	0.1039380E 02	-0.4101556E-02	0.1067711E 02	-0.3418264E-02
45	0.1181034E 02	-0.1657740E-02	0.1237696E 02	-0.1156072E-02
49	0.1407681E 02	-0.5699304E-03	0.1464343E 02	-0.2591175E-03
53	0.1634326E 02	-0.18963201E-04	0.1690985E 02	-0.6304414E-04
57	0.1860902E 02	-0.2241609E-04	0.1917621E 02	-0.1530029E-04
61	0.2087598E 02	-0.18256575E-05	0.2144257E 02	-0.6863265E-05
65	0.2370895E 02	-0.4255097E-05	0.2484216E 02	-0.5154604E-06
69	0.2824179E 02	-0.1467227E-06	0.2937500E 02	-0.1619650E-06
73	0.3277463E 02	-0.5210416E-07	0.3390784E 02	-0.2949167E-07
77	0.3730746E 02	-0.4856088E-07	0.3844067E 02	-0.5908339E-07
81	0.4184030E 02	-0.2672948E-08	0.4297351E 02	-0.1614922E-07
85	0.4750658E 02	-0.5716504E-07	0.4977283E 02	-0.5854560E-07
89	0.5657217E 02	-0.5821403E-07	0.5883862E 02	-0.1075751E-06
93	0.6563777E 02	-0.5963619E-07	0.6790442E 02	-0.1745750E-07
97	0.7470377E 02	-0.7690221E-07	0.7697021E 02	-0.4945048E-07
101	0.8376996E 02	-0.6376206E-07	0.8603601E 02	-0.7903310E-07
105	0.9510184E 02	-0.1067453E-06	0.9963477E 02	-0.1068618E-06
109	0.1132336E 03	-0.9771418E-07	0.1177665E 03	-0.7909722E-07
113	0.1313653E 03	-0.7903333E-07	0.1358932E 03	-0.4732365E-07
117	0.1494970E 03	-0.7880612E-07	0.1540299E 03	-0.9735948E-07
121	0.1676287E 03	-0.4123567E-07	0.1721616E 03	-0.4114787E-07

144 164 184 204 KPLACE= 4

R		V		R		V	
0.2602851E	01	-0.1057914E	01	0.2744502E	01	-0.9255840E	00
0.3169401E	01	-0.6369429E	00	0.33111114E	01	-0.5662448E	00
0.3736073E	01	-0.4035395E	00	0.3877727E	01	-0.5617485E	00
0.4302680E	01	-0.2625300E	00	0.4444339E	01	-0.2363796E	00
0.4869298E	01	-0.1732841E	00	0.5010951E	01	-0.1564326E	00
0.5435910E	01	-0.1154261E	00	0.5577563E	01	-0.1043956E	00
0.6027487E	01	-0.5759383E	-01	0.6710795E	01	-0.4736344E	-01
0.7530719E	01	-0.2653354E	-01	0.7844028E	01	-0.2192338E	-01
0.8693952E	01	-0.1243910E	-01	0.8977260E	01	-0.1031858E	-01
0.9827184E	01	-0.5919732E	-02	0.1011049E	02	-0.4924811E	-02
0.1096042E	02	-0.2850474E	-02	0.1124372E	02	-0.2377889E	-02
0.1294358E	02	-0.7164925E	-03	0.1351020E	02	-0.5299905E	-03
0.1521002E	02	-0.1805030E	-03	0.1577667E	02	-0.1274899E	-03
0.1747644E	02	-0.4476211E	-04	0.1804303E	02	-0.3112297E	-04
0.1974280E	02	-0.1143637E	-04	0.2030939E	02	-0.1021493E	-04
0.2200916E	02	-0.5837754E	-05	0.2257574E	02	-0.5094711E	-05
0.2597537E	02	-0.2478413E	-06	0.2710858E	02	-0.2001978E	-06
0.3050821E	02	-0.1397770E	-06	0.3164142E	02	-0.1062555E	-06
0.3504105E	02	-0.3098012E	-07	0.3617426E	02	-0.3236624E	-07
0.3957388E	02	-0.9001837E	-07	0.4070709E	02	-0.6127885E	-07
0.4410672E	02	-0.7137811E	-07	0.4523993E	02	-0.1478753E	-07
0.5203928E	02	-0.5420205E	-07	0.5430573E	02	-0.5532831E	-07
0.6110507E	02	-0.5813618E	-07	0.6337152E	02	-0.5891775E	-07
0.7017087E	02	-0.1112013E	-09	0.7243732E	02	-0.4843750E	-07
0.7923666E	02	-0.5362994E	-07	0.8150311E	02	-0.2052582E	-07
0.8830246E	02	-0.1064912E	-06	0.9056891E	02	-0.1065879E	-06
0.1041377E	03	-0.4733937E	-07	0.1087006E	03	-0.7905800E	-07
0.1222994E	03	-0.4742472E	-07	0.1268323E	03	-0.4740269E	-07
0.1404311E	03	-0.7707229E	-07	0.1449641E	03	-0.9377493E	-07
0.1585628E	03	-0.4699029E	-07	0.1630958E	03	-0.5622184E	-07
0.1766942E	03	-0.4105777E	-07	0.1812275E	03	-0.1733622E	-07

C 4 H= 0.0024 CHANGE POINTS 20 40 60 80 200 200

	R	V	R	V
1	0.2436110E-02	-0.4907503E 04	0.4872213E-02	-0.2444477E 04
5	0.1218054E-01	-0.9664543E 03	0.1461665E-01	-0.8021851E 03
9	0.2192493E-01	-0.5283396E 03	0.2436109E-01	-0.4735566E 03
13	0.3166942E-01	-0.3597578E 03	0.3410552E-01	-0.3326602E 03
17	0.4141365E-01	-0.2704961E 03	0.4384996E-01	-0.2543821E 03
21	0.5359440E-01	-0.2045930E 03	0.5346661E-01	-0.1859365E 03
25	0.7306322E-01	-0.1449558E 03	0.7795542E-01	-0.1347341E 03
29	0.9257203E-01	-0.1105629E 03	0.9744424E-01	-0.1041783E 03
33	0.1120608E 00	-0.834399E 02	0.1169330E 00	-0.8396608E 02
37	0.1315497E 00	-0.7283299E 02	0.1364219E 00	-0.6966962E 02
41	0.1559107E 00	-0.5906790E 02	0.1656551E 00	-0.5474318E 02
45	0.1948883E 00	-0.4449207E 02	0.2046327E 00	-0.4176355E 02
49	0.2338659E 00	-0.3502694E 02	0.2436103E 00	-0.3317012E 02
53	0.2728435E 00	-0.2844800E 02	0.2825879E 00	-0.2710875E 02
57	0.3118212E 00	-0.2363585E 02	0.3215656E 00	-0.2263126E 02
61	0.3605432E 00	-0.1920635E 02	0.3600320E 00	-0.1778497E 02
65	0.4384984E 00	-0.1436305E 02	0.4579872E 00	-0.1344376E 02
69	0.5164537E 00	-0.1116853E 02	0.5359425E 00	-0.1054153E 02
73	0.5944089E 00	-0.8959723E 01	0.6138977E 00	-0.8514913E 01
77	0.6723642E 00	-0.7371360E 01	0.6918530E 00	-0.7043440E 01
81	0.7698084E 00	-0.5935684E 01	0.8087861E 00	-0.5480388E 01
85	0.9257193E 00	-0.4398021E 01	0.9646971E 00	-0.4111110E 01
89	0.1081628E 01	-0.3413444E 01	0.1120605E 01	-0.3225500E 01
93	0.1237535E 01	-0.2765182E 01	0.1276511E 01	-0.2640787E 01
97	0.1393441E 01	-0.2336743E 01	0.1432418E 01	-0.2255052E 01
101	0.1549349E 01	-0.2057366E 01	0.1588326E 01	-0.2005023E 01

H 4 H= 0.0044 CHANGE POINTS 20 40 200 200 200 200

	R	V	R	V
1	0.4426707E-02	-0.4521997E 03	0.3853409E-02	-0.2262926E 03
5	0.2213352E-01	-0.9073360E 02	0.2656022E-01	-0.7566762E 02
9	0.3984033E-01	-0.5055029E 02	0.4426703E-01	-0.4552469E 02
13	0.5754714E-01	-0.3508221E 02	0.6197384E-01	-0.3259450E 02
17	0.7525307E-01	-0.2688422E 02	0.7968026E-01	-0.2540279E 02
21	0.9736678E-01	-0.2081982E 02	0.1062401E 00	-0.1909915E 02
25	0.1328000E 00	-0.1530776E 02	0.1416534E 00	-0.1435819E 02
29	0.1682133E 00	-0.1210531E 02	0.1770666E 00	-0.1150341E 02
33	0.2036266E 00	-0.1000609E 02	0.2124799E 00	-0.9593233E 01
37	0.2390398E 00	-0.8528691E 01	0.2478932E 00	-0.8224010E 01
41	0.2833065E 00	-0.7193746E 01	0.3010133E 00	-0.6768576E 01
45	0.3541335E 00	-0.5745785E 01	0.3718403E 00	-0.5469228E 01
49	0.4249606E 00	-0.4776977E 01	0.4426673E 00	-0.4582985E 01
53	0.4957876E 00	-0.4084125E 01	0.5134943E 00	-0.3940834E 01
57	0.5666146E 00	-0.3565112E 01	0.5843213E 00	-0.3455226E 01
61	0.6374416E 00	-0.3162820E 01	0.6551484E 00	-0.3076119E 01

MESH AND POTENTIAL FOR 4 SAME AS 3

MESH AND POTENTIAL FOR 5 SAME AS 3

MESH AND POTENTIAL FOR 6 SAME AS 3

200 200 200 200 KPLACE= 99

R	V	R	V
0.7308327E-02	0.1623404E 04	0.9744436E-02	0.1212828E 04
0.1705270E-01	0.6848350E 03	0.1948887E-01	0.598110E 03
0.2679720E-01	0.4287297E 03	0.2923331E-01	0.3913703E 03
0.3654163E-01	0.3091750E 03	0.3897774E-01	0.2886262E 03
0.4628607E-01	0.2399657E 03	0.4872218E-01	0.2269932E 03
0.5333382E-01	0.1701615E 03	0.5821102E-01	0.1586519E 03
0.6282705E-01	0.1257272E 03	0.6769983E-01	0.1177334E 03
0.73023164E 00	0.9338588E 02	0.771886E 00	0.9313113E 02
0.8218053E 00	0.7994830E 02	0.866775E 00	0.7624908E 02
0.91412941E 00	0.6673274E 02	0.9516630E 00	0.6399965E 02
0.101753995E 00	0.5092343E 02	0.101651439E 00	0.4752792E 02
0.112143771E 00	0.3929958E 02	0.112241215E 00	0.3706485E 02
0.122533547E 00	0.3146458E 02	0.122630991E 00	0.2989560E 02
0.132923324E 00	0.2586662E 02	0.133020768E 00	0.2471181E 02
0.143313100E 00	0.2169150E 02	0.143410544E 00	0.2081081E 02
0.153995208E 00	0.1651784E 02	0.15390096E 00	0.1538340E 02
0.164774701E 00	0.1261132E 02	0.164969649E 00	0.1185588E 02
0.175554313E 00	0.9968183E 01	0.175749201E 00	0.9442634E 01
0.186333860E 00	0.8104185E 01	0.186528754E 00	0.7724032E 01
0.197113418E 00	0.6737894E 01	0.197308306E 00	0.6452604E 01
0.208477638E 00	0.5077150E 01	0.208867416E 00	0.4718383E 01
0.211003675E 01	0.3853568E 01	0.211042651E 01	0.3621973E 01
0.221159581E 01	0.3056010E 01	0.221198558E 01	0.2903110E 01
0.231315488E 01	0.2528651E 01	0.231354465E 01	0.2427640E 01
0.241471392E 01	0.2131744E 01	0.241510371E 01	0.2116069E 01
0.251627304E 01	0.2166871E 01	0.0	0.0

200 200 200 200 KPLACE= 60

R	V	R	V
0.1328011E-01	0.1509860E 03	0.1770682E-01	0.1133297E 03
0.3098692E-01	0.6490462E 02	0.3541363E-01	0.5682098E 02
0.4859374E-01	0.4141191E 02	0.5312044E-01	0.5798373E 02
0.6640047E-01	0.3043791E 02	0.7082707E-01	0.2855031E 02
0.8410680E-01	0.2407680E 02	0.8853346E-01	0.2288300E 02
0.1150934E 00	0.1764201E 02	0.1239467E 00	0.1639200E 02
0.1505067E 00	0.1351958E 02	0.1593600E 00	0.1277348E 02
0.1859199E 00	0.1095833E 02	0.1947733E 00	0.1046235E 02
0.2213332E 00	0.9210308E 01	0.2301865E 00	0.8856537E 01
0.2567465E 00	0.7940111E 01	0.2655998E 00	0.7674929E 01
0.3187200E 00	0.6390161E 01	0.3364268E 00	0.6051183E 01
0.3895470E 00	0.5217630E 01	0.4072538E 00	0.4987775E 01
0.4603741E 00	0.4403894E 01	0.4780808E 00	0.4238075E 01
0.5312011E 00	0.3807159E 01	0.5489078E 00	0.3682188E 01
0.6020281E 00	0.3351907E 01	0.6197348E 00	0.3254602E 01
0.6728553E 00	0.2994103E 01	0.6905621E 00	0.2949557E 01

6/ SF₆ molekula

1/ Parciális hullámok a külső gömbre és kénre $\ell=4$ -ig.
Kén 1s, 2s, 2p; fluor 1s állapot befagyasztva.

NUMBER OF CENTERS= 8 OUTER SPHERE AT CENTER 1						
ATOM	NO.	POSITION			RADIUS	EQ
1	OUTR	1	0.0	0.0	0.0	4.2110 0
2	SULF	16	0.0	0.0	0.0	1.7620 0
3	FLU1	9	2.9870	0.0	0.0	1.2240 0
4	FLU2	9	-2.9870	0.0	0.0	1.2240 3
5	FLU3	9	0.0	2.9870	0.0	1.2240 3
6	FLU4	9	0.0	-2.9870	0.0	1.2240 3
7	FLU5	9	0.0	0.0	2.9870	1.2240 3
8	FLU6	9	0.0	0.0	-2.9870	1.2240 3

CONSTANT POTENTIAL= 0.1138576E 01

CORE ENERGIES READ IN

ENERGY	OCCUP
-176.1772766	2.0000000
-15.4695272	2.0000000
-11.5731268	6.0000000
-48.6807098	12.0000000

15 3 0 0 0 0 3 1 4 0.50000
2.00 -2.37000 0.20000 1 1 50 0

DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 4 DEGENERACY= 2

BASIS FUNCTION NO.	L	NO. OF TERMS	ATOM NO.	CN
1	0	1	1	1.0000000000
2	0	1	2	1.0000000000
3	0	6	3	0.4082482457
			4	0.4082482457
			5	0.4082482457
			6	0.4082482457
			7	0.4082482457
			8	0.4082482457
4	1	6	3	0.4082482457
			4	-0.4082482457
			5	0.4082482457
			6	-0.4082482457
			7	-0.4082481861
			8	0.4082481861

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 11 MAX. SUBSCRIPT= 7

2.00 -1.07000 0.10000 1 1 50 0

4.00 -2.17000 0.20000 3 1 50 0
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 4 DEGENERACY= 4
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 2 NO. OF TERMS= 2
 M= 2 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 0.8660253882
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= -0.5000000000
 BASIS FUNCTION NO. 2 L= 2 NO. OF TERMS= 2
 M= 2 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 0.8660253882
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= -0.5000000000
 BASIS FUNCTION NO. 3 L= 0 NO. OF TERMS= 6
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5773502588
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= 0.5773502588
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= -0.2886751294
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= -0.2886751294
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 7 CN= -0.2886751294
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 8 CN= -0.2886751294
 BASIS FUNCTION NO. 4 L= 1 NO. OF TERMS= 6
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5773502588
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= -0.5773502588
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= -0.2886751294
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= 0.2886751294
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 7 CN= 0.2886750698
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 8 CN= -0.2886750698

E_g

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 30 MAX. SUBSCRIPT= 25

4.00 -0.95000 0.05000 3 1 50 0
 6.00 -1.00000 0.05000 5 1 50 0
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 3 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 4 NO. OF TERMS= 2
 M= 3 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 0.3535533547
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= -0.9334143739
 BASIS FUNCTION NO. 2 L= 4 NO. OF TERMS= 2
 M= 3 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 0.3535533547
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= -0.9334143739
 BASIS FUNCTION NO. 3 L= 1 NO. OF TERMS= 4
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= -0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 7 CN= 0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 8 CN= -0.5000000000

T_{1g}

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 70 MAX. SUBSCRIPT= 124

6:00 =2.40000 0.20000 6 1 50 0
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 5 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 1 NO. OF TERMS= 1
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000
 BASIS FUNCTION NO. 2 L= 1 NO. OF TERMS= 1
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000
 BASIS FUNCTION NO. 3 L= 0 NO. OF TERMS= 2
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.7071067691
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= -0.7071067691
 BASIS FUNCTION NO. 4 L= 1 NO. OF TERMS= 2
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= 0.7071067691
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= 0.7071067691
 BASIS FUNCTION NO. 5 L= 1 NO. OF TERMS= 4
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= 0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= 0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 7 CN= 0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 8 CN= 0.5000000000

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 5

NO. OF COEFFICIENTS= 77 MAX. SUBSCRIPT= 124

6:00 =2.10000 0.20000 6 1 50 0
 6:00 =0.80000 0.10000 6 1 50 0
 6:00 =0.79000 0.10000 9 1 50 0
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 3 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 2 NO. OF TERMS= 1
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000
 BASIS FUNCTION NO. 2 L= 2 NO. OF TERMS= 1
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000
 BASIS FUNCTION NO. 3 L= 1 NO. OF TERMS= 4
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= -0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 7 CN= -0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 8 CN= 0.5000000000

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 87 MAX. SUBSCRIPT= 124

6:00 =0.88000 0.05000 10 1 50 0
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 3 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 3 NO. OF TERMS= 1
 M= 2 I= 1 ATOM NO.= 1 CN= 1.0000000000
 BASIS FUNCTION NO. 2 L= 3 NO. OF TERMS= 1
 M= 2 I= 1 ATOM NO.= 2 CN= 1.0000000000
 BASIS FUNCTION NO. 3 L= 1 NO. OF TERMS= 4
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= -0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= -0.5000000000

NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 99 MAX. SUBSCRIPT= 124

ITERATION 8 EPS= 8.0822259E-03

INTERSPHERE CHARGE= 1.2014055E 01

Q(1)= 1.6800947E 00 Q(2)= 1.3722697E 01 Q(3)= 7.0964804E 00 Q(4)= 7.0964804E 00 Q(5)= 7.0964804E 00
Q(7)= 7.0964804E 00 Q(8)= 7.0964804E 00 Q(6)= 7.0964804E 00

STATE 1 OCUP= 2.00 E= -2.6008353E 00 NEXT E= -2.6651297E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1

Q(1)= 1.0285273E-02 Q(2)= 1.7035621E-01 Q(3)= 9.3629241E-02 Q(4)= 9.3629241E-02 Q(5)= 9.3629241E-02
Q(7)= 9.3629241E-02 Q(8)= 9.3629241E-02 Q(6)= 9.3629241E-02

INTERSPHERE CHARGE= 2.5758362E-01

STATE 2 OCUP= 2.00 E= -1.7158422E 00 NEXT E= -1.7141695E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1

Q(1)= 2.2730052E-02 Q(2)= 3.6372153E-01 Q(3)= 6.9436669E-02 Q(4)= 6.9436669E-02 Q(5)= 6.9436669E-02
Q(7)= 6.9436669E-02 Q(8)= 6.9436669E-02 Q(6)= 6.9436669E-02

INTERSPHERE CHARGE= 1.9689846E-01

STATE 3 OCUP= 4.00 E= -2.4112835E 00 NEXT E= -2.4216928E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 3

Q(1)= 2.3227077E-02 Q(2)= 2.0670857E-02 Q(3)= 1.2756383E-01 Q(4)= 1.2756383E-01 Q(5)= 1.2756383E-01
Q(7)= 1.2756383E-01 Q(8)= 1.2756383E-01 Q(6)= 1.2756383E-01

INTERSPHERE CHARGE= 1.9071960E-01

STATE 4 OCUP= 4.00 E= -1.0804548E 00 NEXT E= -1.0896282E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 3

Q(1)= 4.4331536E-02 Q(2)= 7.6683939E-02 Q(3)= 1.1594248E-01 Q(4)= 1.1594248E-01 Q(5)= 1.1594248E-01
Q(7)= 1.1594248E-01 Q(8)= 1.1594248E-01 Q(6)= 1.1594248E-01

INTERSPHERE CHARGE= 1.8332958E-01

STATE 5 OCUP= 6.00 E= -9.6887749E-01 NEXT E= -9.8045295E-01 SPIN= 1 SYMMETRY 5

Q(1)= 2.7879346E-02 Q(2)= 1.4348829E-03 Q(3)= 1.2643737E-01 Q(4)= 1.2643737E-01 Q(5)= 1.2643737E-01
Q(7)= 1.2643737E-01 Q(8)= 1.2643737E-01 Q(6)= 1.2643737E-01

INTERSPHERE CHARGE= 2.1206188E-01

STATE 6 OCUP= 6.00 E= -2.4788542E 00 NEXT E= -2.4878826E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6

Q(1)= 1.3755130E-02 Q(2)= 4.6804536E-02 Q(3)= 1.1864269E-01 Q(4)= 1.1864269E-01 Q(5)= 1.1864269E-01
Q(7)= 1.1864269E-01 Q(8)= 1.1864269E-01 Q(6)= 1.1864269E-01

INTERSPHERE CHARGE= 2.2758484E-01

STATE 7 OCUP= 6.00 E= -1.3751297E 00 NEXT E= -1.3770542E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6

Q(1)= 6.7590103E-03 Q(2)= 2.3060992E-01 Q(3)= 7.5823545E-02 Q(4)= 7.5823545E-02 Q(5)= 7.5823545E-02
Q(7)= 7.5823545E-02 Q(8)= 7.5823545E-02 Q(6)= 7.5823545E-02

INTERSPHERE CHARGE= 3.0763054E-01

STATE 8 OCUP= 6.00 E= -1.0295753E 00 NEXT E= -1.0364685E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6
Q(1)= 1.1753678E=01 Q(2)= 7.1992338E=02 Q(3)= 9.2428923E=02 Q(4)= 9.2428923E=02 Q(5)= 9.2428923E=02
Q(7)= 9.2428923E=02 Q(8)= 9.2428923E=02 Q(9)= 9.2428923E=02
INTERSPHERE CHARGE= 2.5589752E=01

STATE 9 OCUP= 6.00 E= -1.1726933E 00 NEXT E= -1.1811733E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 9
Q(1)= 3.2012824E=02 Q(2)= 2.4104558E=02 Q(3)= 1.0102087E=01 Q(4)= 1.0102087E=01 Q(5)= 1.0102087E=01
Q(7)= 1.0102087E=01 Q(8)= 1.0102087E=01 Q(9)= 1.0102087E=01
INTERSPHERE CHARGE= 3.3775711E=01

STATE 10 OCUP= 6.00 E= -1.0572038E 00 NEXT E= -1.0478735E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 10
Q(1)= 2.6029121E=02 Q(2)= 3.2095548E=03 Q(3)= 1.1836851E=01 Q(4)= 1.1836851E=01 Q(5)= 1.1836851E=01
Q(7)= 1.1836851E=01 Q(8)= 1.1836851E=01 Q(9)= 1.1836851E=01
INTERSPHERE CHARGE= 2.6095050E=01

XALPHA STATISTICAL TOTAL ENERGY= -1.9748167E 03 TOTAL KINETIC ENERGY= 2.0165984E 03

CONSTANT POTENTIAL= -0.1162129E 01

OUT

1 H= 0.1417 CHANGE POINTS 14 34 54 74 94 114

	R	V	R	V
1	0.3730073E	01	0.1078817E	01
5	0.4302686E	01	0.5643090E	00
9	0.4869298E	01	0.3246982E	00
13	0.5435910E	01	0.1960670E	00
17	0.6427487E	01	0.8556575E	01
21	0.7560719E	01	0.3458595E	01
25	0.8693952E	01	0.1439752E	01
29	0.9827184E	01	0.6168950E	02
33	0.1090042E	02	0.2743925E	02
37	0.1294358E	02	0.7790334E	03
41	0.1521005E	02	0.2847542E	03
45	0.1747644E	02	0.1748808E	03
49	0.1974280E	02	0.1399901E	03
53	0.2200916E	02	0.1218960E	03
57	0.2597537E	02	0.1025412E	03
61	0.3050821E	02	0.8713672E	04
65	0.3504105E	02	0.7576130E	04
69	0.3957388E	02	0.6728660E	04
73	0.4410672E	02	0.6091804E	04
77	0.5203928E	02	0.5125196E	04
81	0.6110507E	02	0.4394389E	04
85	0.7017087E	02	0.3790774E	04
89	0.7923666E	02	0.3318803E	04
93	0.8830246E	02	0.3039287E	04
97	0.1041677E	03	0.2563618E	04
101	0.1222994E	03	0.2185257E	04
105	0.1404311E	03	0.1899344E	04
109	0.1585628E	03	0.1679579E	04
113	0.1766945E	03	0.1508136E	04
			0.3877727E	01
			0.4444339E	01
			0.5010951E	01
			0.5577563E	01
			0.6710795E	01
			0.7844028E	01
			0.8977260E	01
			0.1011049E	02
			0.1124372E	02
			0.1351020E	02
			0.1577667E	02
			0.1804303E	02
			0.2030939E	02
			0.2257574E	02
			0.2710858E	02
			0.3164142E	02
			0.3617426E	02
			0.4070709E	02
			0.4523993E	02
			0.5430573E	02
			0.6337152E	02
			0.7243732E	02
			0.8150311E	02
			0.9056891E	02
			0.1087006E	03
			0.1268323E	03
			0.1449641E	03
			0.1630958E	03
			0.1812275E	03
			0.9059624E	00
			0.4882548E	00
			0.2852858E	00
			0.1736045E	00
			0.6800818E	01
			0.2770737E	01
			0.1161708E	01
			0.5023280E	02
			0.2262652E	02
			0.5743112E	03
			0.2410783E	03
			0.1629065E	03
			0.1359840E	03
			0.1200252E	03
			0.9797188E	04
			0.8457742E	04
			0.7393648E	04
			0.6564250E	04
			0.5953573E	04
			0.4957836E	04
			0.4299929E	04
			0.3660077E	04
			0.3308542E	04
			0.2941977E	04
			0.2469032E	04
			0.2080976E	04
			0.1839014E	04
			0.1632284E	04
			0.1469731E	04

134 154 174 194 KPLACE= 4

R		V		R		V	
0.4019380E	01	=0.7678323E	00	0.4161033E	01	=0.6560064E	00
0.4585992E	01	=0.4245244E	00	0.4727645E	01	=0.3706470E	00
0.5152604E	01	=0.2512021E	00	0.5294257E	01	=0.2217563E	00
0.5860871E	01	=0.1366089E	00	0.6144179E	01	=0.1079423E	00
0.6994103E	01	=0.5416496E	=01	0.7277411E	01	=0.4323180E	=-01
0.8127336E	01	=0.2224267E	=01	0.8410644E	01	=0.1737993E	=-01
0.9260568E	01	=0.9384893E	=02	0.9543876E	01	=0.7602822E	=-02
0.1039380E	02	=0.4091170E	=02	0.1067711E	02	=0.3347147E	=-02
0.1181034E	02	=0.1552901E	=02	0.1237696E	02	=0.1085727E	=-02
0.1407681E	02	=0.4392217E	=03	0.1464343E	02	=0.5484364E	=-03
0.1634326E	02	=0.2127541E	=03	0.1690985E	02	=0.1906058E	=-03
0.1860962E	02	=0.1527871E	=03	0.1917621E	02	=0.1465320E	=-03
0.2087598E	02	=0.1306702E	=03	0.2144257E	02	=0.1264684E	=-03
0.2370895E	02	=0.1146396E	=03	0.2484216E	02	=0.1088761E	=-03
0.2824179E	02	=0.9493725E	=04	0.2937500E	02	=0.9091762E	=-04
0.3277463E	02	=0.8146653E	=04	0.3390784E	02	=0.7863106E	=-04
0.3730746E	02	=0.7183691E	=04	0.3844067E	02	=0.6943215E	=-04
0.4184030E	02	=0.6426134E	=04	0.4297351E	02	=0.6237910E	=-04
0.4750638E	02	=0.5619264E	=04	0.4977283E	02	=0.5387237E	=-04
0.5657217E	02	=0.4724892E	=04	0.5883862E	02	=0.4539498E	=-04
0.6563797E	02	=0.4155037E	=04	0.6790442E	02	=0.3897642E	=-04
0.7470377E	02	=0.3568249E	=04	0.7697021E	02	=0.3474421E	=-04
0.8376956E	02	=0.3214447E	=04	0.8603601E	02	=0.3097719E	=-04
0.9510184E	02	=0.2836225E	=04	0.9963477E	02	=0.2647024E	=-04
0.1132336E	03	=0.2364758E	=04	0.1177665E	03	=0.2279851E	=-04
0.1313653E	03	=0.1996064E	=04	0.1358982E	03	=0.1986400E	=-04
0.1494970E	03	=0.1731105E	=04	0.1540299E	03	=0.1751064E	=-04
0.1676287E	03	=0.1590901E	=04	0.1721616E	03	=0.1549518E	=-04
0.0		0.0		0.0		0.0	

2 H= 0.0018 CHANGE POINTS 20 40 60 80 100 200 200 200 200 200 KPLACE= 112

	R	V	R	V	R	V	R	V
1	0.1750739E-02	-0.1812097E 05	0.3513479E-02	-0.9018746E 04	0.5270213E-02	-0.5982453E 04	0.7026948E-02	-0.4464176E 04
5	0.8783683E-02	-0.3553149E 04	0.1054042E-01	-0.2945764E 04	0.1229715E-01	-0.2511909E 04	0.1405389E-01	-0.2186527E 04
9	0.1581062E-01	-0.1933471E 04	0.1756736E-01	-0.1731053E 04	0.1932409E-01	-0.1565469E 04	0.2108083E-01	-0.1427519E 04
13	0.2283756E-01	-0.1310828E 04	0.2459430E-01	-0.1210846E 04	0.2635103E-01	-0.1124234E 04	0.2810777E-01	-0.1048487E 04
17	0.2980450E-01	-0.9816907E 03	0.3162124E-01	-0.9223542E 03	0.3337798E-01	-0.8693015E 03	0.3513471E-01	-0.8215901E 03
21	0.3864819E-01	-0.7392820E 03	0.4216167E-01	-0.6708191E 03	0.4567514E-01	-0.6130071E 03	0.4918862E-01	-0.5635637E 03
25	0.5270210E-01	-0.5208137E 03	0.5621558E-01	-0.4835007E 03	0.5972905E-01	-0.4506624E 03	0.6324250E-01	-0.4215515E 03
29	0.6675595E-01	-0.3955764E 03	0.7026941E-01	-0.3722644E 03	0.7378286E-01	-0.3512329E 03	0.7729632E-01	-0.3321689E 03
33	0.8080977E-01	-0.3148137E 03	0.8452323E-01	-0.2989519E 03	0.8783668E-01	-0.2844028E 03	0.9135014E-01	-0.2710134E 03
37	0.9480359E-01	-0.2586538E 03	0.9837705E-01	-0.2472126E 03	0.1018905E 00	-0.2365931E 03	0.1054040E 00	-0.2267127E 03
41	0.1124309E 00	-0.2088895E 03	0.1194578E 00	-0.1932660E 03	0.1264847E 00	-0.1794721E 03	0.1335116E 00	-0.1672158E 03
45	0.1405385E 00	-0.1562643E 03	0.1475654E 00	-0.1464287E 03	0.1545923E 00	-0.1375545E 03	0.1616192E 00	-0.1295139E 03
49	0.1686462E 00	-0.1222001E 03	0.1756731E 00	-0.1155235E 03	0.1827000E 00	-0.1094079E 03	0.1897269E 00	-0.1037886E 03
53	0.1967538E 00	-0.9861043E 02	0.2037807E 00	-0.9382556E 02	0.2108076E 00	-0.8939305E 02	0.2178345E 00	-0.8527721E 02
57	0.2246614E 00	-0.8144705E 02	0.2318884E 00	-0.7787550E 02	0.2389153E 00	-0.7453874E 02	0.2459422E 00	-0.7141586E 02
61	0.2599960E 00	-0.6573979E 02	0.2740498E 00	-0.6072250E 02	0.2881036E 00	-0.5626424E 02	0.3021575E 00	-0.5228424E 02
65	0.3162113E 00	-0.4871042E 02	0.3302651E 00	-0.4550594E 02	0.3443189E 00	-0.4260695E 02	0.3583727E 00	-0.3998073E 02
69	0.3724266E 00	-0.3759445E 02	0.3864804E 00	-0.3542001E 02	0.4005342E 00	-0.3343324E 02	0.4145880E 00	-0.3161322E 02
73	0.4280419E 00	-0.2994183E 02	0.4426957E 00	-0.2840320E 02	0.4567495E 00	-0.2698370E 02	0.4708033E 00	-0.2567104E 02
77	0.4848571E 00	-0.2445461E 02	0.4939110E 00	-0.2332504E 02	0.5129648E 00	-0.2227405E 02	0.5270186E 00	-0.2129427E 02
81	0.5551264E 00	-0.1952313E 02	0.5332341E 00	-0.1796777E 02	0.6113419E 00	-0.1659340E 02	0.6394497E 00	-0.1537228E 02
85	0.6675574E 00	-0.1428211E 02	0.6956652E 00	-0.1330480E 02	0.7237729E 00	-0.1242569E 02	0.7518807E 00	-0.1163264E 02
89	0.7799885E 00	-0.1091556E 02	0.8080962E 00	-0.1026586E 02	0.8362040E 00	-0.9676127E 01	0.8643118E 00	-0.9139838E 01
93	0.8924195E 00	-0.8651237E 01	0.9205273E 00	-0.8205093E 01	0.9486350E 00	-0.7796771E 01	0.9767428E 00	-0.7422092E 01
97	0.1004350E 01	-0.7077377E 01	0.1032957E 01	-0.6759357E 01	0.1061064E 01	-0.6465196E 01	0.1089170E 01	-0.6192449E 01
101	0.1145386E 01	-0.5702894E 01	0.1201601E 01	-0.5277020E 01	0.1257816E 01	-0.4904449E 01	0.1314032E 01	-0.4577363E 01
105	0.1370247E 01	-0.4289579E 01	0.1426462E 01	-0.4036175E 01	0.1482677E 01	-0.3813092E 01	0.1538893E 01	-0.3616997E 01
109	0.1595108E 01	-0.3445033E 01	0.1651323E 01	-0.3294762E 01	0.1707539E 01	-0.3164101E 01	0.1763754E 01	-0.3051233E 01
113	0.1819969E 01	-0.2954600E 01	0.1876184E 01	-0.2872851E 01	0.1932400E 01	-0.2804802E 01	0.0	0.0

F 3 H= 0.0021 CHANGE POINTS 20 40 60 80 200 200 200 200 200 200 KPLACE= 97

	R	V	R	V	R	V	R	V
1	0.2128138E-02	-0.8421551E 04	0.4256275E-02	-0.4192320E 04	0.6384406E-02	-0.2782483E 04	0.8512538E-02	-0.2077492E 04
5	0.1064067E-01	-0.1654454E 04	0.1376880E-01	-0.1372399E 04	0.1489693E-01	-0.1170912E 04	0.1702506E-01	-0.1019785E 04
9	0.1915320E-01	-0.9022341E 03	0.2128133E-01	-0.8081907E 03	0.2340946E-01	-0.7312458E 03	0.2553759E-01	-0.6671274E 03
13	0.2766572E-01	-0.6128774E 03	0.2979385E-01	-0.5663831E 03	0.3192199E-01	-0.5260938E 03	0.3405012E-01	-0.4908484E 03
17	0.3617325E-01	-0.4597576E 03	0.3830638E-01	-0.4321294E 03	0.4043451E-01	-0.4074182E 03	0.4256264E-01	-0.3851873E 03
21	0.4681892E-01	-0.3468149E 03	0.5107519E-01	-0.3148733E 03	0.5533146E-01	-0.2878811E 03	0.5958773E-01	-0.2647800E 03
25	0.6384397E-01	-0.2447931E 03	0.6810021E-01	-0.2273365E 03	0.7235646E-01	-0.2119650E 03	0.7661271E-01	-0.1983310E 03
29	0.8080896E-01	-0.1861603E 03	0.8512521E-01	-0.1752334E 03	0.8938146E-01	-0.1653723E 03	0.9363770E-01	-0.1564315E 03
33	0.9789395E-01	-0.1482906E 03	0.1021502E 00	-0.1408492E 03	0.1064065E 00	-0.1340228E 03	0.1106627E 00	-0.1277402E 03
37	0.1149189E 00	-0.1219405E 03	0.1191752E 00	-0.1165714E 03	0.1234314E 00	-0.1115880E 03	0.1276877E 00	-0.1069512E 03
41	0.1362002E 00	-0.9858612E 02	0.1447127E 00	-0.9125151E 02	0.1532252E 00	-0.8477295E 02	0.1617377E 00	-0.7901279E 02
45	0.1702502E 00	-0.7386119E 02	0.1787627E 00	-0.6922932E 02	0.1872752E 00	-0.6504480E 02	0.1957877E 00	-0.6124792E 02
49	0.2043002E 00	-0.5778917E 02	0.2128127E 00	-0.5462711E 02	0.2213252E 00	-0.5172676E 02	0.2268377E 00	-0.4905852E 02
53	0.2383502E 00	-0.4659703E 02	0.2468626E 00	-0.4432060E 02	0.2553751E 00	-0.4221040E 02	0.2638876E 00	-0.4025014E 02
57	0.2724001E 00	-0.3842551E 02	0.2809126E 00	-0.3672398E 02	0.2894251E 00	-0.3513449E 02	0.2979376E 00	-0.3364728E 02
61	0.3149626E 00	-0.3094550E 02	0.3319876E 00	-0.2855899E 02	0.3490126E 00	-0.2643942E 02	0.3660376E 00	-0.2454720E 02
65	0.3830626E 00	-0.2284970E 02	0.4000876E 00	-0.2131992E 02	0.4171126E 00	-0.1993536E 02	0.4341376E 00	-0.1867732E 02
69	0.4511626E 00	-0.1753018E 02	0.4681876E 00	-0.1648071E 02	0.4852126E 00	-0.1551783E 02	0.5022376E 00	-0.1463202E 02
73	0.5192626E 00	-0.1381521E 02	0.5362875E 00	-0.1306042E 02	0.5533125E 00	-0.1236161E 02	0.5703375E 00	-0.1171350E 02
77	0.5873625E 00	-0.1111146E 02	0.6043875E 00	-0.1055144E 02	0.6214125E 00	-0.1002980E 02	0.6384375E 00	-0.9543327E 01
81	0.6724876E 00	-0.8664724E 01	0.7065377E 00	-0.7895885E 01	0.7405878E 00	-0.7220735E 01	0.7746379E 00	-0.6625925E 01
85	0.8080880E 00	-0.6100393E 01	0.8427382E 00	-0.5634759E 01	0.8767883E 00	-0.5221146E 01	0.9108384E 00	-0.4852830E 01
89	0.9448885E 00	-0.4524035E 01	0.9789386E 00	-0.4229812E 01	0.1012988E 01	-0.3965927E 01	0.1047038E 01	-0.3728664E 01
93	0.1081088E 01	-0.3514846E 01	0.1115138E 01	-0.3321690E 01	0.1149188E 01	-0.3146779E 01	0.1183238E 01	-0.2988000E 01
97	0.1217288E 01	-0.2843518E 01	0.1251338E 01	-0.2711711E 01	0.1285388E 01	-0.2591168E 01	0.1319438E 01	-0.2480641E 01

2/ A régi és új töltéssűrűségek átlaga szerepel a potenciálok átlaga helyett.

A befagyasztott állapotok az előzővel azonosak.

A parciális hullámok a külső gömbre és a kénre $l=2$ -ig.
Emiatt az alábbi irreducibilis előállításokban lesz változás:

6.00 =1.00000 0.05000 5 1 50 0
 T_{1g} DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 1 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 1 NO. OF TERMS= 4
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= -0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 7 CN= 0.5000000000
 M= 1 I= 1 ATOM NO.= 8 CN= -0.5000000000
 NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3
 NO. OF COEFFICIENTS= 30 MAX. SUBSCRIPT= 25

6.00 =0.88000 0.05000 10 1 50 0
 T_{2g} DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 1 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO. 1 L= 1 NO. OF TERMS= 4
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 3 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 4 CN= 0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 5 CN= -0.5000000000
 M= 0 I= 1 ATOM NO.= 6 CN= -0.5000000000
 NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3
 NO. OF COEFFICIENTS= 46 MAX. SUBSCRIPT= 25

A többi bemenő adat változatlan.

ITERATION 4 EPS= 5.5846870E-03

INTERSPHERE CHARGE= 1.2642344E 01

QC (1)= 1.3053188E 00 QC (2)= 1.3596021E 01 QC (3)= 7.0758410E 00 QC (4)= 7.0758410E 00 QC (5)= 7.0758410E 00
QC (7)= 7.0758410E 00 QC (8)= 7.0758410E 00 QC

STATE 1 OCUP= 6.00 E= -1.1789389E 00 NEXT E= -1.1660900E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1
QC (1)= 2.9883392E-02 QC (2)= 2.4400245E-02 QC (3)= 1.0340828E-01 QC (4)= 1.0340828E-01 QC (5)= 1.0340828E-01
QC (7)= 1.0340828E-01 QC (8)= 1.0340828E-01 QC
INTERSPHERE CHARGE= 3.2720661E-01

STATE 2 OCUP= 6.00 E= -1.0753908E 00 NEXT E= -1.0612240E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 2
QC (1)= 0.0 QC (2)= 0.0 QC (3)= 1.1131543E-01 QC (4)= 1.1131543E-01 QC (5)= 1.1131543E-01
QC (7)= 1.1131543E-01 QC (8)= 1.1131543E-01 QC
INTERSPHERE CHARGE= 3.3210754E-01

STATE 3 OCUP= 4.00 E= -2.4257412E 00 NEXT E= -2.4107332E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 3
QC (1)= 2.2459619E-02 QC (2)= 1.9971512E-02 QC (3)= 1.2833488E-01 QC (4)= 1.2833488E-01 QC (5)= 1.2833488E-01
QC (7)= 1.2833488E-01 QC (8)= 1.2833488E-01 QC
INTERSPHERE CHARGE= 1.8756104E-01

STATE 4 OCUP= 4.00 E= -1.0921507E 00 NEXT E= -1.0786524E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 3
QC (1)= 4.2677265E-02 QC (2)= 7.3416173E-02 QC (3)= 1.1753243E-01 QC (4)= 1.1753243E-01 QC (5)= 1.1753243E-01
QC (7)= 1.1753243E-01 QC (8)= 1.1753243E-01 QC
INTERSPHERE CHARGE= 1.7871189E-01

STATE 5 OCUP= 6.00 E= -1.0111895E 00 NEXT E= -9.9586236E-01 SPIN= 1 SYMMETRY 5
QC (1)= 0.0 QC (2)= 0.0 QC (3)= 1.2162143E-01 QC (4)= 1.2162143E-01 QC (5)= 1.2162143E-01
QC (7)= 1.2162143E-01 QC (8)= 1.2162143E-01 QC
INTERSPHERE CHARGE= 2.7027130E-01

STATE 6 OCUP= 6.00 E= -2.4897661E 00 NEXT E= -2.4761534E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6
Q(1)= 1.3304077E=02 Q(2)= 4.3871284E=02 Q(3)= 1.2002558E=01 Q(4)= 1.2002558E=01 Q(5)= 1.2002558E=01
Q(7)= 1.2002558E=01 Q(8)= 1.2002558E=01 Q(9)= 1.2002558E=01
INTERSPHERE CHARGE= 2.2267151E=01

STATE 7 OCUP= 6.00 E= -1.3720798E 00 NEXT E= -1.3662739E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6
Q(1)= 6.4290836E=03 Q(2)= 2.2484475E=01 Q(3)= 7.7827334E=02 Q(4)= 7.7827334E=02 Q(5)= 7.7827334E=02
Q(7)= 7.7827334E=02 Q(8)= 7.7827334E=02 Q(9)= 7.7827334E=02
INTERSPHERE CHARGE= 3.0176256E=01

STATE 8 OCUP= 6.00 E= -1.0417147E 00 NEXT E= -1.0305099E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6
Q(1)= 1.0963768E=01 Q(2)= 6.0827357E=02 Q(3)= 9.6057236E=02 Q(4)= 9.6057236E=02 Q(5)= 9.6057236E=02
Q(7)= 9.6057236E=02 Q(8)= 9.6057236E=02 Q(9)= 9.6057236E=02
INTERSPHERE CHARGE= 2.4719143E=01

STATE 9 OCUP= 2.00 E= -2.6612148E 00 NEXT E= -2.6524429E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 9
Q(1)= 1.0303453E=02 Q(2)= 1.5844195E=01 Q(3)= 9.6530020E=02 Q(4)= 9.6530020E=02 Q(5)= 9.6530020E=02
Q(7)= 9.6530020E=02 Q(8)= 9.6530020E=02 Q(9)= 9.6530020E=02
INTERSPHERE CHARGE= 2.5207520E=01

STATE 10 OCUP= 2.00 E= -1.7054491E 00 NEXT E= -1.7038040E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 9
Q(1)= 2.1570172E=02 Q(2)= 3.0215776E=01 Q(3)= 6.9778919E=02 Q(4)= 6.9778919E=02 Q(5)= 6.9778919E=02
Q(7)= 6.9778919E=02 Q(8)= 6.9778919E=02 Q(9)= 6.9778919E=02
INTERSPHERE CHARGE= 1.9759846E=01

XALPHA STATISTICAL TOTAL ENERGY= -1.9750996E 03 TOTAL KINETIC ENERGY= 2.0166572E 03

CONSTANT POTENTIAL= -0.1128677E 01

c/ Nincs befagyasztott állapot, a kén 1s, 2s, 2p; fluor 1s állapotok 11 - 14 sorszámmal hozzá vannak véve a többi állapothoz.

A többi bemenő adat a szokásos választásu.

/potenciál-átlag, és $l=2$ -ig vett parciális hullámok/.

1 2,00=176,00000 5,00000 11 1 50 1
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 1 DEGENERACY= 2
 BASIS FUNCTION NO: 1 L= 0 NO: OF TERMS= 1
 S 1s M= 0 I= 1 ATOM NO:= 2 CN= 1,0000000000
 NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 2

NO. OF COEFFICIENTS= 46 MAX.SUBSCRIPT= 25

2 2,00 =15,40000 1,00000 12 1 50 1
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 1 DEGENERACY= 2
 BASIS FUNCTION NO: 1 L= 0 NO: OF TERMS= 1
 S 2s M= 0 I= 1 ATOM NO:= 2 CN= 1,0000000000
 NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 2

NO. OF COEFFICIENTS= 46 MAX.SUBSCRIPT= 25

3 6,00 =11,57300 1,00000 13 1 50 1
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 1 DEGENERACY= 6
 BASIS FUNCTION NO: 1 L= 1 NO: OF TERMS= 1
 S 2p M= 0 I= 1 ATOM NO:= 2 CN= 1,0000000000
 NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 2

NO. OF COEFFICIENTS= 46 MAX.SUBSCRIPT= 25

14 12,00 =48,67999 3,00000 14 1 50 1
 DIMENSION OF SECULAR MATRIX= 1 DEGENERACY= 12
 BASIS FUNCTION NO: 1 L= 0 NO: OF TERMS= 1
 F 1s M= 0 I= 1 ATOM NO:= 3 CN= 1,0000000000
 NO OF INEQUIVALENT ATOMS= 3

NO. OF COEFFICIENTS= 46 MAX.SUBSCRIPT= 25

ITERATION 4 EPS= 2.5537097E=01

INTERSPHERE CHARGE= 1.2639832E 01

Q(1)= 1.2871666E 00 Q(2)= 1.5453297E 01 Q(3)= 7.1024446E 00 Q(4)= 7.1024446E 00 Q(5)= 7.1024446E 00
Q(7)= 7.1024446E 00 Q(8)= 7.1024446E 00 Q(

STATE 1 OCUP= 2.00 E= 2.6647377E 00 NEXT E= 2.6669922E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1

Q(1)= 1.0771662E=02 Q(2)= 1.4603851E=01 Q(3)= 9.8320007E=02 Q(4)= 9.8320007E=02 Q(5)= 9.8320007E=02
Q(7)= 9.8320007E=02 Q(8)= 9.8320007E=02 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 2.5267029E=01

STATE 2 OCUP= 2.00 E= 1.6919603E 00 NEXT E= 1.7256498E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 1

Q(1)= 2.1714516E=02 Q(2)= 3.2108840E=01 Q(3)= 7.0615590E=02 Q(4)= 7.0615590E=02 Q(5)= 7.0615590E=02
Q(7)= 7.0615590E=02 Q(8)= 7.0615590E=02 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 2.0350361E=01

STATE 3 OCUP= 4.00 E= 2.4382801E 00 NEXT E= 2.4207945E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 3

Q(1)= 2.2595212E=02 Q(2)= 1.9700855E=02 Q(3)= 1.2829620E=01 Q(4)= 1.2829620E=01 Q(5)= 1.2829620E=01
Q(7)= 1.2829620E=01 Q(8)= 1.2829620E=01 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 1.8792725E=01

STATE 4 OCUP= 4.00 E= 1.1063919E 00 NEXT E= 1.0913057E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 3

Q(1)= 4.2635925E=02 Q(2)= 7.1600854E=02 Q(3)= 1.1779940E=01 Q(4)= 1.1779940E=01 Q(5)= 1.1779940E=01
Q(7)= 1.1779940E=01 Q(8)= 1.1779940E=01 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 1.7896652E=01

STATE 5 OCUP= 6.00 E= 1.0287943E 00 NEXT E= 1.0081091E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 5

Q(1)= 0.0 Q(2)= 0.0 Q(3)= 1.2140548E=01 Q(4)= 1.2140548E=01 Q(5)= 1.2140548E=01
Q(7)= 1.2140548E=01 Q(8)= 1.2140548E=01 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 2.7156734E=01

STATE 6 OCUP= 6.00 E= 2.5020847E 00 NEXT E= 2.4880638E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6

Q(1)= 1.3431784E=02 Q(2)= 4.3163072E=02 Q(3)= 1.1997223E=01 Q(4)= 1.1997223E=01 Q(5)= 1.1997223E=01
Q(7)= 1.1997223E=01 Q(8)= 1.1997223E=01 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 2.2357178E=01

STATE 7 OCUP= 6.00 E= 1.3847780E 00 NEXT E= 1.3897467E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6

Q(1)= 6.3341409E=03 Q(2)= 2.1755588E=01 Q(3)= 7.8589797E=02 Q(4)= 7.8589797E=02 Q(5)= 7.8589797E=02
Q(7)= 7.8589797E=02 Q(8)= 7.8589797E=02 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 3.0457211E=01

STATE 8 OCUP= 6.00 E= 1.0586557E 00 NEXT E= 1.0467758E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 6

Q(1)= 1.1062098E=01 Q(2)= 6.6988945E=02 Q(3)= 9.5954001E=02 Q(4)= 9.5954001E=02 Q(5)= 9.5954001E=02
Q(7)= 9.5954001E=02 Q(8)= 9.5954001E=02 Q(

INTERSPHERE CHARGE= 2.4666691E=01

STATE 9 OCUP= 6.00 E= -1.1965618E 00 NEXT E= -1.1799555E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 9
 Q(1)= 2.9825110E-02 Q(2)= 2.1900382E-02 Q(3)= 1.0333794E-01 Q(4)= 1.0333794E-01 Q(5)= 1.0333794E-01
 Q(7)= 1.0333794E-01 Q(8)= 1.0333794E-01 Q(9)= 1.0333794E-01
 INTERSPHERE CHARGE= 3.2824707E-01

STATE 10 OCUP= 6.00 E= -1.0937424E 00 NEXT E= -1.0745621E 00 SPIN= 1 SYMMETRY 10
 Q(1)= 0.0 Q(2)= 0.0 Q(3)= 1.1077350E-01 Q(4)= 1.1077350E-01 Q(5)= 1.1077350E-01
 Q(7)= 1.1077350E-01 Q(8)= 1.1077350E-01 Q(9)= 1.1077350E-01
 INTERSPHERE CHARGE= 3.3535957E-01

STATE 11 OCUP= 2.00 E= -1.7908020E 02 NEXT E= -1.7797141E 02 SPIN= 1 SYMMETRY 11
 Q(1)= 0.0 Q(2)= 1.0000000E 00 Q(3)= 0.0 Q(4)= 0.0 Q(5)= 0.0
 Q(7)= 0.0 Q(8)= 0.0 Q(9)= 0.0
 INTERSPHERE CHARGE= 0.0

STATE 12 OCUP= 2.00 E= -1.5325292E 01 NEXT E= -1.6161301E 01 SPIN= 1 SYMMETRY 12
 Q(1)= 0.0 Q(2)= 1.0000000E 00 Q(3)= 0.0 Q(4)= 0.0 Q(5)= 0.0
 Q(7)= 0.0 Q(8)= 0.0 Q(9)= 0.0
 INTERSPHERE CHARGE= 0.0

STATE 13 OCUP= 6.00 E= -1.1682519E 01 NEXT E= -1.2355837E 01 SPIN= 1 SYMMETRY 13
 Q(1)= 0.0 Q(2)= 1.0000000E 00 Q(3)= 0.0 Q(4)= 0.0 Q(5)= 0.0
 Q(7)= 0.0 Q(8)= 0.0 Q(9)= 0.0
 INTERSPHERE CHARGE= 0.0

STATE 14 OCUP= 12.00 E= -4.8927414E 01 NEXT E= -4.8860291E 01 SPIN= 1 SYMMETRY 14
 Q(1)= 0.0 Q(2)= 0.0 Q(3)= 1.6666669E-01 Q(4)= 1.6666669E-01 Q(5)= 1.6666669E-01
 Q(7)= 1.6666669E-01 Q(8)= 1.6666669E-01 Q(9)= 1.6666669E-01
 INTERSPHERE CHARGE= 0.0

XALPHA STATISTICAL TOTAL ENERGY= -1.9884163E 03 TOTAL KINETIC ENERGY= 2.0075999E 03

CONSTANT POTENTIAL= -0.1151910E 01