

AZ LCAO-MO MÓDSZER ALKALMAZÁSA KÉTMAGU Co-KOMPLEXEK

ELEKTRONENERGIÁINAK MEGHATÁROZÁSÁRA

Doktori disszertáció

Maráz Vilmos

Készült a József Attila Tudományegyetem Elméleti Fizikai
Intézetében

1965.



Diss. B 345



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

1.§. Az LCAO-MO módszer

1.1. A molekulapálya-módszer

1.2. Az LCAO-módszer

2.§. Véges csoportok ábrázolásai

2.1. Ábrázolás mátrixokkal

2.2. Indukált operációk és Hamilton-operátor

3.§. A sajátértékproblémák felírása

3.1. A koordinációs kötés

3.2. Modellalkotás

3.3. A komplexek szimmetriacsoportjai

3.4. A sajátterek kiredukálása

4.§. A sajátértékproblémák megoldása

4.1. Az átfedési integrálok kiszámítása

4.2. H_{ij} típusu integrálok kiszámítása

4.3. Elektronenergiák

4.4. Elektronátmenetek

Az eredmények értékelése

Irodalom

BEVEZETÉS

Az anyagszerkezeti kutatás egyik legfontosabb feladata a molekulák szerkezetének, fizikai és kémiai tulajdonságainak, s ezen belül is a molekulákat összetartó erők természetének felderítése. E feladat megoldásában a különféle kísérleti módszerek mellett jelentős helyet foglal el a kvantummechanika, ill. a kémiai kötésekre vonatkoztatva, a kvantumkémia. Bár a kvantummechanikai többtestprobléma a legtöbb esetben egzaktul nem oldható meg, a sajátértékproblémák megoldására kidolgozott közelítő módszerek segítségével - bonyolultabb esetekben is - kielégítő pontosságú eredményekhez lehet jutni. Molekuláris problémák tárgyalására kidolgozott ilyen közelítő módszer az u.n. LCAO-MO módszer, amelynél a molekula hullámfüggvényét atomi pályák lineárkombinációjából felépített molekulapályák szorzata alakjában tételezzük fel.

A disszertáció az $[(\text{NH}_3)_4 \text{Co}(\text{OH})_2 \text{Co}(\text{NH}_3)_4]^{4+}$ (a továbbiakban K_1) és az $[(\text{NH}_3)_3 \text{Co}(\text{OH})_3 \text{Co}(\text{NH}_3)_3]^{3+}$ (a továbbiakban K_2) kétmagu Co-komplexionok stacionárius állapotaihoz tartozó elektronenergiák meghatározását tartalmazza az LCAO-MO módszer alapján. A sajátértékproblémák megoldásánál figyelembe vettük a komplexionok szimmetriatulajdonságait, amely - csoportelméleti eredmények felhasználásával - a problémák megoldását lényegesen egyszerűbbé tette. Ez az egyszerűsödés abból adódott, hogy a szimmetriatulajdonságok figyelembevételével olyan molekulapályák megszerkesztésére nyílt lehetőség,

amelyekből képezett szekuláris determinánsok alacsonyabbrendű determinánsok szorzatai alakjában álltak elő, így az elektronenergiák meghatározását lényegesen kevesebb numerikus számítással lehetett nyerni, mint amelyet az LCAO-MO módszer közvetlen alkalmazásánál kellett volna elvégezni.

A disszertáció témája szorosan kapcsolódik a komplex vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságaival foglalkozó vizsgálatokhoz, amelyek - főként a több centrális iont tartalmazó komplexek vonatkozásában - az utóbbi időben kerültek az érdeklődés középpontjába. Az egy centrális iont tartalmazó komplexek nagy részére már eléggé megbízható kísérleti és elméleti eredmények állnak rendelkezésre, de a több centrális iont tartalmazó komplex vegyületek legnagyobb része még részletes vizsgálatra szorul. A K_1 és K_2 kétmagu komplexionokra nyert eredmények ezekben a vizsgálatokban jelentenek egy kezdeti lépést.

1.§. AZ LCAO-MO MÓDSZER

1.1. A molekulapálya-módszer

Egy több elektronból és atommagból álló rendszer (molekula) stacionárius állapotaihoz tartozó energiaértékeket az

$$H\Psi = E\Psi$$

időtől független Schrödinger-egyenlet megoldásából nyerjük, amelyben H a rendszer Hamilton-operátora. Ha a nagyobb tömegű atommagok mozgásától eltekintünk, továbbá az elektro-

nok és atommagok között csak elektrosztatikus kölcsönhatásokat tételezünk fel, akkor a Hamilton-operátor

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_i \nabla_i^2 + \sum_{i,k} \frac{e^2}{r_{ik}} - \sum_{i,\alpha} \frac{Z_\alpha e^2}{r_{i\alpha}}$$

alakú, ahol r_{ik} az i -edik és k -edik elektron, $r_{i\alpha}$ az i -edik elektron és α -adik atommag távolsága, Z_α az α -adik mag rendszáma, m az elektron tömege, e pedig az elemi töltés.

Ha az elektronok száma n , akkor a H Hamilton-operátor egy $3n$ változós függvényre ható differenciáloperátor, minek következtében már kis elektronszám esetén is a molekulasajátérték-probléma megoldásánál közelítő eljárást kell alkalmaznunk.

Egy ilyen közelítő módszerhez juthatunk el akkor, ha nulladik közelítésben az elektronok közötti kölcsönhatástól eltekintünk. Ebben az esetben a molekulaproblémát egy olyan - több elektronból álló - problémával helyettesíthetjük, amelynél az elektronok az atommagok által létrehozott potenciáltérben mozognak. A Hamilton-operátor ekkor

$$H = \sum_i H_i$$

alakba írható, ahol:

$$H_i = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + \sum_\alpha V_{i\alpha} \quad (V_{i\alpha} = -\frac{Z_\alpha e^2}{r_{i\alpha}}) \quad (1.1.1.)$$

egyetlen elektron Hamilton-operátora. Minthogy az elektronokból álló rendszer most független részekből áll, a teljes molekula sajátértékproblémájának megoldása

$$\Psi = \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \dots \psi_n(x_n)$$

alakban írható fel, ahol

$$H_i \psi_i = E_i \psi_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Az így kapott molekulasajátfüggvényben szereplő, egyetlen elektron koordinátáitól függő $\psi_i(\mathbf{r}_i)$ függvényeket egyelektron-molekulafüggvényeknek, vagy **m o l e k u l a p á l y á k n a k** (MO-k) szokás nevezni. Ebben a közelítésben tehát a molekulasajátfüggvény molekulapályák szorzata alakjában áll elő, ezért ezt a közelítő módszert **m o l e k u l a p á l y a m ó d s z e r n e k**, vagy **MO-módszernek** nevezzük.

A molekulapályamódszer tehát a térben rögzítettnek képzelte atommagok elrendeződését ismertnek tételezi fel, s az ezek, valamint a számításba nem vett elektronok által alkotott molekulatörzsben, mint potenciáltérben, egyelektronproblémát vizsgál, amelynek megoldásából molekulapályák (egyelektron-molekulasajátfüggvények), egyuttal energiasajátértékek sorozata adódik. Az elektronok közötti kölcsönhatás fennállása miatt azonban ez a módszer csak nulladik közelítésnek tekinthető, ezért a második lépésben az MO-módszerrel nyert MO-kat és energiaértékeket nulladik közelítésnek tekintve az egyes MO-kon lévő elektronok kölcsönhatását - mint perturbációt - szokás figyelembe venni.

A sajátértékprobléma megoldását molekulapályamódszerközelítésben tehát a

$$H_i \psi = E \psi \quad (i = 1, 2, \dots, \infty)$$

Schrödinger-egyenlet megoldásaként nyerjük, ahol H_i az (1.1.1.) Hamilton-operátor. Ilyen egyelektronprobléma egzakt megoldása azonban csak a hidrogén molekulaion esetében sikerült, így bonyolultabb esetekben már az MO-k meghatározásánál is közelítő megoldásra vagyunk utalva. Leginkább elter-

jedt közelítés az u.n. atomi pályák lineárkombinációjának (LCAO) módszere, amelynél a molekulapályákat atomi pályák lineárkombinációjának tételezzük fel. A legjobban közelítő MO-kat akkor nyerhetjük, ha az atomi pályák (AO-k) Hartree-Fock-féle függvények, de könnyű kezelhetőségük miatt gyakran alkalmazzák az u.n. Slater-féle függvényeket is. Ez utóbbi függvényeket fogjuk mi is a tárgyalandó komplexek molekula-pályáinak megalkotásánál alapul választani. Az alábbiakban a lineárkombinációs együtthatók meghatározásának a problémájával foglalkozunk.

1.2. Az LCAO-módszer

Állítsuk elő a ψ molekulapályát k számú φ_i ($i=1, \dots, k$) lineárisan független atomi pályára

$$\psi = \sum_{i=1}^k c_i \varphi_i \quad (1.2.1.)$$

alaku lineárkombinációjaként, és a c_i együtthatókat variációs paraméterekként kezelve, határozzuk meg azt a lineárkombinációt, amely a sajátértékprobléma megoldását a legjobban közelíti. A variációs módszer szerint az (1.2.1.) lineárkombináció akkor a legjobb közelítés, ha a ψ -vel számított

$$\varepsilon = \frac{(\psi, H\psi)}{(\psi, \psi)}$$

energia minimális. Ez az összefüggés a lineárkombinációs előállítás behelyettesítésével az alábbi alakba írható:

$$\left(\sum_i c_i \varphi_i, H \sum_j c_j \varphi_j \right) - \varepsilon \left(\sum_i c_i \varphi_i, \sum_j c_j \varphi_j \right) = \sum_{i,j} c_i^* c_j \cdot [(\varphi_i, H\varphi_j) - \varepsilon(\varphi_i, \varphi_j)] = 0.$$

Ha még bevezetjük a

$$(\varphi_i, H\varphi_j) \equiv H_{ij} \quad , \quad (\varphi_i, \varphi_j) \equiv S_{ij}$$

jelöléseket, akkor az egyenlet:

$$\sum_{i,j} c_i^* c_j [H_{ij} - \varepsilon S_{ij}] = 0$$

Ha ezt az egyenletet differenciáljuk c_l^* szerint és figyelembe vesszük a

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial c_l^*} = 0 \quad (l = 1, 2, \dots, k)$$

minimumfeltételt, akkor a következő lineáris, homogén egyenletrendszerhez jutunk:

$$\sum_j c_j [H_{ij} - \varepsilon S_{ij}] = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (1.2.2.)$$

Ez az egyenletrendszer a C_j együtthatókra - egy triviális megoldástól eltekintve - csak akkor oldható meg, ha a rendszer determinánsa eltűnik, vagyis ha:

$$|H_{ij} - \varepsilon S_{ij}| = 0 \quad (i, j = 1, 2, \dots, k) \quad (1.2.3.)$$

Ebből a **s z e k u l á r i s e g y e n l e t**ből legfeljebb k számú energiaérték nyerhető, amelyeket az (1.2.2.) egyenletrendszerbe helyettesítve a lineárkombinációs együtthatók egy állandó faktor erejéig rendre kiszámíthatók. Ezt az állandó faktort a molekulapályák normálásával lehet rögzíteni.

Az elmondottak alapján egy molekuláris probléma LCAO-MO módszerrel történő tárgyalásánál alkalmasan kiválasztott atomi pályákból lineárkombinációval MO-kat szerkesztünk, s a probléma stacionárius állapotaihoz tartozó energiaértékeket a probléma szekuláris egyenletéből, számíthatjuk. A szekuláris egyenlet megoldása azonban általában hosszadalmas nume-

rikus feladat, ezért a numerikus munka leegyszerűsítése érdekében az MO-k megszerkesztésénél a csoportelmélet ide vonatkozó eredményeit célszerű felhasználni.

2.§. VÉGES CSOPORTOK ÁBRÁZOLÁSAI

2.1. Ábrázolás mátrixokkal

Ha egy $G = \{g\}$ véges vagy végtelenedrendű multiplikativ csoport minden g eleméhez homomorf módon egy $D(g)$ mátrixot rendelünk, akkor a négyzetes mátrixokból álló

$$D = \{ D(g), D(g'), \dots \}$$

csoportot a $G = \{g\}$ absztrakt csoport mátrixelőállításának, vagy ábrázolásának, az előállító $D(g)$ mátrix sorainak (vagy oszlopainak) a számát pedig az ábrázolás dimenziójának nevezzük. Ha a $g \rightarrow D(g)$ hozzárendelés egy-egyértelmű (tehát izomorf), akkor az előállítást hűnek nevezzük, ellenkező esetben nem hűábrázolásról beszélünk.

A homomorfia, vagy művelettartósság azt jelenti, hogy ha $g \cdot g' = g''$, és az előállító mátrixok rendre $D(g), D(g'), D(g'')$, akkor:

$$D(g) \cdot D(g') = D(g'') = D(gg') . \quad (2.1.1.)$$

Speciálisan, ha ε a G csoport egységeleme, akkor $g \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot g = g$ választással:

$$D(g) \cdot D(\varepsilon) = D(g\varepsilon) = D(\varepsilon g) = D(\varepsilon) \cdot D(g) = D(g) ,$$

amiből látjuk, hogy az ε egységelemet a

$$D(\varepsilon) \equiv E$$

egységmátrix állítja elő. Legyen továbbá q^{-1} a q elem inverze, akkor a

$$D(q) \cdot D(q^{-1}) = D(qq^{-1}) = D(q^{-1}q) = D(q^{-1}) \cdot D(q) = D(\varepsilon) = E$$

fennállásából látjuk, hogy

$$D(q^{-1}) = D^{-1}(q)$$

azaz a q elem q^{-1} inverzét a q -t ábrázoló mátrix inverze állítja elő.

Könnyen belátható, az is, hogy ha $D = \{D(g)\}$ egy G csoport ábrázolása, akkor bármely - ugyanolyan dimenziójú - nem zérus determinánsu S mátrixszal nyert

$$D' = S D S^{-1} \quad (2.1.2.)$$

mátrixhalmaz is előállítás. Ha ugyanis D ábrázolja G -t és

$$D'(q) = S D(q) S^{-1}, \quad D'(q') = S D(q') S^{-1}, \quad D'(q'') = S D(q'') S^{-1},$$

akkor (2.1.1.) fennállása miatt:

$$D'(q) \cdot D'(q') = S D(q) S^{-1} \cdot S D(q') S^{-1} = S D(q) D(q') S^{-1} = S D(q'') S^{-1} = D'(q''),$$

vagyis a $D' = \{D'(g)\}$ G -nek valóban ábrázolása. Eszerint ha G -nek ismeretes egy D ábrázolása, akkor belőle (2.1.2.) típusu mátrixtranszformációkkal végtelen sok további ábrázolás származtatható. Célszerű ezért a mátrixelőállításokat az alábbi módon osztályozni.

Egy G absztrakt csoport két - D ill. D' mátrixrendszerrel elért - ugyanolyan dimenziós mátrixelőállítását

e k v i v a l e n s e k nevezük, ha van olyan S - nem zérus determinánsu - mátrix, hogy a

$$D'(g) = S D(g) S^{-1}$$

egyenlőség fennáll minden g elemet reprezentáló $D(g)$ ill.

$D'(g)$ mátrixra. Ellenkező esetben a két előállítást *in e k v i v a l e n s e l ő á l l í t á s n a k* nevezük. A definícióból következően két különböző dimenzióju előállítás mindig inekvivalens, míg két ugyanolyan dimenzióju előállítás lehet ekvivalens és inekvivalens is.

Legyen a komplex számok teste felett értelmezett n -dimenziós $R_n = \{x_n\}$ ortogonális lineáris vektortér [1] a G csoportot ábrázoló n -dimenziós $D(g)$ mátrixok értelmezési tartománya, vagy más szóval *e l ő á l l í t á s t e r e*. Ebben a térben a $D(g)$ mátrixok minden x_n elemhez, egy ugyan-csak R_n -beli

$$x'_n = D(g) x_n \quad (2.1.3.)$$

elemet rendelnek. Ha az R_n vektortérnek a $D(g)$ operációkkal (tehát lényegében G -vel) szemben van nem triviális megengedett altere, akkor R_n -t G -re nézve *r e d u c i b i l i s*, ellenkező esetben *i r r e d u c i b i l i s v e k t o r t é r n e k* nevezük. Ha az R_n vektortér megengedett alterei G -re nézve irreducibilisek és direkt összegük kiadja R_n -t, akkor R_n -t G -re nézve *t e l j e s e n r e d u c i b i l i s* vektortérnek nevezük. Ez utóbbi esetben R_n -t szokás teljesen széteső vektortérnek is nevezni, míg (csak) szétesőnek akkor nevezük, ha azok az alterek, amelyek direkt összegéként R_n

előáll, G -re nézve nem irreducibilisek. Nyilvánvaló, hogy általában a reducibilitás még nem jelent szétesést, ugyanígy a szétesés teljes reducibilitást. Ha azonban $D(g)$ -k R_n -ben uniter leképezést hoznak létre, akkor a mátrixalgebra azon tételét felhasználva [2], mely szerint uniter operációkkal szemben megengedett altérre merőleges altér is megengedett, következik, hogy ekkor R_n G -vel szembeni reducibilitása teljes. Ilyen teljesen széteső vektortér esetén az eredeti bázisok mellett, amelyekre vonatkoztatva $D(g)$ az χ_n elemhez a (2.1.3.) elemet rendeli, az irreducibilis megengedett altéreket kifeszítő bázisok összessége is kifeszíti R_n -t, s egyben létezik egy olyan nem zérus determinánsu S mátrix, amelylyel megadott hasonlósági transzformáció a két bázisrendszert egymásba átviszi. Az a transzformáció pedig, amely az új bázisokra vonatkoztatva az χ_n elemhez ugyancsak χ'_n -t rendeli a [3]

$$D'(g) = S D(g) S^{-1}$$

mátrix által van meghatározva; s ekkor $D'(g)$ alakja:

$$D'(g) = \begin{pmatrix} D^{(1)} & & 0 \\ & D^{(2)} & \\ 0 & & D^{(q)} \end{pmatrix}, \quad (2.1.4.)$$

ahol q az R_n tér direkt alkatrészeinek a száma, $D^{(1)}(g)$ pedig a G csoport g elemét az i -edik irreducibilis megengedett altérben ábrázoló mátrix. Látjuk, hogy egy teljesen reducibilis térben elért $D(g)$ ábrázolásból hasonlósági transzformációval G -nek olyan új, $D(g)$ -vel ekvivalens má-

rixelőállítására nyerhető, amely az irreducibilis alterekben elért $D^{(i)}(g)$ mátrixelőállítások direkt összegéből tevődik össze. Az elmondottak alapján egy G csoport ábrázolásait tovább osztályozhatjuk.

Egy G csoport valamely n -dimenziós $D(g)$ mátrixelőállítását irreducibilisnek, reducibilisnek ill. teljesen reducibilisnek nevezzük aszerint, hogy $D(g)$ n -dimenziós R_n előállítástere irreducibilis, reducibilis ill. teljesen reducibilis. Ha egy $D(g)$ mátrixelőállítás irreducibilis mátrixelőállítások direkt összege, akkor ezt a mátrixelőállítást **k i r e d u k á l t á b r á z o l á s n a k** nevezzük. Az elmondottakból következik, hogy egy teljesen reducibilis mátrixelőállítás alkalmas hasonlósági transzformációval kiredukált alakra hozható, vagy más szóval kiredukálható. Minthogy ezek szerint bármely teljesen reducibilis előállítás irreducibilis előállítások direkt összegének tekinthető, ezért egy G csoportra nyilvánvalóan az irreducibilis inekvivalens előállítások lesznek jellemzők, ezért a továbbiakban ezek vizsgálatára szorítkozunk. Véges csoportok esetén az irreducibilis inekvivalens előállítások, valamint a csoport jellemző adatai (nevezetesen a csoport rendje és a csoport egymáshoz konjugált elemeiből álló osztályainak száma) között fontos összefüggések állnak fenn. Ezek a következők:

Ha $D^\alpha(g)$ és $D^\beta(g)$ egy h -adrendű véges G csoport két-
 n_α ill. n_β dimenziós - irreducibilis inekvivalens mátrixelőállítása, akkor a Schur-lemma [3] segítségével bebizonyítható a

$$\sum_g D_{ij}^\alpha(g) \cdot D_{kl}^\beta(g^{-1}) = \frac{h}{m_\alpha} \cdot \delta_{il} \delta_{jk} \delta_{\alpha\beta} \quad (2.1.5.)$$

u.n. ortogonalitási reláció, amelyben az összegezés G elemeire terjesztendő ki. Ebből az összefüggésből viszont az irreducibilis inekvivalens $D^\alpha(g)$ ábrázolások

$$\chi^\alpha(g) = \text{Sp}\{D^\alpha(g)\} = \sum_k D_{kk}^\alpha(g)$$

karaktereire közvetlenül nyerhetjük a

$$\sum_g \chi^\alpha(g) \chi^\beta(g^{-1}) = h \delta_{\alpha\beta} \quad (2.1.6.)$$

relációt is, amelyet a karakterek ortogonalitási relációjának szokás nevezni. A (2.1.6.) ortogonalitási relációt uniter irreducibilis ábrázolásokra alkalmazva egy G csoport irreducibilis inekvivalens előállításainak σ száma és G egymáshoz konjugált elemeiből álló osztályainak s száma között a

$$\sigma = s, \quad (2.1.7.)$$

míg a (2.1.5.) összefüggésből az irreducibilis előállítások n_i dimenziója és a csoport h rendje között a

$$\sum_{i=1}^s n_i^2 = h \quad (2.1.8.)$$

összefüggés adódik.

Ezek az eredmények egy G csoport valamely teljesen reducibilis $D(g)$ mátrixelőállítására vonatkozóan fontos további felvilágosítást adnak. Már megállapítottuk, hogy egy teljesen reducibilis előállítás mindig olyan alakra hozható, amely bizonyos számú irreducibilis inekvivalens előállítás direkt összege. Az utóbbi eredményeink szerint viszont egy G csoportnak véges számú, pontosan az egymáshoz konjugált elemekből álló osztályok számával megegyező irreducibilis inekvivalens

ábrázolása van. Ily módon egy teljesen reducibilis, kiredukált mátrixelőállítás az irreducibilis előállításokat direkt alkatrészként többszörösen tartalmazhatja. Ezt a számot azonban a reducibilis előállítás spurja, valamint a csoport irreducibilis inekvivalens ábrázolásainak karakterei már egyértelműen meghatározzák.

Tegyük fel ugyanis, hogy egy teljesen reducibilis $D(g)$ ábrázolás a j -edik $D^{(j)}(g)$ irreducibilis inekvivalens ábrázolást a_j -szer tartalmazza direkt alkatrészként. Legyen a $D(g)$ ábrázolás spurja $\chi(g)$, akkor nyilvánvalóan

$$\chi(g) = \sum_{j=1}^s a_j \chi^{(j)}(g) \quad ,$$

ahol s az egymáshoz konjugált elemekből álló osztályok száma. Ezt az egyenletet $\chi^{(i)}(g^{-1})$ -gyel beszorozva és G elemeire összegezve (2.1.6.) figyelembevételével nyerjük a következőt:

$$\sum_g \chi(g) \chi^{(i)}(g^{-1}) = \sum_j a_j \cdot \sum_g \chi^{(j)}(g) \chi^{(i)}(g^{-1}) = \sum_j a_j h \delta_{ji} = a_i h \quad ,$$

amiből:

$$a_i = \frac{1}{h} \cdot \sum_g \chi(g) \chi^{(i)}(g^{-1}) \quad (i = 1, 2, \dots, s) \quad (2.1.9.)$$

Miután az irreducibilis inekvivalens előállításokat a $\chi^{(i)}(g^{-1})$ ($i = 1, \dots, s$) karakterek egy hasonlósági transzformáció erejéig egyértelműen meghatározzák, ezért a_i -k is egyértelműen meghatározottak. Eszerint bármely teljesen reducibilis előállítás egyértelmű módon bontható fel irreducibilis inekvivalens előállítások direkt összegére.

2.2. Indukált operációk és Hamilton-operátor

Egy G csoport valamely $D(g)$ mátrixelőállításából

könnyen megadhatunk egy további ábrázolást, ha az R előállításiér felett értelmezett négyzetesen integrálható függvényeket is figyelembe vesszük. Mielőtt azonban ezzel az előállítással foglalkoznánk - a formulák áttekinthetősége érdekében - célszerű bevezetni a $D(g) = g$ jelölést, amellyel (2.1.3.)

$$\kappa' = g\kappa$$

alakba írható. Tekintsük ezek után az n -dimenziós R komplex vektortér felett értelmezett négyzetesen integrálható komplex függvények $L^2(R)$ terét és jelöljük $P(g)$ -vel azt az operációt, amely $L^2(R)$ $\varphi(\kappa)$ eleméhez a

$$P(g)\varphi(\kappa) = \varphi(g^{-1}\kappa) \quad (2.2.1.)$$

elemet rendeli. Ezeket az $L^2(R)$ -ben értelmezett $P(g)$ operátorokat - a $D(g)$ mátrixok által - **i n d u k á l t o p e r á c i ó** knak nevezzük. Könnyen belátható [2], hogy ezek az operációk G egy $L^2(R)$ -beli ábrázolását adják, míg a $P(g)$ operációk lineáris és uniter tulajdonságának bizonyítása sem jelent különösebb nehézséget.

Az indukált operációk uniter tulajdonságának fontos következménye van. Tekintsünk ugyanis egy olyan S lineáris, önadjungált operátort, amely $P(g)$ -vel felcserélhető, azaz:

$$P(g)S = SP(g) \quad (2.2.2.)$$

Tegyük fel továbbá, hogy S diszkrét spektrumu operátor, és s_p sajátértékéhez p számú lineárisan független sajátfüggvény tartozik, azaz s_p p -szeresen degenerált. Jelöljük a sajátfüggvényeket $\varphi_r^{(i)}$ -rel ($i = 1, \dots, p$), amelyekre tehát:

$$S \varphi_r^{(i)} = s_r \varphi_r^{(i)} \quad (i = 1, 2, \dots, p) \quad (2.2.3.)$$

Az S lineáris volta miatt a $\varphi_r^{(i)}$ függvények mellett bármely

$$\varphi_r = \sum_{i=1}^p c_i \varphi_r^{(i)} \quad (2.2.4.)$$

alaku lineárkombináció is kielégíti a (2.2.3.) sajátértékegyenletet, vagyis minden (2.2.4.) alaku függvény az s_r -hez tartozó sajátfüggvény. Ezek a függvények a négyzetesen integrálható függvények terében egy p -dimenziós S -sel szemben megengedett lineáris alteret képeznek, amelyet a $\varphi_r^{(i)}$ ($i = 1, \dots, p$) bázisok feszítenek ki. Ezt az alteret a továbbiakban az S operátor s_r sajátértékéhez tartozó sajáttereknek fogjuk nevezni.

Alkalmazzunk a (2.2.3.) sajátértékproblémára egy $P(g)$ indukált operációt:

$$P(g) S \varphi_r^{(i)} = S P(g) \varphi_r^{(i)} = s_r \cdot P(g) \varphi_r^{(i)} \quad (i = 1, 2, \dots, p).$$

Ebből az összefüggésből leolvasható, hogy minden $\varphi_r^{(i)}$ függvény esetén a $P(g) \varphi_r^{(i)} = \varphi_r^{(i)}(g^{-1}x)$ is az s_r sajátértékhez tartozik, következésképpen előállítható a sajátteret kifeszítő bázisok

$$P(g) \varphi_r^{(i)} = \sum_{k=1}^p c_{ki}(g) \varphi_r^{(k)} \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

alaku lineárkombinációjaként. Egyben látjuk azt is, hogy a $c_{ki}(g)$ elemekből álló $C = (c_{ki})$ mátrix mind a $P(g)$, mind pedig g egy uniter mátrixelőállítását adja. Ha a sajátter a $P(g)$ operációkkal szemben reducibilis, akkor $P(g)$ -k uniter volta miatt teljesen reducibilis, így a 2.1. pontban mondtak szerint a sajátterbe az eredeti $\varphi_r^{(i)}$ bázisok helyett hasonlósági transzformációval olyan új bázisokat lehet be-

vezetni, amelyekre vonatkoztatva a sajátter irreducibilis alterek direkt összege, a $P(g)$ -ket ábrázoló mátrixok pedig (2.1.4.) alakúak.

Az eddigi eredmények egy teljesen reducibilis előállítás kiredukálásának a módját lényegében már magukba foglalják, de eddigi formuláink még explicite nem adnak felvilágosítást arra, hogy egy reducibilis térbe hogyan lehet azokat a bázisokat bevezetni, amelyek az irreducibilis altereket feszítik ki. Erre vonatkoznak az alábbi összefüggések:

Jelöljük az n_i -dimenziós i -edik irreducibilis alteret kifeszítő - egyelőre ismeretlen - bázisfüggvényeket $\psi_1^{(i)}, \dots, \psi_{n_i}^{(i)}$ -vel és legyen ebben az altérben $D^{(i)}(g)$ a $P(g)$ operáció mátrixelőállítása. Ha valamelyik $\psi_k^{(i)}$ bázisra $P(g)$ -t alkalmazzuk, akkor a következő függvényt kapjuk eredményül:

$$P(g)\psi_k^{(i)} = \sum_{\ell=1}^{n_i} D^{(i)}_{\ell k}(g) \psi_{\ell}^{(i)} \quad (2.2.5.)$$

Azokat a $\psi_k^{(i)}$ függvényeket, amelyekre ez az összefüggés teljesül, az i -dik irreducibilis előállítás k -adik sorához tartozónak nevezzük.

Bebizonyítható [2] továbbá, hogy bármely $F \in L^2(R)$ függvényből származtatott

$$\phi_k^{(i)} = \frac{n_i}{h} \cdot \sum_g D^{(i)*}_{gk} P(g) F \quad (2.2.6.)$$

függvény kielégíti a (2.2.5.) összefüggést, vagyis az ily módon nyert nem zérus $\phi_k^{(i)}$ függvény az i -edik irreducibilis előállítás k -adik sorához tartozik, más szóval ennek a térnek egy bázisa. A (2.2.6.) összefüggés tehát a bázisok felkeresésére alkalmas formula, amelynek alkalmazásához lényeges

kihangsúlyozni, hogy minden F esetén létezik olyan i és k , amellyel (2.2.6.) nem zérus eredményre vezet. Bár a (2.2.6.) formula az összes bázis felkeresésére alkalmas, abban az esetben, ha (2.2.6.) segítségével egy bázist már meghatároztunk, célszerűbb a (2.2.5.)-ből kis átalakítással nyerhető, gyorsabban eredményre vezető

$$\psi_i^{(i)} = \frac{m_i}{\kappa} \cdot \sum_q D^{(i)*}(q)_{ik} P(q) \psi_k^{(i)} \quad (2.2.7.)$$

összefüggés segítségével a többi bázist meghatározni.

Bebizonyítható [2], hogy azok a bázisok, amelyek különböző irreducibilis előállításokhoz, vagy ugyanazon irreducibilis előállítás különböző sorához tartoznak, ortogonálisak egymásra. Lényegében ez a tétel teszi célszerűvé az előzőekben tárgyalt eredmények alkalmazását kvantumkémiai számításoknál. Vegyük ugyanis figyelembe, hogy egy molekuláris probléma Hamilton-operátora a molekula konfigurációjához tartozó szimmetriacsoportra nézve (2.2.2.) értelemben szimmetrikus. Ennek következtében a Hamilton-operátorra, ill. a szimmetriacsoportra alkalmazhatók előző eredményeink, amelynek jelentősége akkor látszik teljes mértékben, ha ezt a molekulapályák megszerkesztésének problémájával összekapcsoljuk. Az MO-k felépítésénél abból indulunk ki, hogy bizonyos számú atomi pályát bizonyos fizikai megfontolások alapján kiválasztunk, s belőlük lineárkombinációval MO-kat készítünk. Az energiasajátértékeket akkor (1.2.3.) típusú szekuláris egyenletből nyerjük. Az elvégezendő számolási munka azonban lényegesen egyszerűsíthető akkor, ha az $L^2(R)$ φ_i -k által kifeszített

alterében a konfiguráció szimmetriacsoportja által indukált operációk mátrixelőállítását megadjuk és ezt a korábbiakban részletezett eljárással kiredukáljuk. A kiredukálással az eredeti φ_i -kből olyan új függvények nyerhetők, amelyek egy-egy irreducibilis előállítás egy-egy sorához tartoznak. Amennyiben az MO-kat ezekből az új bázisokból építjük fel, az ortogonalitás miatt több H_{ij} ill. S_{ij} integrál eltűnik, s könnyen látható, hogy akkor a szekuláris determináns alacsonyabbrendű determinánsok szorzatára esik szét, amelyből az energiasajátértékek meghatározása egyszerűbben végezhető el.

3.§. A SAJÁTÉRTÉKPROBLÉMÁK FELÍRÁSA

3.1. A koordinációs kötés

A kémia fejlődésének már meglehetősen kezdeti szakaszában észrevették, hogy bizonyos, egyébként önállóan is létező vegyületek egymással kapcsolódhatnak és új vegyületet, u.n. molekulavegyületet alkothatnak. Az ilyen molekulavegyületek körébe tartoznak a komplex vegyületek is, amelyek két vagy több kémiai értelemben telített vegyület egymáshatáskor jönnek létre, miközben az alkotórészek eredeti tulajdonságai (pl. vezetőképesség, oldhatóság stb.) különböző mértékű változáson mennek át. A kémiában a komplex vegyületeket más összetett ionoktól stabilitásuk ill. disszociációjuk alapján határolják el [4], emellett számos gyakorlati módszer alkalmas a komplexképződés felismerésére.

A komplex vegyületek Werner-féle elmélete [4] alapján a komplex vegyületeket felépítő atomokat két csoportra, u.n. övezetre szokás felosztani. Az egyik övezetbe soroljuk azokat az atomokat, amelyek egy - középponti helyet elfoglaló, s a komplex vegyület jellegét és legfőbb tulajdonságait meghatározó - u.n. centrális ion, vagy mag körül helyezkednek el meghatározott geometriai alakzatban, míg a másik övezetbe az előbbi övezeten kívül elhelyezkedő atomokat soroljuk. A középponti atom körül kialakuló első övezetet kötési szférának, vagy koordinációs övnek, a második kötési övezetet pedig ionogén szférának szokás nevezni. Ez utóbbi elnevezéssel arra utalunk, hogy az ebben a szférában helyet foglaló ionok a koordinációs övtől könnyen leválaszthatók.

Természetesen egy centrális ion körül nemcsak atomok, hanem atomcsoportok, esetleg ionok is elhelyezkedhetnek. Az első kötési övezetbe, vagy koordinációs övbe tartozó atomokat, atomcsoportokat, esetleg ionokat ligandoknak vagy ligandumoknak, ezek számát pedig koordinációs számnak nevezzük. A koordinációs szám nagysága elsősorban a centrális atom kémiai sajátosságaitól és geometriai méreteitől, másodsorban a ligandok sajátosságaitól függ. Ha a koordinációs övben a centrális atom körül helyet foglaló ligandok száma megegyezik az illető kapcsolatra nézve megállapított koordinációs számmal, akkor koordinátíve telített vegyületről beszélünk.


A koordinációs övön belül a ligandok középponti atomhoz való kapcsolódása különböző természetű és erősségű kémiai kötésekkel jöhet létre, amelyek jellege ill. erős-

sége fokozatos átmenetet mutathat az ionos és kovalens kötésjelleg ill. viszonylag gyengébb vagy erősebb atomkapcsolódások között. A komplex vegyületek nagyobb része a kovalens kötésű vegyületek csoportjába tartozik. A koordinációs kötés elmélete szerint [4] egy komplex vegyület kovalens kötéssel akkor jöhet létre, ha a ligandokon vannak kötésben részt nem vevő elektronpárok s a centrális atom rendelkezik be nem töltött atomi pályákkal. Ebben az esetben a kötés oly módon jön létre, hogy a ligandok ezeket a még nem kötő elektronokat leadják, s kovalens módon stabilis kötést alakítanak ki. A pályák és az elektronszámok vizsgálata azt mutatja, hogy akkor képződnek különösen stabilis komplexek, ha a ligandoktól származó elektronokkal a centrális atom körül nemesgáz-konfigurációnak megfelelő számú elektron foglal helyet. A koordinációs kötés röviden vázolt Sidgwick-Pauling-féle elméletének jelentősége - a vele szemben felvethető hiányosságok mellett - abban van, hogy ezáltal a kémiai kötés fogalma egységes képet nyer, minek következtében a korábban bevezetett különböző típusú fő- és mellékegyértékek feltételezése szükségtelenné válik.

3.2. Modellalkotás

A vizsgálandó K_1 és K_2 komplexionokban szereplő háromszorosan ionizált, hatos koordinációju Co (III) ionok - mint centrum - körül az ammónia molekulák és a hidat alkotó hidroxilionok oktaéderszimmetrikusan helyezkednek el, s az oktaéderek K_1 -nél egy él, K_2 -nél pedig egy lap mentén

kapcsolódnak egymáshoz. A közös él ill. laphoz tartozó csúcson hidroxilionok helyezkednek el (1. ábra).



1. ábra

A továbbiakban ezt az elrendeződést kettős-oktaéderszimmetrikusnak fogjuk nevezni. Ha feltételezzük, hogy a ligandok a középponti Co-ionokat valamennyien érintik, akkor az ionsugarakra vonatkozó irodalmi adatokat [5] felhasználva azt kapjuk, hogy az NH_3 molekulák N-atomjának magja a Co-ionoktól $1,92 \text{ \AA}$, az OH gyökök O-atomjának magja pedig $1,88 \text{ \AA}$ távolságra helyezkednek el. A ligand-centrális ion távolságokban adódó ezen kis eltérés ($0,04 \text{ \AA}$) miatt a komplexek konfigurációja kis mértékben eltér a kettős-oktaéderszimmetriától. Ez azonban a további számításokra nincs különösebb kihatással, mert az utóbbi geometriai alakzat szimmetriatulajdonságai

teljesen megegyeznek a kettős-oktaéder szimmetriatulajdonságaival.

A komplexionok kötéseire vonatkozóan feltételezzük, hogy a kötést a centrális ionok és ligandok azon - nulladik közeli-
tésben kölcsönhatásban nem lévőnek tekinthető - valencia-
elektronjai hozzák létre, amelyek a komplexek kialakulása
előtt kötésben nem vettek részt. Ennek megfelelően a kötés
létrehozását a centrális Co (III) - $3d^6$ külső elektronszerke-
zettel bíró - ionok hat $3d$, az NH_3 molekulák kettő, valamint
az OH-gyökök négy kötésben részt nem vevő elektronjainak
tulajdonítjuk. Hogy a ligandok valóban ennyi elektronnal
vesznek részt a kötés kialakításában, azt nagymértékben
plauzibilissé teszi az is, hogy ilyen körülmények között a
mélyebb, betöltött Co-héjak fölött $d^{10}s^2p^6$ típusu konfigurá-
ció alakul ki, amely éppen egy nemesgázkonfigurációnak felel
meg. Ha a kötésben résztvevő elektronok számát az előző fel-
tevések alapján számoljuk össze, akkor mindkét komplex ese-
tén 36 elektront kapunk eredményül.

Ezek a kölcsönhatásban nem lévőnek tekintett elektro-
nok az 1.1. pontban mondottaknak megfelelően a komplexek
kialakulása után a Pauli-elvet követve egy-egy molekulapá-
lyán helyezkednek el, s ha az atommagokat a többi elektron-
nal együtt rögzítettnek tekintjük, akkor ezen elektronok
összenergiája a komplexek energiáit adják. Ha a ligandok
esetén eltekintünk attól, hogy ezek mint molekulák vesznek
részt a komplexek kialakításában, s a ligandok molekulapá-
lyái helyett közelítően N ill. O atomi pályákat használunk

a komplexek molekulapályáinak felépítésére, akkor az elektrokrok rendelkezésére álló molekulapályák megszerkesztésénél elsősorban a Co (III.) öt $3d$, egy $4s$, három $4p$; az OH-gyök O-atomjának három $2p$, végül az NH_3 molekula N-atomjának egy $2p$ atomi pályáját kell figyelembe vennünk. A továbbiakban ezeket az atomi pályákat fogjuk alapul választani a molekulapályák megszerkesztésénél, megjegyezve, hogy több atomi pálya figyelembevétele esetén a tapasztalattal jobban egyező eredményekhez lehet jutni, viszont az elvégzendő számítások jelentősen megnövekednek. Felhasználva a számítások során nyert azon eredményt, miszerint K_1 -nél az O-atom Co-O kötéstengelyre merőleges atomi pálya a kötésben nem vesz részt, K_1 -nél elegendő két oxigén-pályát figyelembevenni, így a molekulapályákat K_1 -nél 30, K_2 -nél pedig 33 Slater-típusu atomi pálya lineárkombinációiból fogjuk felépíteni.

A komplexionokban kialakuló kötéseknek megfelelően a ligandok atomi pályáit az 1. ábrán vektorokkal ábrázoltuk, amelyek egyben egy-egy ligandhoz tartozó koordinátarendszer tengelyeit is jelentik. A ligandok és a centrális ionok atomi pályáit egymástól az ábrán feltüntetett sorszámok segítségével fogjuk megkülönböztetni oly módon, hogy a megfelelő sorszámot az atomi pálya argumentumába, s ha szükséges, akkor az atom jelét is indexként az atomi pálya mellé írjuk. Így pl. az egyes sorszámú Co ion $4p_x$ atomi pályáját $p_x^{Co}(1)$, a hármas sorszámú N atom $2p_x$ atomi pályáját $p_x^N(3)$ jellel fogjuk jelölni, ha azonban az atomi pálya hovatartozása nyilvánvaló, akkor az atom jelét nem fogjuk feltüntetni.

3.3. A komplexek szimmetriacsoportjai

Vegyünk fel az 1. ábrán látható módon egy-egy jobbsodrású koordinátarendszert, és vizsgáljuk meg azon szimmetriaoperációk összességét, amelyek a konfigurációkat önmagukba viszik át. Közvetlenül belátható, hogy ezek az operációk a műveletek egymás után történő végrehajtására - mint szorzásra - nézve csoportot alkotnak, amelyet az illető konfiguráció **s z i m m e t r i a c s o p o r t**-jának szokás nevezni.

A K_1 konfigurációt önmagába átvivő szimmetriaműveletek a következők:

- E : identikus operáció
- C_2^x : x tengely körüli 180° -os forgatás
- C_2^y : y tengely körüli 180° -os forgatás
- C_2^z : z tengely körüli 180° -os forgatás
- i : a koordinátarendszer origóján át való tükrözés
- σ_{xy} : (x,y) síkra való tükrözés
- σ_{xz} : (x,z) síkra való tükrözés
- σ_{yz} : (y,z) síkra való tükrözés

A fenti szimmetriaműveletekből álló szimmetriacsoportot D_{2h} -val szokás jelölni [6]. Könnyen ellenőrizhető, hogy D_{2h} Abel-féle csoport, következésképpen az egymáshoz konjugált elemekből álló osztályok s száma megegyezik a csoport ($h = 8$) rendjével. Ekkor azonban a (2.1.7.) összefüggésből következik, hogy D_{2h} -nak nyolc irreducibilis

mátrixelőállítása van, amelyek mindegyike (2.1.8.) miatt egydimenziós. Ezeket az egydimenziós előállításokat D_{2h} -nak az 1. táblázatban megadott karakterrendszeréből [6] közvetlenül leolvashatjuk.

1. táblázat

D_{2h}	E	C_2^x	C_2^y	C_2^z	i	σ_{xy}	σ_{xz}	σ_{yz}
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{1u}	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
B_{1g}	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1
B_{1u}	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
B_{3g}	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1
B_{3u}	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1

A K_2 konfigurációt önmagába átvivő szimmetriaműveletek a következők:

E : identikus operáció

C_3^1 : z tengely körüli, $x \rightarrow y$ irányu 120° -os forgatás

C_3^2 : z tengely körüli, $x \rightarrow -y$ irányu 120° -os forgatás

C_2^1 : O_1 -et tartalmazó, $\overline{O_2 O_3}$ -ra merőleges tengely körüli 180° -os forgatás

C_2^2 : O_2 -t tartalmazó, $\overline{O_1 O_3}$ -ra merőleges tengely körüli 180° -os forgatás

C_2^3 : O_3 -t tartalmazó, $\overline{O_1 O_2}$ -re merőleges tengely körüli 180° -os forgatás

- σ_h : az (x,y) síkra való tükrözés
 S_3^1 : az (x,y) síkra való tükrözés, majd a z tengely körül $x \rightarrow y$ irányba történő 120° -os forgatás
 S_3^2 : az (x,y) síkra való tükrözés, majd a z tengely körül $x \rightarrow -y$ irányba történő 120° -os forgatás
 σ_1^1 : O_1 -et tartalmazó, $\overline{O_2 O_3}$ -ra merőleges síkon való tükrözés
 σ_2^2 : O_2 -t tartalmazó, $\overline{O_1 O_3}$ -ra merőleges síkon való tükrözés
 σ_3^3 : O_3 -t tartalmazó, $\overline{O_1 O_2}$ -re merőleges síkon való tükrözés

A fenti szimmetriaműveletekből álló szimmetriacsoportot D_{3h} -val szokás jelölni [7]. Ez a csoport a szorzásra nézve már nem kommutatív - tehát D_{3h} nem Abel-féle -, s könnyen belátható, hogy D_{3h} -nak hat konjugált osztálya van. Ennek megfelelően a (2.1.7.), (2.1.8.) összefüggésekből következik, hogy D_{3h} -nak négy egydimenziós és két kétdimenziós irreducibilis mátrixelőállítása létezik. D_{3h} karakterrendszerét a 2. táblázat tartalmazza [7].

2. táblázat

D_{3h}	E	$2C_3^z$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
A_1^+	1	1	1	1	1	1
A_1^-	1	1	1	-1	-1	-1
A_2^+	1	1	-1	1	1	-1
A_2^-	1	1	-1	-1	-1	1
E^+	2	-1	0	2	-1	0
E^-	2	-1	0	-2	1	0

Ebből a táblázatból az egydimenziós irreducibilis mátrixelőállítások közvetlenül leolvashatók. A kétdimenziós irreducibilis mátrixelőállításokat el kellett készíteni. Egy ilyen előállítás a következő:

$$\begin{aligned} E = G_n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & C_1^1 = S_1^1 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} & C_3^2 = S_3^2 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ C_2^1 = G_v^1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & C_1^2 = G_v^2 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} & C_2^3 = G_v^3 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Közvetlenül látható, hogy ez az előállítás az E^3 -nek felel meg. Az E^3 karakterekkel rendelkező mátrixelőállítást az E^3 -höz tartozó előállításból oly módon nyerhetjük, hogy a csoport első hat eleméhez az előbbi mátrixokat, a további hat elemhez pedig rendre ezek -1 -szeresét rendeljük.

3.4. A sajátterek kiredukálása

Tekintsük a 3.2. pontban kiválasztott 30 ill. 33 atomi pályát az $L^2(R)$ -tér egy 30 ill. 33 dimenziós altere bázisainak, ahol az R jelentse a háromdimenziós Euklidesi teret. Jelöljük ezeket az altereket L_{30} ill. L_{33} -mal. Ezekben az alterekben a D_{2h} ill. D_{3h} szimmetriacsoportok - a 3.3.-ban megadott szimmetriaműveleteknek az R -ben való értelmezésén keresztül - meghatározott indukált operációkat definiálnak, amelyeknek megfelelő mátrixok a szimmetriacsoportok egy teljesen reducibilis ábrázolását adják. Ezen mátrixok alakja a $P(g)$ indukált operációk hatását tartalmazó 3. ill. 4. táblázatokról leolvashatók.

Mint hogy ezen $P(g)$ indukált operációkkal szemben K_1 és K_2 Hamilton-operátora nyilvánvalóan (2.2.2.) értelemben

3. táblázat (K_1)

P(q)-k hatása		E	C_z^x	C_z^y	C_z^z	i	G_{xy}	G_{xz}	G_{yz}
C ₀	S(1)	S(1)	S(2)	S(2)	S(1)	S(2)	S(2)	S(1)	S(1)
	S(2)	S(2)	S(1)	S(1)	S(2)	S(1)	S(1)	S(2)	S(2)
	P _x (1)	P _x (1)	P _x (2)	-P _x (2)	-P _x (1)	-P _x (2)	P _x (2)	P _x (1)	-P _x (1)
	P _x (2)	P _x (2)	P _x (1)	-P _x (1)	-P _x (2)	-P _x (1)	P _x (1)	P _x (2)	-P _x (2)
	P _y (1)	P _y (1)	P _y (2)	-P _y (2)	-P _y (1)	P _y (2)	-P _y (2)	-P _y (1)	P _y (1)
	P _y (2)	P _y (2)	P _y (1)	-P _y (1)	-P _y (2)	P _y (1)	-P _y (1)	-P _y (2)	P _y (2)
	P _z (1)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (1)
	P _z (2)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (2)
	d _{xy} (1)	d _{xy} (1)	d _{xy} (2)	d _{xy} (2)	d _{xy} (1)	-d _{xy} (2)	-d _{xy} (2)	-d _{xy} (1)	-d _{xy} (1)
	d _{xy} (2)	d _{xy} (2)	d _{xy} (1)	d _{xy} (1)	d _{xy} (2)	-d _{xy} (1)	-d _{xy} (1)	-d _{xy} (2)	-d _{xy} (2)
	d _{xz} (1)	d _{xz} (1)	d _{xz} (2)	-d _{xz} (2)	-d _{xz} (1)	-d _{xz} (2)	d _{xz} (2)	d _{xz} (1)	-d _{xz} (1)
	d _{xz} (2)	d _{xz} (2)	d _{xz} (1)	-d _{xz} (1)	-d _{xz} (2)	-d _{xz} (1)	d _{xz} (1)	d _{xz} (2)	-d _{xz} (2)
	d _{yz} (1)	d _{yz} (1)	d _{yz} (2)	-d _{yz} (2)	-d _{yz} (1)	d _{yz} (2)	-d _{yz} (2)	-d _{yz} (1)	d _{yz} (1)
	d _{yz} (2)	d _{yz} (2)	d _{yz} (1)	-d _{yz} (1)	-d _{yz} (2)	d _{yz} (1)	-d _{yz} (1)	-d _{yz} (2)	d _{yz} (2)
	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (1)
	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (1)	d _{x²-y²} (2)	d _{x²-y²} (2)
	d _{z²} (1)	d _{z²} (1)	d _{z²} (2)	d _{z²} (2)	d _{z²} (1)	d _{z²} (2)	d _{z²} (2)	d _{z²} (1)	d _{z²} (1)
	d _{z²} (2)	d _{z²} (2)	d _{z²} (1)	d _{z²} (1)	d _{z²} (2)	d _{z²} (1)	d _{z²} (1)	d _{z²} (2)	d _{z²} (2)
N	P _z (1)	P _z (1)	P _z (4)	P _z (3)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (4)	P _z (1)	P _z (2)
	P _z (2)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (4)	P _z (1)	P _z (4)	P _z (3)	P _z (2)	P _z (1)
	P _z (3)	P _z (3)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (4)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (4)
	P _z (4)	P _z (4)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (4)	P _z (3)
	P _z (5)	P _z (5)	P _z (7)	P _z (8)	P _z (6)	P _z (7)	P _z (8)	P _z (6)	P _z (5)
	P _z (6)	P _z (6)	P _z (8)	P _z (7)	P _z (5)	P _z (8)	P _z (7)	P _z (5)	P _z (6)
	P _z (7)	P _z (7)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (8)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (8)	P _z (7)
	P _z (8)	P _z (8)	P _z (6)	P _z (5)	P _z (7)	P _z (6)	P _z (5)	P _z (7)	P _z (8)
0	P _x (1)	P _x (1)	P _x (1)	P _x (2)	P _x (2)	P _x (2)	P _x (1)	P _x (1)	P _x (2)
	P _x (2)	P _x (2)	P _x (2)	P _x (1)	P _x (1)	P _x (1)	P _x (2)	P _x (2)	P _x (1)
	P _z (1)	P _z (1)	P _x (1)	P _z (2)	P _x (2)	P _z (2)	P _x (1)	P _z (1)	P _x (2)
	P _z (2)	P _z (2)	P _x (2)	P _z (1)	P _x (1)	P _z (1)	P _x (2)	P _z (2)	P _x (1)
spurok		30	0	0	2	0	0	14	10

4. táblázat (K_2)

P(q)-k hatása		E	C_3^1	C_3^2	C_2^1	C_2^2	C_2^3
C ₀	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (2)	S (2)	S (2)
	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (4)	S (4)	S (4)
	P _x (1)	P _x (1)	$-\frac{1}{2}P_x(1) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(1)$	$-\frac{1}{2}P_x(1) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(1)$	P _x (2)	$-\frac{1}{2}P_x(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(2)$	$-\frac{1}{2}P_x(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(2)$
	P _x (2)	P _x (2)	$-\frac{1}{2}P_x(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(2)$	$-\frac{1}{2}P_x(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(2)$	P _x (4)	$-\frac{1}{2}P_x(4) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(4)$	$-\frac{1}{2}P_x(4) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_y(4)$
	P _y (1)	P _y (1)	$-\frac{1}{2}P_y(1) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(1)$	$-\frac{1}{2}P_y(1) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(1)$	P _y (2)	$-\frac{1}{2}P_y(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(2)$	$-\frac{1}{2}P_y(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(2)$
	P _y (2)	P _y (2)	$-\frac{1}{2}P_y(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(2)$	$-\frac{1}{2}P_y(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(2)$	P _y (4)	$-\frac{1}{2}P_y(4) - \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(4)$	$-\frac{1}{2}P_y(4) + \frac{\sqrt{3}}{2}P_x(4)$
	P _z (1)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (2)
	P _z (2)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (4)	P _z (4)	P _z (4)
	d _{xy} (1)	d _{xy} (1)	$-\frac{1}{2}d_{xy}(1) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(1)$	$-\frac{1}{2}d_{xy}(1) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(1)$	d _{xy} (2)	$-\frac{1}{2}d_{xy}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{xy}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(2)$
	d _{xy} (2)	d _{xy} (2)	$-\frac{1}{2}d_{xy}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{xy}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(2)$	d _{xy} (4)	$-\frac{1}{2}d_{xy}(4) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(4)$	$-\frac{1}{2}d_{xy}(4) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{x^2-y^2}(4)$
	d _{xz} (1)	d _{xz} (1)	$-\frac{1}{2}d_{xz}(1) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(1)$	$-\frac{1}{2}d_{xz}(1) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(1)$	d _{xz} (2)	$-\frac{1}{2}d_{xz}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{xz}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(2)$
	d _{xz} (2)	d _{xz} (2)	$-\frac{1}{2}d_{xz}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{xz}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(2)$	d _{xz} (4)	$-\frac{1}{2}d_{xz}(4) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(4)$	$-\frac{1}{2}d_{xz}(4) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{yz}(4)$
	d _{yz} (1)	d _{yz} (1)	$-\frac{1}{2}d_{yz}(1) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(1)$	$-\frac{1}{2}d_{yz}(1) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(1)$	d _{yz} (2)	$-\frac{1}{2}d_{yz}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{yz}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(2)$
	d _{yz} (2)	d _{yz} (2)	$-\frac{1}{2}d_{yz}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{yz}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(2)$	d _{yz} (4)	$-\frac{1}{2}d_{yz}(4) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(4)$	$-\frac{1}{2}d_{yz}(4) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xz}(4)$
	d _{x^2-y^2} (1)	d _{x^2-y^2} (1)	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(1) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(1)$	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(1) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(1)$	d _{x^2-y^2} (2)	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(2)$
	d _{x^2-y^2} (2)	d _{x^2-y^2} (2)	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(2)$	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(2)$	d _{x^2-y^2} (4)	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(4) - \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(4)$	$-\frac{1}{2}d_{x^2-y^2}(4) + \frac{\sqrt{3}}{2}d_{xy}(4)$
	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)
	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (4)	d _{z^2} (4)	d _{z^2} (4)
N	P _z (1)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (4)	P _z (5)	P _z (6)
	P _z (2)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (4)	P _z (6)	P _z (4)	P _z (5)
	P _z (3)	P _z (3)	P _z (4)	P _z (2)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (4)
	P _z (4)	P _z (4)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (3)
	P _z (5)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (4)	P _z (3)	P _z (1)	P _z (2)
	P _z (6)	P _z (6)	P _z (4)	P _z (5)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (1)
O	P _x (1)	P _x (1)	P _x (3)	P _x (2)	P _y (4)	P _y (3)	P _y (2)
	P _x (2)	P _x (2)	P _x (4)	P _x (3)	P _y (5)	P _y (2)	P _y (1)
	P _x (3)	P _x (3)	P _x (2)	P _x (4)	P _y (2)	P _y (4)	P _y (3)
	P _y (1)	P _y (1)	P _y (3)	P _y (2)	P _x (4)	P _x (3)	P _x (2)
	P _y (2)	P _y (2)	P _y (4)	P _y (5)	P _x (5)	P _x (2)	P _x (1)
	P _y (3)	P _y (3)	P _y (2)	P _y (4)	P _x (2)	P _x (1)	P _x (3)
	P _z (1)	P _z (1)	P _z (3)	P _z (2)	-P _z (1)	-P _z (3)	-P _z (2)
	P _z (2)	P _z (2)	P _z (4)	P _z (3)	-P _z (3)	-P _z (2)	-P _z (1)
	P _z (3)	P _z (3)	P _z (2)	P _z (4)	-P _z (2)	-P _z (1)	-P _z (3)
spurok		33	0	0	-1	-1	-1

4. táblázat (K_2)

P(q)-k hatása		G_h	S_3^1	S_3^2	G_v^1	G_v^2	G_v^3
C ₀	S (1)	S (2)	S (2)	S (2)	S (1)	S (1)	S (1)
	S (2)	S (1)	S (1)	S (1)	S (2)	S (2)	S (2)
	P _x (1)	P _x (2)	$-\frac{1}{2} P_x (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (2)$	$-\frac{1}{2} P_x (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (2)$	P _x (1)	$-\frac{1}{2} P_x (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (1)$	$-\frac{1}{2} P_x (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (1)$
	P _x (2)	P _x (1)	$-\frac{1}{2} P_x (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (1)$	$-\frac{1}{2} P_x (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (1)$	P _x (2)	$-\frac{1}{2} P_x (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (2)$	$-\frac{1}{2} P_x (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_y (2)$
	P _y (1)	-P _y (2)	$\frac{1}{2} P_y (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (2)$	$\frac{1}{2} P_y (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (2)$	-P _y (1)	$\frac{1}{2} P_y (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (1)$	$\frac{1}{2} P_y (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (1)$
	P _y (2)	-P _y (1)	$\frac{1}{2} P_y (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (1)$	$\frac{1}{2} P_y (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (1)$	-P _y (2)	$\frac{1}{2} P_y (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (2)$	$\frac{1}{2} P_y (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} P_x (2)$
	P _z (1)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (1)
	P _z (2)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (2)	P _z (2)
	d _{xy} (1)	-d _{xy} (2)	$\frac{1}{2} d_{xy} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (2)$	$\frac{1}{2} d_{xy} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (2)$	-d _{xy} (1)	$\frac{1}{2} d_{xy} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (1)$	$\frac{1}{2} d_{xy} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (1)$
	d _{xy} (2)	-d _{xy} (1)	$\frac{1}{2} d_{xy} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (1)$	$\frac{1}{2} d_{xy} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (1)$	-d _{xy} (2)	$\frac{1}{2} d_{xy} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (2)$	$\frac{1}{2} d_{xy} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{x^2-y^2} (2)$
	d _{xz} (1)	d _{xz} (2)	$-\frac{1}{2} d_{xz} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (2)$	$-\frac{1}{2} d_{xz} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (2)$	d _{xz} (1)	$-\frac{1}{2} d_{xz} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (1)$	$-\frac{1}{2} d_{xz} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (1)$
	d _{xz} (2)	d _{xz} (1)	$-\frac{1}{2} d_{xz} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (1)$	$-\frac{1}{2} d_{xz} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (1)$	d _{xz} (2)	$-\frac{1}{2} d_{xz} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (2)$	$-\frac{1}{2} d_{xz} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{yz} (2)$
	d _{yz} (1)	-d _{yz} (2)	$\frac{1}{2} d_{yz} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (2)$	$\frac{1}{2} d_{yz} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (2)$	-d _{yz} (1)	$\frac{1}{2} d_{yz} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (1)$	$\frac{1}{2} d_{yz} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (1)$
	d _{yz} (2)	-d _{yz} (1)	$\frac{1}{2} d_{yz} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (1)$	$\frac{1}{2} d_{yz} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (1)$	-d _{yz} (2)	$\frac{1}{2} d_{yz} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (2)$	$\frac{1}{2} d_{yz} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xz} (2)$
	d _{x^2-y^2} (1)	d _{x^2-y^2} (2)	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (2)$	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (2)$	d _{x^2-y^2} (1)	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (1)$	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (1)$
	d _{x^2-y^2} (2)	d _{x^2-y^2} (1)	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (1) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (1)$	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (1) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (1)$	d _{x^2-y^2} (2)	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (2) + \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (2)$	$-\frac{1}{2} d_{x^2-y^2} (2) - \frac{\sqrt{3}}{2} d_{xy} (2)$
	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)
	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (1)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)	d _{z^2} (2)
N	P _z (1)	P _z (4)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (3)
	P _z (2)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (4)	P _z (3)	P _z (1)	P _z (2)
	P _z (3)	P _z (6)	P _z (4)	P _z (5)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (1)
	P _z (4)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (4)	P _z (5)	P _z (6)
	P _z (5)	P _z (2)	P _z (3)	P _z (1)	P _z (6)	P _z (4)	P _z (5)
	P _z (6)	P _z (3)	P _z (1)	P _z (2)	P _z (5)	P _z (6)	P _z (4)
O	P _x (1)	P _y (1)	P _y (3)	P _y (2)	P _x (1)	P _x (3)	P _x (2)
	P _x (2)	P _y (2)	P _y (1)	P _y (3)	P _x (3)	P _x (2)	P _x (1)
	P _x (3)	P _y (3)	P _y (2)	P _y (1)	P _x (2)	P _x (1)	P _x (3)
	P _y (1)	P _x (1)	P _x (3)	P _x (2)	P _y (1)	P _y (3)	P _y (2)
	P _y (2)	P _x (2)	P _x (1)	P _x (3)	P _y (3)	P _y (2)	P _y (1)
	P _y (3)	P _x (3)	P _x (2)	P _x (1)	P _y (2)	P _y (1)	P _y (3)
	P _z (1)	P _z (1)	P _z (3)	P _z (2)	-P _z (1)	-P _z (3)	-P _z (2)
	P _z (2)	P _z (2)	P _z (1)	P _z (3)	-P _z (3)	-P _z (2)	-P _z (1)
	P _z (3)	P _z (3)	P _z (2)	P _z (1)	-P _z (2)	-P _z (1)	-P _z (3)
spurok		3	0	0	9	9	9

szimmetrikus, H-ra és a megfelelő szimmetriacsoportra alkalmazhatók 2.2.-ben megismert általános eredményeink. Mint láttuk, a kiredukálás első lépését a teljesen reducibilis mátrixelőállítás kiredukálása képezi, amelyet a (2.1.9.) formula alapján kezdhetünk el. Ha a mátrixelőállításokat is L-lel ill. a karaktertáblázatokban használt jelekkel jelöljük, akkor az alterekben elért L_{30} ill. L_{33} teljesen reducibilis előállítások kiredukálásából a következő eredmények nyerhetők:

$$L_{30} = 7A_{1g} + 7B_{1u} + 4B_{2g} + 4B_{3u} + 3B_{2u} + 3B_{3g} + B_{1g} + A_{1u}, \quad (3.4.1.)$$

$$L_{33} = 6E' + 5E'' + 5A_1' + 5A_2' + A_2' \quad (3.4.2.)$$

Az irreducibilis altereket kifeszítő bázisokat (2.2.6.) és (2.2.7.) formulák alkalmazásával lehet meghatározni, ezeket az 5. ill. 6. táblázatok tartalmazzák. A továbbiakban ezen új bázisfüggvények lineárkombinációjával fogjuk a komplexek molekulapályáit előállítani.

4.5. A SAJÁTÉRTÉKPROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Ha a kiredukálással nyert 5. ill. 6. táblázatokban szereplő függvényekből alkotjuk meg a komplexek molekulapályáit, akkor az (1.2.3.) szekuláris determináns a 2.2.-ben mondottaknak megfelelően alacsonyabbrendű determinánsok szorzatára esik szét. Részletesebben, a K_1 -hez tartozó szekuláris determináns a (3.4.1.) felbontásnak megfelelően két heted-, két negyed-, két harmad- és két elsőrendű, a K_2 -höz tartozó szekuláris determináns pedig a (3.4.2.) felbontásnak megfelelően egy

5. táblázat (K_1)

	Co	O	N
A_{1g}	$d_{z^2}(1) + d_{z^2}(2)$ $d_{x^2-y^2}(1) + d_{x^2-y^2}(2)$ $s(1) + s(2)$ $p_z(1) + p_z(2)$	$p_x(1) + p_x(2) + p_z(1) + p_z(2)$	$p_z(1) + p_z(2) + p_z(3) + p_z(4)$ $p_z(5) + p_z(6) + p_z(7) + p_z(8)$
A_{1u}	$d_{xy}(1) + d_{xy}(2)$		
B_{1g}	$d_{xy}(1) - d_{xy}(2)$		
B_{1u}	$d_{z^2}(1) - d_{z^2}(2)$ $d_{x^2-y^2}(1) - d_{x^2-y^2}(2)$ $s(1) - s(2)$ $p_z(1) - p_z(2)$	$p_x(1) - p_x(2) - p_z(1) + p_z(2)$	$p_z(1) + p_z(2) - p_z(3) - p_z(4)$ $p_z(5) + p_z(6) - p_z(7) - p_z(8)$
B_{2g}	$d_{xz}(1) - d_{xz}(2)$ $p_x(1) - p_x(2)$	$p_x(1) + p_x(2) - p_z(1) - p_z(2)$	$p_z(1) - p_z(2) + p_z(3) - p_z(4)$
B_{2u}	$d_{yz}(1) - d_{yz}(2)$ $p_y(1) - p_y(2)$		$p_z(5) - p_z(6) - p_z(7) + p_z(8)$
B_{3g}	$d_{yz}(1) + d_{yz}(2)$ $p_y(1) + p_y(2)$		$p_z(5) - p_z(6) + p_z(7) - p_z(8)$
B_{3u}	$d_{xz}(1) + d_{xz}(2)$ $p_x(1) + p_x(2)$	$p_x(1) - p_x(2) + p_z(1) - p_z(2)$	$p_z(1) - p_z(2) - p_z(3) + p_z(4)$

6. táblázat (K_2)

	Co	O	N
A'_1	$d_{z^2}(1) + d_{z^2}(2)$ $s(1) + s(2)$ $p_z(1) + p_z(2)$	$p_x(1) + p_y(1) + p_x(2) +$ $+ p_y(2) + p_x(3) + p_y(3)$	$p_z(1) + p_z(2) + p_z(3) +$ $+ p_z(4) + p_z(5) + p_z(6)$
A'_2		$p_z(1) + p_z(2) + p_z(3)$	
A''_2	$d_{z^2}(1) - d_{z^2}(2)$ $s(1) - s(2)$ $p_z(1) - p_z(2)$	$p_x(1) + p_x(2) + p_x(3) -$ $- p_y(1) - p_y(2) - p_y(3)$	$p_z(1) + p_z(2) + p_z(3) -$ $- p_z(4) - p_z(5) - p_z(6)$
E'	$d_{x^2-y^2}(1) + d_{x^2-y^2}(2)$ $d_{xz}(1) + d_{xz}(2)$ $p_x(1) + p_x(2)$	$2p_x(1) + 2p_y(1) - p_x(2) -$ $- p_y(2) - p_x(3) - p_y(3)$ $p_z(2) - p_z(3)$	$2p_z(1) + 2p_z(4) - p_z(2) -$ $- p_z(3) - p_z(5) - p_z(6)$
	$d_{xy}(1) - d_{xy}(2)$ $d_{yz}(2) - d_{yz}(1)$ $p_y(2) - p_y(1)$	$p_x(2) + p_y(2) - p_x(3) - p_y(3)$ $p_z(2) + p_z(3) - 2p_z(1)$	$p_z(3) + p_z(6) - p_z(2) - p_z(5)$
E''	$d_{xy}(1) + d_{xy}(2)$ $d_{yz}(1) + d_{yz}(2)$ $p_y(1) + p_y(2)$	$p_x(2) + p_y(3) - p_y(2) - p_x(3)$	$p_z(2) + p_z(6) - p_z(3) - p_z(5)$
	$d_{x^2-y^2}(2) - d_{x^2-y^2}(1)$ $d_{xz}(1) - d_{xz}(2)$ $p_x(1) - p_x(2)$	$2p_y(1) - 2p_x(1) + p_x(2) +$ $+ p_x(3) - p_y(2) - p_y(3)$	$2p_z(1) - 2p_z(4) + p_z(5) +$ $+ p_z(6) - p_z(2) - p_z(3)$

hatod-, három ötöd- és egy elsőrendű determináns szorzataként áll elő. A további feladatot a bennük szereplő integrálok kiszámítása képezi.

4.1. Az átfedési integrálok kiszámítása

A 3.2. pontban mondottaknak megfelelően a molekulapályákat Slater-típusú atomi pályákból építjük fel. A Slater-függvények [8]

$$R(r) = r^{n-1} \cdot e^{-\frac{Z-\sigma}{na_0} \cdot r} \quad (4.1.1.)$$

radiális eloszlásában Z az illető atom rendszámát, σ a zárt héjakon lévő elektronoknak a mag potenciáletterét leárnyékoló hatását jellemző árnyékolási tényező, n az $u.n.$ effektív főkvantumszámot, a_0 pedig az atomi hosszegységet jelenti. A $Z_e = Z - \sigma$ mennyiség, az $u.n.$ effektív magtöltés értéke [9] a Co (III) ion 3d pályájára 7,25, a 4s, 4p pályákra 5,10; az N-atom 2p pályájára 3,90; az O-atom 2p pályájára pedig 4,55. Az n effektív főkvantumszám értéke 1, 2, 3, 4, 5 főkvantumszám mellett rendre 1, 2, 3, 3,7, 4. A 3.2. pontban mondottak alapján könnyen belátható, hogy mindkét komplexben a Co-ionok középpontjainak távolsága 2,6587 Å. A ligand-ligand kölcsönhatásokat azok kicsinyisége miatt figyelmen kívül hagyjuk. A fenti adatok ismeretében a szekuláris determinánsok felírhatók, amelyekben 5. ill. 6. táblázatbeli függvényekből képezett S_{ij} és H_{ij} típusú integrálok lépnek fel. Tekintettel arra, hogy az 5. ill. 6. táblázatban szereplő függvények Slater-függvények

lineárkombinációi, az S_{1j} átfedési integrálok kiszámítása Slater-függvényekből alkotott átfedések kiszámítására vezetődik vissza. Ez utóbbi integrálok kiszámítása, ha az integrálban szereplő mindkét Slater-függvény effektív főkvantumszáma egész, elliptikus koordinátákban, ha azonban az egyik függvény effektív főkvantumszáma tört ($n=3,7$), de a másik egész effektív főkvantumszámú, akkor kétcentrumú koordinátákban lehetséges. Ezek az integrálok lényegében tabellázva vannak [10].

Az előbbi integrálok mellett mindkét komplexnél fellépnek olyan integrálok is, amelyekben mindkét Slater-függvény effektív főkvantumszáma tört. Ez az eset a centrális ionok (4s, 4s), (4p, 4p), (4s, 4p) átfedéseiben fordul elő. Az ilyen típusú átfedések kiszámítása az előző módszerrel nem lehetséges, ezért ezeknek az átfedéseknek a kiszámítására közelítő módszert kellett megadni. Evégből a 3,7 effektív főkvantumszámú 4s, 4p atomi pályákat egész effektív főkvantumszámú Slater-függvények lineárkombinációja alakjában állítottuk elő, s a lineárkombinációs együtthatókat abból a feltételből határoztuk meg, hogy a közelítő függvény és a 4s, 4p Slater-függvény különbségének négyzetintegrálja minimális legyen. Ha a 4s, 4p atomi pályák radiális részét az

$$R_k(r) = (a_1 r + a_2 r^2 + a_3 r^3 + a_4 r^4) \cdot e^{-\alpha r}$$

függvénnyel közelítjük, (ahol $\alpha \equiv Z_e/n a_0$) akkor az

$$\int_0^{\infty} [r^{2,7} - (a_1 r + a_2 r^2 + a_3 r^3 + a_4 r^4)]^2 \cdot e^{-2\alpha r} r^2 dr = \min.$$

feltételből a lineárkombinációs együtthatók értékére a következőket lehet nyerni:

$$a_1 = -0,047\ 530$$

$$a_2 = 0,360\ 146$$

$$a_3 = 0,728\ 295$$

$$a_4 = -0,041\ 617$$

A közelítés mértékére következtetni lehet pl. oly módon, hogy ezzel a közelítő függvénnyel egzaktul is kiszámítható átfedést határozunk meg. Ilyen vizsgálatokból az adódott, hogy a közelítés a komplexekben előforduló kötéstávolságok értékeinél négy értékes jegynél nem rosszabb, sőt ($4s, 2p^6$) típusu átfedés esetén - $\alpha = 2,6$ és $R = 1,9231\ \text{\AA}$ mellett - a közelítő függvénnyel nyert ($0,398\ 686$) érték a közvetlenül számított ($0,398\ 685$) értékkel még jobban megegyezett.

Az 5. ill. 6. táblázatbeli függvényekből képezett átfedési integrálok értékei a következők:

K_1	A_{1g}	B_{1u}
S_{13}	0,045 31	-0,070 81
S_{14}	-0,070 36	0,114 71
S_{15}	0,120 28	0,025 24
S_{16}	0,052 40	0,054 66
S_{17}	-0,104 81	-0,109 33
S_{25}	0,042 31	-0,127 67
S_{26}	0,092 55	0,092 77
S_{27}	-0,185 11	-0,185 55
S_{34}	-0,298 13	0,698 08
S_{35}	0,155 75	-0,233 33
S_{36}	0,205 56	0,307 96
S_{37}	0,205 56	0,307 96
S_{45}	-0,251 66	0,078 78
S_{46}	0,185 65	0,290 17

K_1	B_{2g}	B_{3u}
S_{12}	0,062 96	-0,048 75
S_{13}	0,171 52	-0,168 30
S_{14}	0,187 10	0,183 60
S_{23}	-0,342 22	0,054 09
S_{24}	0,252 46	0,199 20
	B_{2u}	B_{3g}
S_{12}	-0,048 75	0,062 96
S_{23}	0,281 71	0,357 03
K_2	A'_1	A''_2
S_{12}	0,045 31	-0,070 81
S_{13}	-0,070 36	0,114 71
S_{14}	0,147 31	-0,030 92
S_{15}	0,064 18	0,066 95
S_{23}	-0,298 13	0,698 08
S_{24}	0,190 75	0,285 77
S_{25}	0,251 76	0,377 18
S_{34}	-0,308 22	-0,096 49
S_{35}	0,227 38	0,355 38
	E'	E''
S_{14}	-0,018 32	-0,055 28
S_{15}	0,036 83	0,040 17
S_{16}	-0,040 08	-
S_{23}	-0,048 75	0,062 96
S_{24}	0,145 75	-0,148 54
S_{25}	0,073 06	0,162 04
S_{26}	0,159 00	-
S_{34}	-0,046 84	0,296 37
S_{35}	-0,187 01	0,218 64
S_{36}	0,172 51	-

A táblázatban nem szereplő integrálok közül minden i -re $S_{ii} = 1$, a többi integrál pedig zérus.

4.2. H_{ij} típusu integrálok kiszámítása

Az új bázisfüggvényekből képezett H_{ij} típusu integrálok kiszámítására Wolfsberg és Helmholtz atomi pályák átfedéseire vonatkozó

$$h_{ij} = 0,5 \cdot F_x s_{ij} (h_{ii} + h_{jj}) \quad (4.2.1.)$$

félempirikus közelítő formuláját [11] használjuk fel, amelyben s_{ij} a megfelelő Slater-féle atomi pályákból alkotott átfedési integrál, F_x variációs paraméter, h_{ii} ill. h_{jj} pedig a megfelelő atomi pályához tartozó ionizációs energia. A számításokban az ionizációs energiára a Co 4s pályája esetén -7,84 eV, 4p pályája esetén -4,08 eV, 3d pályája esetén -9,38 eV [12]; az N 2p pályája esetén -13,81 eV; végül az O 2p σ típusu pályája esetén -11,24 eV, 2p π pályája esetén pedig -10,54 eV [13] értéket veszünk figyelembe. Az F_x variációs paraméter értéke σ típusu kötésekre 2,20, π típusu kötésekre pedig 2,65 [9]. Ezeket figyelembevéve a H_{ij} típusu integrálok értékeire az alábbiak nyerhetők:

K_1	.	A_{lg}	.	B_{lu}
H_{11}	.	- 9,836	.	- 8,884
H_{22}	.	- 9,417	.	- 9,343
H_{33}	.	-10,448	.	- 1,986
H_{44}	.	- 5,526	.	- 0,548
H_{55}	.	-11,24	.	-11,24
H_{66}	.	-13,81	.	-13,81
H_{77}	.	-13,81	.	-13,81

K_1	.	A_{1g}	.	B_{1u}
H_{13}	.	- 0,858 3	.	1,341 4
H_{14}	.	1,041 7	.	- 1,698
H_{15}	.	- 2,996	.	- 0,852 3
H_{16}	.	- 1,336 8	.	- 1,394 5
H_{17}	.	2,673 6	.	2,789
H_{25}	.	- 0,801 9	.	3,054
H_{26}	.	- 2,361	.	- 2,367
H_{27}	.	4,722	.	4,733
H_{34}	.	3,909	.	- 9,153
H_{35}	.	- 3,269	.	4,897
H_{36}	.	- 4,985	.	- 7,334
H_{37}	.	- 4,895	.	- 7,334
H_{45}	.	4,494	.	- 0,931 4
H_{46}	.	- 3,653	.	- 5,710
	.	B_{2g}	.	B_{3u}
H_{11}	.	- 9,082	.	- 9,667
H_{22}	.	- 2,040	.	- 5,350
H_{33}	.	-11,24	.	-11,24
H_{44}	.	-13,81	.	-13,81
H_{12}	.	- 1,123	.	0,869 4
H_{13}	.	- 3,890	.	3,817
H_{14}	.	- 4,773	.	- 4,683
H_{23}	.	6,112	.	- 0,639 4
H_{24}	.	- 4,968	.	- 3,920
	.	B_{2u}	.	B_{3g}
H_{11}	.	- 9,667	.	- 9,082
H_{22}	.	- 5,350	.	- 2,040
H_{33}	.	-13,81	.	-13,81
H_{12}	.	0,869 4	.	- 1,123
H_{23}	.	- 5,544	.	- 7,026

K_1	.	B_{lg}	.	A_{lu}
H_{11}	✓	- 9,417	.	- 9,343

K_2	.	A'_1	.	A''_2
H_{11}	.	- 9,836	.	- 8,884
H_{22}	.	-10,448	.	- 1,986
H_{33}	.	- 5,526	.	- 0,548
H_{44}	.	-11,24	.	-11,24
H_{55}	.	-13,81	.	-13,81
H_{12}	.	- 0,858 3	.	1,341 4
H_{13}	.	1,041 7	.	- 1,698
H_{14}	.	- 3,670	.	1,043 9
H_{15}^y	.	- 1,637	.	- 1,708
H_{23}	.	3,909	.	- 9,153
H_{24}	.	- 4,003	.	- 5,998
H_{25}	.	- 5,996	.	- 8,982
H_{34}	.	55,505	.	1,140 7
H_{35}	.	- 4,474	.	- 6,993

.	E'	.	E''
H_{11}	- 9,417	.	- 9,343
H_{22}	- 9,667	.	- 9,082
H_{33}	- 5,350	.	- 2,040
H_{44}	-11,24	.	-11,24
H_{55}	-10,54	.	-13,81
H_{66}	-13,81	.	-
H_{14}	0,347 2	.	+ 1,322 5
H_{15}	- 0,972 1	.	- 1,024 8
H_{16}	1,022 3	.	-
H_{23}	0,869 4	.	- 1,122 9
H_{24}	- 3,306	.	3,369
H_{25}	- 1,928	.	- 4,133

K_1	.	E'	.	E''
H_{26}	.	- 4,056	.	-
H_{34}	.	0,553 7	.	- 5,293
H_{35}	.	3,623	.	- 4,302
H_{36}	.	- 3,395	.	-
.	.	A_2^1	.	
H_{11}	.	-10,54	.	

A táblázatban nem szereplő integrálok zérusok.

4.3. Elektronenergiák

A 4.1. és 4.2. pontban megadott S_{ij} és H_{ij} integrálok felírt szekuláris determinánsokból az elektronenergiák meghatározására K_1 -nél két heted-, két negyed-, két harmad- és két elsőfoku, a K_2 komplexnél pedig egy hatod-, három ötöd- és egy elsőfoku algebrai egyenlet nyerhető, amelyek gyökei közvetlenül a molekulapályákhoz tartozó energiákat adják. Ezek a következők:

K_1

A_{1g}	.	B_{1u}	B_{2g}	.	B_{3u}
- 0,259	.	+59,168	+ 3,94	.	- 3,24
- 6,004	.	- 1,417	- 6,02	.	- 6,84
- 6,766	.	- 5,905	-12,26	.	-12,65
- 9,275	.	- 8,328	-14,72	.	-15,25
-12,622	.	-12,160			
-14,883	.	-14,794			
-15,331	.	-15,207			
B_{1g}	.	A_{1u}	B_{2u}	.	B_{3g}
- 9,417	.	- 9,343	- 3,25	.	+ 1,881
			- 9,70	.	- 9,11
			-14,09	.	-14,14

K_2

A_1'	.	A_2''	E'	.	E''
1,158	.	+49,096	- 3,091	.	+ 2,310
- 5,772	.	- 0,3149	- 6,724	.	- 6,523
- 9,470	.	- 8,472	- 9,193	.	- 9,297
-12,881	.	-11,920	-11,156	.	-12,165
-15,199	.	-14,923	-12,076	.	-14,568
A_2'			-14,603	.	
-10,54					

Az adatok eV-ban értendők.

4.4. Elektronátmenetek

A 3.2. pontban figyelembevett 36-36 elektron a 4.3. pontban megadott energianivókat a Pauli-elvnek megfelelően töltik be. Az E' -höz és E'' -höz tartozó - kétszeresen degenerált - energiaállapotokban ennek megfelelően négy-négy, a többi energiaállapotban pedig két-két ellentétes spinű elektron foglal helyet. Ennek ismeretében a komplexionok spektrumait oly módon származtathatjuk, hogy az elektronok megengedett kvantumátmeneteihez tartozó frekvenciákat, vagy hullámszámokat a Bohr-féle frekvenciafeltétel alapján kiszámítjuk. A kvantumátmenetekre vonatkozó kiválasztási szabályok a következők [14]:

K_1

$A_{1g} \longleftrightarrow B_{1u}$	$A_{1u} \longleftrightarrow B_{2g}$	$B_{1g} \longleftrightarrow B_{2u}$
$A_{1g} \longleftrightarrow B_{2u}$	$A_{1u} \longleftrightarrow B_{3g}$	$B_{2u} \longleftrightarrow B_{3g}$
$A_{1g} \longleftrightarrow B_{3u}$	$B_{2g} \longleftrightarrow B_{3u}$	$B_{1u} \longleftrightarrow B_{3g}$
$A_{1u} \longleftrightarrow B_{1g}$	$B_{1g} \longleftrightarrow B_{3u}$	$B_{1u} \longleftrightarrow B_{2g}$

K_2			
$A_1' \leftrightarrow A_2'$	$A_2' \leftrightarrow E'$	$E' \leftrightarrow E'$	
	$A_2' \leftrightarrow E''$		
$A_1' \leftrightarrow E'$	$E'' \leftrightarrow E''$	$E' \leftrightarrow E''$	

A kiválasztási szabályokat figyelembevéve a megengedett elektronátmenetekhez tartozó hullámszámok cm^{-1} -ben a következők:

K_1			
12 603	29 820	49 669	63 400
18 622	43 520	49 781	63 578
18 751	43 730	49 862	64 772
19 646	46 651	51 274	64 893
20 816	47 280	53 493	65 103
23 672	47 474	53 622	65 240
25 859	48 611	54 195	66 442
26 787	48 692	59 092	68 104
27 190	49 539	62 069	68 451

K_2			
839	23 979	43 545	50 863
2 235	29 756	43 650	51 468
6 656	29 796	43 900	54 275
8 052	30 789	44 803	60 101
10 868	35 573	45 521	63 288
15 838	35 759	48 458	63 570
20 760	37 380	49 184	64 909
22 155	43 181	49 604	65 071
22 381	43 367	49 676	65 192
23 261	43 440	50 072	67 774


A táblázatokban csak a $70\,000\text{ cm}^{-1}$ -nél kisebb hullámszámokat tüntettük fel.

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE


A hullámszámokra kapott eredmények alkalmasak arra, hogy számításainkat a tapasztalattal összehasonlítsuk. A komplexionok kloridjainak vizes oldataira nyert abszorpciós görbéivel (2. ill. 3. ábra, itt ϵ a moláris dekadikus extinkciókoefficiens) [15] való összehasonlítás azt mutatja, hogy a számított eredmények a tapasztalati eredményekkel lényegében összhangban vannak. Mind a kísérleti, mind az elméleti eredmények szerint mindkét komplex vegyület a $10\text{--}50\ 000\ \text{cm}^{-1}$ hullámszámtartományba eső fényt gyakorlatilag teljesen abszorbeálja.

Az eredmények tapasztalattal való egyezése azonban K_1 -nél nem tekinthető kielégítőnek. Itt egyrészt a számított spektrumvonalak a kísérletileg meghatározott vonalakhoz viszonyítva igen erősen eltolódnak a nagyobb hullámszámok felé, másrészt a maximum és minimum helyek egyezése sem megfelelő. Az egyezés különösen az elméletileg nyert $30\text{--}43\ 000\ \text{cm}^{-1}$ hullámszámtartományban rossz. A K_2 -re kapott eredmények kielégítőnek tekinthetők. Itt a spektrumvonalak eltolódása (kb. $2\text{--}4\ 000\ \text{cm}^{-1}$) nem túlságosan nagy, továbbá a maximum és minimumhelyek azonosítása is elég jó közelítésben lehetséges. Ezekről az eltérésektől eltekintve azt lehet mondani, hogy az alkalmazott módszer alapján a komplexekre lényegében elfogadható eredmények nyerhetők.

A kísérleti eredményektől való eltérésnek számos oka van. Egyrészt az alkalmazott LCAO-MO módszer sem egzakt,



2. ábra (K_1)



3. ábra (K_2)

másrészt a komplexekre vonatkozó - 3.2. pontban tett - feltevések, továbbá az ionizációs energiák - 4.2. pontbeli - értékei sem tekinthetők a valóságos viszonyok jó közelítéseinek. Hogy az elméletileg nyert eredmények tapasztalattal való egyezése nem lehet a legjobb, arra már a 4.3. pontban kapott eredményekből is következtetni lehet, ugyanis az ott kapott pozitív - de főként a B_{1u} -hoz tartozó +59,168 eV és az A''_2 -höz tartozó +49,096 eV - energiák már eleve erre mutatnak. Ezekből a túlságosan nagy energiaeltolódásokból viszont arra lehet következtetni, hogy egyrészt az S_{ij} átfedési integrálok - következésképpen a kiszámításuknál felhasznált, s elsősorban is az ionsugarakra vonatkozó adatok - nem elég pontosak, másrészt a H_{ij} integrálok kiszámítására alkalmazott (4.2.1.) Wolfsberg-Helmholtz-féle formula - legalább is az F_x paraméter felhasznált értékei mellett - rossz közelítés. Ez utóbbi következtetést indokolja az is, hogy az energiaértékek az F_x paramétertől elég erősen függenek, mégpedig a vizsgálatok szerint F_x növekedésével egyre magasabb, ill. nagyobb számú pozitív energiaérték adódik. A kísérleti és elméleti eredmények közötti eltérést azonban - bár elsősorban az előbbiek következménye - a számításoknál alkalmazott közelítő módszer egészének kell tulajdonítanunk.

Az elmondottak egyuttal több lehetőséget adnak a kísérleti és elméleti eredmények egyezésének a megjavítására. Az egyik - legközelfekvőbb - lehetőség az, hogy - a sajátértékproblémákat továbbra is a komplexionok 3.2.-ben

megadott modelljei alapján tárgyalva a - a H_{ij} integrálokat a (4.2.1.) Wolfsberg-Helmholtz-formula alkalmazása helyett egzaktul kiszámítjuk. Egy másik lehetőség az alkalmazott modellek módosításában van, amelyhez azonban a komplexionok szerkezetére vonatkozó pontosabb kísérleti adatokra van szükség. Ezek a kísérleti adatok a dolgozat témájának kiválasztásánál nem álltak rendelkezésünkre. Végül az eredmények javulását várhatjuk további atomi pályák, valamint az elektronok közötti kölcsönhatások figyelembevételétől is. Tekintettel azonban arra, hogy a H_{ij} integrálok egzakt kiszámítása, valamint további atomi pályák, és az elektronok közötti kölcsönhatások figyelembevétele az elvégzendő számításokat - a dolgozatban alkalmazott közelítéshez viszonyítva - jelentős mértékben megnövelik (amellyel számos esetben nem jár együtt az eredmények kívánt mértékű javulása), molekuláris problémák tárgyalásánál többnyire megelégszünk a dolgozatban alkalmazott közelítés alapján nyerhető eredményekkel.

Ezen a helyen mondok őszinte köszönetet dr. H o r -
v á t h J á n o s tanszékvezető docensnek, akinek ősz-
tönzése és munkám iránti állandó érdeklődése, továbbá a
szekuláris egyenletek gyökeinek meghatározásához, és a
disszertáció összeállításához nyújtott segítsége nagy erő-
forrást jelentett e dolgozat elkészülése során.

Hálás köszönettel tartozom dr. G i l d e F e r e n c
docensnek, aki a disszertáció témájának kiválasztásától a
számítások befejezéséig értékes tanácsaival, a felvetődött
problémák megoldásához nyújtott állandó segítségével, továbbá
a disszertáció összeállítása során tett észrevételeivel
munkám közvetlen irányítója és segítője volt.

Köszönetet mondok dr. T ó t h I m r é nek, a KFKI
Matematikai Osztály osztályvezető helyettesének, aki a
szekuláris egyenletek programozását elvégezte, és dr.
J á n o s s y L a j o s akadémikus^{nak}, a KFKI igazgatójá-
nak, aki engedélyezte, hogy a Matematikai Osztály a prog-
ramot a KFKI elektronikus számológépén lefuttassa.

IRODALOM

- [1] Rédei L.: Algebra I. (Akadémiai Kiadó, Bp. 1954)
- [2] Wigner, E.: Gruppentheorie und ihre Anwendung
(Vieweg, Braunschweig, 1931)
- [3] Van der Waerden, B.L.: Die Gruppentheoretische Methode
in der Quantenmechanik (Springer, Berlin,
1932)
- [4] Szabó Z.: Válogatott fejezetek a modern szervetlen
kémiaiából (Tankönyvkiadó, Bp. 1959)
- [5] Pauling, L.: The Nature of the Chemical Bond (Cornell
University Press, New York, 1939)
- [6] Eyring, H., J. Walter, G.E. Kimball: Quantum Chemistry
(Wiley, London, 1944)
- [7] Herzberg, G.: Molekula-szinképek és molekula-szerkezet
II. (Akadémiai Kiadó, Bp. 1959)
- [8] Hartmann, H.: Theorie der Chemischen Bindung (Springer,
Berlin, 1954)
- [9] Gilde, F.: Disszertáció, Szeged, 1958
- [10] Pearson, K.: Tables of the Incomplete Γ -Function
(London, 1922)
- [11] Wolfsberg, H., L. Helmholtz: J. Chem. Phys. 20, 837
(1952)
- [12] Landolt, Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen, Atom
und Molekularphysik I. (Springer, Berlin, 1954)
- [13] Mulliken, R.S.: J. Chem. Phys. 2, 792 (1934)
- [14] Meráz V.: Acta Phys. et Chem. Szeged, 8, 3 (1962)
- [15] Császár J.: Magánközlemény

